


برگزیده مسائل هندسه

ترجمه عادل ارشقی



$$S = \frac{1}{2} R^2 (\alpha - \sin \alpha)$$

برگزیده مسائل هندسه

گروهی از ریاضیدانان شوروی

ترجمه عادل ارشقی



مقدمه

کتاب حاضر که برگردانی از آثار ریاضیدانان شوروی است حاوی اصول و بنیادهای هندسه فضایی و مسطحه است. مؤلفین در جای جای کتاب صرفنظر از ارائه مسائل نوینی از هندسه، از طریق حل مسائل — فراتر از روش های سنتی بیان مفاهیم هندسی — دیدگاه های روش شناسانه ای برای تجزیه و تحلیل و ریاضی مسائل هندسی ارائه داده اند. مترجم امیدوار است که کتاب حاضر با همه کاستی ها و کمبودهایش از نظر ترجمه بتواند برای دانش آموزان و ریاضی دوستان راهنما و آموزنده باشد و خوانندگان علاقمند را با زمینه های نوینی از فهم و تبیین موضوعات هندسی آشنا سازد.

عادل ارشقی

فهرست مطالب
فصل اول: هندسه مسطحه
(۹ - ۱۱۹)

- بخش ۱. روشهای حل مسائل هندسی
۱. مثلث ها و چهارضلعی ها: ۹، ۲. دایره ها: ۱۲؛ ۳. مساحت اشکال مسطحه: ۱۴
- بخش ۲. مثلث ها و چهارضلعی ها
- مسائل: ۱. مثلث های قائم الزاویه: ۲۹؛ ۲. مثلث های متساوی الساقین: ۲۹؛ ۳. مثلث های دلخواه: ۳۱؛ ۴. متوازی الاضلاع ها: ۳۳؛ ۵. دوزنقه: ۳۴؛ ۶. مسائل گوناگون: ۳۶
- بخش ۳. دایره ها
- مسائل: ۱. دایره ها: ۲۴؛ ۲. مثلث های محاطی و محیطی: ۴۶؛ ۳. ترتیب های گوناگون از دایره و مثلث: ۴۸؛ ۴. دایره و چهارضلعی: ۴۹
- مسائل گوناگون
- بخش ۴. مساحت های اشکال مسطحه
- مسائل: ۱. مساحت مثلث ها: ۶۵؛ ۲. مساحت چهارضلعی ها: ۶۷؛ ۳. مساحت چند ضلعی ها: ۶۹؛ ۴. مساحت اشکال مرکب: ۷۰؛ ۵. مسائل گوناگون: ۷۱
- بخش ۵. تبدیلات هندسی
۱. تقارن نسبت به یک نقطه: ۷۸؛ ۲. تقارن نسبت به خط مستقیم: ۷۹؛ ۳. دوران: ۸۱؛ ۴. انتقال: ۸۲؛ ۵. تبدیل متجانس: ۸۳
- بخش ۶. بردارها
۱. مسائل مستوی: ۸۷؛ ۲. مسائل متریک: ۹۲
۱. جمع و تفریق بردارها. ضرب بردار در یک عدد
۲. ضرب اسکالر (درونی) بردارها
۳. مسائل گوناگون
- بخش ۷. مقادیر حداقل و حداکثر
- مسائل

۹

۲۲

۳۷

۵۱

۵۴

۷۳

۸۴

۹۴

۹۸

۹۹

۱۰۶

۱۱۵

فصل دوم: هندسه فضایی
(۱۷۷ - ۱۱۹)

۱۱۹	بخش ۸. برش های چند وجهی ها
۱۳۳	بخش ۹. استفاده از ضوابط همخطی و همصفحگی بردارها در حل مسائل
۱۳۹	بخش ۱۰: زاویه بین خطوط مستقیم در فضا
۱۴۲	بخش ۱۱. استفاده از حاصلضرب اسکالر (درونی) بردارها در حل مسائل
۱۴۵	مسائل
۱۴۶	بخش ۱۲. خطوط و صفحات متعامد
	بخش ۱۳. رسم خطوط و صفحات متعامد. رسم
۱۵۰	برش های عمود بر یک خط یا یک صفحه
۱۵۴	بخش ۱۴. زاویه بین خط و صفحه
	بخش ۱۵. فاصله بین یک نقطه و یک صفحه.
۱۵۷	فواصل بین خطوط و صفحات
	بخش ۱۶. زاویه دو وجهی (فرجه). زاویه
۱۶۲	بین صفحات. نیمساز، کنج سه وجهی
	بخش ۱۷. محاسبه حجم چند وجهی ها و حجم
۱۶۹	قسمتی از چند وجهی ها
۱۷۱	بخش ۱۸. مسائلی در مورد ترکیب چند وجهی ها
۱۷۴	مسائل
۱۷۷	راهنمایی ها و راه حل های مسائل
۱۷۷	فصل اول:
۱۷۹	فصل دوم:

فصل اول

هندسه مسطحه

بخش ۱. روشهای حل مسائل هندسی

در حل مسائل هندسی معمولاً سه روش بکار می‌رود: روش هندسی (گزاره مطلوب براساس تعدادی قضیه مشهور و با کمک براهین منطقی استنتاج می‌شود)، روش جبری (اثبات گزاره یا یافتن کمیت‌ها با محاسبه مستقیم براساس روابط موجود بین کمیت‌های هندسی از طریق تشکیل معادله یا دستگاه معادلات انجام می‌گیرد)، روش هندسی — جبری (در این روش برخی از مراحل حل مسئله از طریق روش جبری و بعضی دیگر از مراحل آن از طریق روش هندسی انجام می‌گیرد).

صرفنظر از روش انتخابی برای حل مسائل هندسه، موفقیت و کارآئی آنها به شناخت قضایا و کاربرد مناسب قضایا بستگی دارد. قبل از ارائه همه قضایای هندسه مسطحه (خوانندگان با اکثر آنها از قبیل: شرایط تساوی مثلث‌های اختیاری، شرایط تساوی مثلث‌های قائم‌الزاویه، ویژگی‌های اساسی مثلث متساوی‌الساقین، متوازی‌الاضلاع، لوزی، مستطیل، قضیه تالس، قضیه فیثاغورس، روابط بین اضلاع و زوایای مثلث قائم‌الزاویه، شرایط تشابه مثلث‌ها، قضیه مربوط به تساوی کمانهای واقع بین دو وتر متوازی و غیره آشنایی دارند) ضروری بنظر می‌رسد که صورت بندی قضایای معینی را در اینجا مورد ملاحظه قرار دهیم که در حل مسائل هندسی غالباً مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این پس به این قضایا به کرات مراجعه خواهیم کرد.

۱ • مثلث‌ها و چهارضلعی‌ها


۱ • قضیه مربوط به تساوی زوایایی که اضلاع آنها دو بدو برهم عمود هستند: اگر $\angle ABC$ و $\angle DEF$ هر دو حاده و یا هر دو منفرجه بوده و $AB \perp DE$, $BC \perp EF$ باشد (شکل ۱) آنگاه $\angle ABC = \angle DEF$ خواهد بود.

۲ • ویژگی های میانه دوزنقه:


(a) میانه دوزنقه با قاعده های آن موازی است؛

(b) طول میانه دوزنقه با نصف مجموع قاعده های آن برابر است.

(c) میانه (و فقط میانه) دوزنقه هر خطی را که بین دو قاعده دوزنقه قرار دارد نصف می کند (شکل ۲).



شکل ۲



شکل ۱

قضایای فوق در مورد خط واصل اوساط دو ضلع مثلث نیز صادق است. در این حالت مثلث به عنوان یک دوزنقه تبهگن در نظر گرفته می شود. در دوزنقه تبهگن طول یکی از قاعده ها برابر صفر است.

۳ • قضایای مربوط به نقاط تلاقی میانه ها، نیمسازها و ارتفاعات مثلث:


(a) سه میانه یک مثلث متقارب هستند؛ یعنی آنها در نقطه ای همدیگر را قطع می کنند. این نقطه گرانیگاه (یا مرکز ثقل) مثلث نامیده می شود. فاصله این نقطه روی هر میانه از رأس مربوط به آن میانه برابر دو سوم همان میانه است.

(b) هر سه نیمساز زوایای مثلث از یک نقطه عبور می کنند و فواصل این نقطه از اضلاع مثلث با هم مساوی هستند.

(c) سه ارتفاع هر مثلثی در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند. این نقطه را «مرکز ارتفاعی» مثلث می نامند.

۴ • خاصیت میانه مثلث قائم الزاویه: در مثلث قائم الزاویه طول میانه وارد بر وتر برابر نصف طول وتر است. عکس این اصل نیز درست است: اگر در مثلثی طول میانه ای برابر نصف ضلع میانه مرسوم بر آن باشد در آن صورت مثلث مزبور قائم الزاویه خواهد بود.


۵ • خاصیت نیمساز زاویه داخلی مثلث: در یک مثلث، نیمساز زاویه داخلی ضلع مقابل به آن زاویه را به نسبتی تقسیم می کند که با نسبت اضلاع زاویه مزبور متناسب است: $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ (شکل ۳).



شکل ۳


۶. روابط متریک در مثلث قائم الزاویه: اگر a و b ، ساق‌ها و c وتر، h ارتفاع، و a' و b' تصاویر ساق‌ها روی وتر باشند (شکل ۴)، آنگاه چنین خواهیم داشت:

(a) $h^2 = a'b'$; (b) $a^2 = ca'$; (c) $b^2 = cb'$; (d) $a^2 + b^2 = c^2$; (e) $h = \frac{ab}{c}$.



شکل ۴

۷. قانون کسینوس‌ها: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ (شکل ۵).



شکل ۵

۸. قانون سینوس‌ها: $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. در این رابطه R عبارت از شعاع دایره محیط بر مثلث است.

۹. تعیین نوع مثلث بوسیله اضلاع آن: اگر a و b و c را طول اضلاع مثلث و c را بزرگترین ضلع در نظر بگیریم، آنگاه چنین خواهیم داشت:

(a) اگر $a^2 < b^2 + c^2$ باشد آنگاه مثلث مفروض حاده الزاویه خواهد بود؛

(b) اگر $a^2 = b^2 + c^2$ باشد آنگاه مثلث مفروض قائم الزاویه خواهد بود؛


(c) اگر $a^2 > b^2 + c^2$ باشد در آنصورت مثلث مفروض منفرجه الزاویه خواهد بود.

۱۰. قضیه سیوا: اگر در مثلثی سه خط موازی از رئوس A ، B ، و C متقارب بوده و اضلاع مقابل را در نقاط E ، F و D قطع کنند در آنصورت روی هر ضلع مثلث دو قطعه بوجود می‌آورند. حاصلضرب سه تا از این پاره‌خط‌ها بصورت یک در میان برابر حاصلضرب سه پاره خط دیگر است.

در مثلث ABC ، نقاط D ، E و F را به ترتیب روی اضلاع AB ، BC ، AC اختیار می‌کنیم. شرط لازم و کافی برای تقارب خطوط AE ، BF و CD (شکل ۶) برقراری تساوی زیر است:

$$\frac{AD}{BD} \cdot \frac{BE}{CE} \cdot \frac{CF}{AF} = 1.$$


شکل ۶



۱۱ • روابط متریک در متوازی الاضلاع: مجموع مربعات اقطار هر متوازی الاضلاع معادل مجموع مربعات اضلاع آن است. (شکل ۷).

$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2$$

شکل ۷




۲ • دایره‌ها


۱۲ • ویژگی‌های خطوط مماس بر دایره:

(a) شعاع مرسوم بر نقطه تماس خطی با دایره بر خط مماس عمود است (شکل ۸)؛

(b) دو خط مماس مرسوم بر دایره‌ای از یک نقطه خارج دایره با هم برابر هستند و با خط مرسوم از نقطه مماس بر دایره دو زاویه متساوی بوجود می‌آورند (شکل ۹).



شکل ۹



شکل ۸

۱۳ • سنجش زاویه:

(a) اندازه زاویه مرکزی در دایره از نظر درجه با کمان مقابل به زاویه برابر است؛

(b) اندازه زاویه محاطی از نظر درجه با نصف کمان روبرو به آن زاویه برابر است؛

(c) زاویه تشکیل شده بوسیله خط مماس و وتر مرسوم از نقطه تماس از نظر درجه با نصف کمان واقع در داخل زاویه برابر است.

۱۴ • قضایای مربوط به دایره‌ها و مثلث‌ها


(a) بر هر مثلثی می‌توان دایره‌ای را محیط کرد؛ مرکز دایره محیطی بر نقطه تقارب عمودمنصف‌های اضلاع مثلث منطبق خواهد بود؛

(b) در هر مثلثی می‌توان دایره‌ای را محاط کرد. مرکز دایره محاطی بر نقطه تقارب نیمسازهای مثلث منطبق خواهد بود.


۱۵ • قضایای مربوط به دایره‌ها و چهارضلعی‌ها

(a) برای اینکه دایره‌ای را بتوانیم بر یک چهارضلعی محیط کنیم لازم و کافی است که مجموع زوایای متقابل چهارضلعی 180° باشد ($\alpha + \beta = 180^\circ$) (شکل ۱۰).

(b) شرط لازم و کافی برای محاط شدن دایره‌ای در داخل یک چهارضلعی این است که مجموع هر دو ضلع متقابل چهارضلعی با مجموع دو ضلع دیگر آن برابر باشد ($a + c = b + d$) (شکل ۱۱).



شکل ۱۱



شکل ۱۰


۱۶ • روابط متریک در دایره:

(a) اگر در دایره‌ای دو وتر AB و CD در نقطه M همدیگر را قطع کنند آنگاه $AM \cdot BM = CM \cdot DM$ خواهد بود (شکل ۱۲)؛


(b) اگر دو قاطع MAB و MCD از نقطه خارجی M بر دایره‌ای رسم شوند آنگاه:

$AM \cdot BM = CM \cdot DM$ را خواهیم داشت (شکل ۱۳)؛


(c) اگر از نقطه خارجی M ، قاطع MAB و مماس MC را بر دایره‌ای رسم کنیم در آن صورت $AM \cdot BM = CM^2$ را خواهیم داشت (شکل ۱۴).



شکل ۱۴



شکل ۱۳



شکل ۱۲

۳. مساحت اشکال مسطحه

۱۷. نسبت مساحت اشکال متشابه با مجذور نسبت تشابه آنها برابر است.

۱۸. اگر دو مثلث دارای قاعده‌های مساوی باشند در آنصورت نسبت مساحت‌های آنها برابر نسبت ارتفاعات خواهد بود؛ اگر دو ارتفاع از دو مثلث باهم برابر باشند در آنصورت نسبت مساحت‌های دو مثلث برابر نسبت قاعده‌های آنها خواهد بود.

۱۹. فرمولهای محاسبه مساحت مثلث:

$$(a) S = \frac{ah}{2}; (b) S = \frac{ab \sin C}{2}; (c) S = \frac{abc}{4R}; (d) S = pr$$

$$(e) S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{فرمول هرو})$$

در این فرمول‌ها $p = \frac{a+b+c}{2}$ بوده و R عبارت از شعاع دایره محیطی و r عبارت از شعاع دایره محاطی مثلث است.


۲۰. فرمول‌های محاسبه مساحت چهارضلعی محدب (کوز):

$$(a) S = S_{ABC} + S_{ACD} = S_{ABD} + S_{BCD} = S_{AOB} + S_{BOC} + S_{COD} + S_{AOD}$$

$$(b) S = \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin \alpha;$$

$$(c) S = pr \quad (\text{در صورتیکه دایره‌ای را بتوان در چهارضلعی})$$

محاط کرد و r طول شعاع این دایره باشد)




شکل ۱۵

۲۱. فرمول محاسبه مساحت متوازی الاضلاع (شکل ۱۶):

$$(a) S = ah;$$

$$(b) S = ab \sin C;$$


$$(c) S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \alpha.$$



شکل ۱۶

۲۲. فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه (شکل ۱۷):

$$S = \frac{a+b}{2} h.$$




شکل ۱۷

۲۳. فرمول محاسبه مساحت قطاع دایره (شکل ۱۸):

$$S = \frac{1}{2} R^2 \alpha$$


(α اندازه زاویه مرکزی قطاع برحسب رادیان است).



شکل ۱۸

۲۴ • فرمول مساحت قطعه ای از دایره (شکل ۱۹):

$$S = \frac{1}{2} R^2 (\alpha - \sin \alpha).$$




شکل ۱۹

در حل مسائل هندسی، غالباً به اثبات برابری دو پاره خط (یا دوزاویه) مبادرت می‌کنیم. در زیر سه روش اساسی برای اثبات برابری (طول) دو پاره خط فهرست شده است:


- (1) پاره خط‌ها را به عنوان اضلاع دو مثلث مورد ملاحظه قرار داده و به اثبات تساوی این دو مثلث می‌پردازیم؛
- (2) پاره خط‌ها را به عنوان اضلاع مثلثی در نظر گرفته و به اثبات متساوی الساقین بودن این مثلث می‌پردازیم؛
- (3) پاره خط a را با پاره خط a' و پاره خط b را با پاره خط مساوی b' تعویض کرده و ثابت می‌کنیم که پاره خط‌های a' و b' برابر هستند.

در حل مسائل هندسی از رسم خطوط کمکی استفاده می‌شود، از قبیل: خط عمود یا موازی با خطی از شکل مسئله، دو برابر کردن طول میانه مثلث برای تبدیل آن به متوازی الاضلاع؛ رسم دایره کمکی؛ رسم شعاع‌هایی بر نقطه تماس خط با دایره یا نقطه تماس دو دایره.

مثال ۱ • دو خط متقاطع، اضلاع AB ، BC ، CD و AD از مربع $ABCD$ را بترتیب در نقاط F ، E ، L و K قطع می‌کنند. $EK = FL$ را ثابت کنید (شکل ۲۰).




شکل ۲۱



شکل ۲۰

اثبات • با استفاده از روش اول مطروحه در فوق، FM را موازی CD و KP را موازی AD رسم می‌کنیم. آنگاه پاره خط‌های EK و FL مورد ملاحظه اضلاع دو مثلث قائم الزاویه EKP و FLM بوده (شکل ۲۱) و از اینرو اثبات برابری این دو مثلث کفایت می‌کند. چنین داریم: $PK = FM$ (ارتفاع‌های مربع مفروض)؛ $\angle LFM = \angle EKP$ (دو زاویه ای که اضلاع آنها دو دو برهم عمود هستند و طبق قضیه ۱ باهم مساوی خواهند بود). از اینرو مثلث‌های EKP و FLM برابر (به حالت تساوی یک ضلع زاویه قائمه و یک زاویه حاده) خواهند بود. تساوی این دو مثلث قائم الزاویه، موجب برابری وترهای آنها شده و در نتیجه EK و FL باهم برابر خواهند شد.

مثال ۲ • اگر طول اضلاع مثلثی برابر a ، b و c باشد در آن صورت m_c ، میانه مرسوم بر ضلع c را محاسبه کنید.



حل • میانه مزبور را به اندازه خود امتداد می‌دهیم. انتهای این خط با سه رأس مثلث، متوازی‌الاضلاع $ACBP$ را بوجود می‌آورد (شکل ۲۲). با استفاده از قضیه ۱۱ در مورد این متوازی‌الاضلاع به $CP^2 + AB^2 = 2AC^2 + 2BC^2$ یعنی $(2m_c)^2 + c^2 = 2b^2 + 2a^2$ دست می‌یابیم که از آن نیز $m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}$ حصول می‌یابد.

شکل ۲۲

مثال ۳ • ثابت کنید که مرکز ارتفاعی یک مثلث حاده الزاویه بر مرکز دایره ای منطبق است که در مثلث حاصله از اتصال پای عمودهای مثلث مفروض محاط است.

اثبات • از آنجا که مرکز دایره محاطی در یک مثلث بر نقطه تقارب نیمسازهای مثلث منطبق است (قضیه ۱۵b) از اینرو مسئله مفروض به اثبات این حکم تحویل می‌یابد که DH ، EH و KH نیمسازهای زوایای مثلث DEK هستند (شکل ۲۳).

برای این منظور کافی است که $\angle EDH = \angle HDK$ ثابت شود.


چهارضلعی $DHCK$ را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. چنین داریم:

$\angle HDC = 90^\circ$ و $\angle HKC = 90^\circ$. از اینرو $\angle HDC + \angle HKC = 180^\circ$ بوده و در نتیجه دایره ای را می‌توان بر چهارضلعی $DHCK$ محیط کرد (قضیه ۱۵a). بارسم این دایره (شکل ۲۴).


متوجه می‌شویم که زاویه‌های HCK و HDK باهم برابر هستند. دلیل امر این است که هر دو زاویه محاطی بوده و به کمان HK مقابل هستند. بطریق مشابه با محیط کردن دایره ای بر چهارضلعی $AEHD$

به $\angle EAH = \angle EDH$ دست می‌یابیم. بدین ترتیب داریم: $\angle EAH = \angle EDH$ و $\angle HDK = \angle HCK$. اضلاع زاویه‌های EAH و HCK دو دو برهم عمود بوده و از اینرو برابر هم محسوب می‌شوند (طبق قضیه ۱) که در نتیجه $\angle EDH = \angle HDK$ بدست می‌آید که اثبات آن

مطلوب بود.



شکل ۲۴



شکل ۲۳

تشکیل معادلات در مسائل هندسی با استفاده از قضیه فیثاغورس، روابط متریک در مثلث قائم الزاویه (قضیه ۶)، روابط بین اضلاع وزوایای مثلث قائم الزاویه، تناسب اضلاع، ارتفاعات و محیط مثلث های متشابه، ویژگی نیمساز زوایای مثلث (قضیه ۵)، روابط متریک در متوازی الاضلاع، قضیه کسینوسها (قضیه ۷) و فرمول های متنوع محاسبه مساحت ها، انجام می گیرد.

برای تشکیل معادلات لازم برای حل مسائل هندسی «روش عنصر مرجع» یک روش بنیادی است. این روش به شرح زیر است:

یک عنصر هندسی بدو طریق بیان شده و سپس مقادیر حاصله برای آن در این دوروش باهم مساوی قرار داده می شوند.

مثال ۴ • اضلاع مثلثی با a ، b و c برابر است. h_c ، ارتفاع مرسوم بر ضلع c را پیدا کنید.

حل • روش اول. ارتفاع h_c برای دو مثلث قائم الزاویه ACH و CHB ضلع مشترک محسوب می شود (شکل ۲۵). با استفاده از قضیه فیثاغورس، معادل های CH^2 را از مثلث های ACH و CHB (CH عنصر مرجع محسوب می شود) می نویسیم. اگر $AH = x$ فرض شود آنگاه $BH = c - x$ خواهد بود. توجه داشته باشید که اگر ACB منفرجه الزاویه باشد در آن صورت $BH = c + x$ خواهد بود (شکل ۲۶). در اینجا فقط حالت ارائه شده در شکل ۲۵ را مورد ملاحظه قرار می دهیم. از مثلث ACH به $CH^2 = b^2 - x^2$ و از مثلث BCH به $CH^2 = a^2 - (c - x)^2$ وصول می یابیم.

از معادله $b^2 - x^2 = a^2 - (c - x)^2$ نیز چنین استنتاج می شود: $x = \frac{c^2 + b^2 - a^2}{2c}$.


فرمول زیر از مثلث ACH بدست می آید:

$$\begin{aligned} CH &= \sqrt{b^2 - \left(\frac{c^2 + b^2 - a^2}{2c}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(b - \frac{c^2 + b^2 - a^2}{2c}\right) \left(b + \frac{c^2 + b^2 - a^2}{2c}\right)} \\ &= \frac{1}{2c} \sqrt{(a^2 - (b - c)^2) ((b + c)^2 - a^2)} \\ &= \frac{1}{2c} \sqrt{(a + b - c)(a + c - b)(b + c - a)(a + b + c)}. \end{aligned}$$


$$h_c = \frac{\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}}{2c} \quad \text{بدین ترتیب داریم:}$$

روش دوم. از روش مساحت ها استفاده می کنیم. از یک طرف مساحت مثلث ABC برابر روش اول $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ و از طرف دیگر معادل $\frac{1}{2}ch_c$ است. با مساوی قرار دادن این دو عبارت چنین نتیجه می شود: $h_c = \frac{2\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{c}$. با در نظر گرفتن p بر حسب اضلاع مثلث یعنی $p = \frac{a+b+c}{2}$ و جایگذاری در عبارت فوق چنین نتیجه می شود:

$$h_c = \frac{\sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}}{2c}$$



شکل ۲۶



شکل ۲۵

مثال ۵. مثلی با اضلاع a ، b و c مفروض است. l_c ، نیمساز وارد بر ضلع c را پیدا کنید.
 حل. روش اول (روش جبری). CD را در مثلث ABC ، نیمساز در نظر می گیریم (شکل ۲۷). طرح کلی مسئله به شرح زیر است:
 طول پاره خط های AD و BD را پیدا کرده و سپس قانون کسینوس ها را در مورد مثلث های ACD ، BCD بکار می گیریم (بخطا داریم که $\angle ACD = \angle DCB$ است). در نتیجه طول نیمساز بصورت $CD = l_c$ بدست می آید.
 با فرض $AD = x$ و $BD = y$ به $x + y = c$ و وصول یافته و طبق خاصیت نیمساز (قضیه ۵)، $\frac{x}{y} = \frac{b}{a}$ بدست می آید.

$$\text{از دستگاه معادلات } \begin{cases} x+y=c, \\ \frac{x}{y} = \frac{b}{a} \end{cases} \text{ درمی یابیم که: } x = \frac{bc}{a+b}, y = \frac{ac}{a+b}$$

با بکارگیری قانون کسینوس ها (قضیه ۷) در مورد مثلث ACD نتیجه می شود که:

$$x^2 = b^2 + l^2 - 2bl \cos t \quad (1)$$

(جهت اختصار، $\angle ACD = \angle DCB = t$ و $l_c = l$ را قرار داده ایم).

با استفاده از قانون کسینوس ها در مورد مثلث BCD چنین داریم:

$$y^2 = a^2 + l^2 - 2al \cos t \quad (2)$$

طرفین تساوی (۱) را در a و طرفین تساوی (۲) را در $(-b)$ ضرب کرده و سپس آنها را با هم جمع می کنیم:


$$ax^2 - by^2 = ab^2 - a^2b + al^2 - bl^2$$

$$l^2 = \frac{1}{a-b} (x^2 a - y^2 b) + ab. \quad (3)$$

با گذاشتن مقادیر x و y یافته شده در تساوی (3) چنین حاصل می‌شود:

$$l^2 = \frac{1}{a-b} \left(\frac{b^2 c^2 a}{(a+b)^2} - \frac{a^2 c^2 b}{(a+b)^2} \right) + ab = ab \left(1 - \frac{c^2}{(a+b)^2} \right) = \frac{ab(a+b+c)(a+b-c)}{(a+b)^2}.$$

$$l_c = \frac{\sqrt{ab(a+b+c)(a+b-c)}}{a+b} \quad \text{بدین ترتیب داریم:}$$



شکل ۲۷

روش دوم. علاوه بر مجهول l که مطلوب مسئله است یک کمیت مجهول کمکی نیز معرفی می‌کنیم.

با قرار دادن $x = \angle ACD = \angle DCB$ از روش مساحتها استفاده می‌کنیم. چنین داریم:

$S_{ABC} = S_{ACD} + S_{BCD}$. از یک طرف $S_{ABC} = \frac{1}{2} ab \sin 2x$ و از طرف دیگر بدلیل

$S_{ACD} = \frac{1}{2} al \sin x$ و $S_{BCD} = \frac{1}{2} bl \sin x$ تساوی $S_{ABC} = \frac{1}{2} al \sin x + \frac{1}{2} bl \sin x$

را داریم. از اینرو $\frac{1}{2} ab \sin 2x = \frac{l(a+b) \sin x}{2}$ بدست می‌آید که از آن نیز $l = \frac{2ab \cos x}{a+b}$

حاصل می‌شود. برای پیدا کردن $\cos x$ قانون کسینوسها را در مورد مثلث ABC برای ضلع AB بکار می‌گیریم.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 2x$$

چنین داریم: از این رابطه نیز نتیجه می‌شود که: $\cos 2x = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$. آنگاه داریم:

$$\cos x = \sqrt{\frac{1 + \cos 2x}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right)} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(a+b+c)(a+b-c)}{ab}}$$


بدین ترتیب رابطه زیر استنتاج می‌شود:

$$l = \frac{2ab \cos x}{a+b} = \frac{2ab}{a+b} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(a+b+c)(a+b-c)}{ab}} = \frac{\sqrt{ab(a+b+c)(a+b-c)}}{a+b}$$

در تشکیل معادلات برای حل مسائل هندسی پیشرفت در حل مسائل غالباً به معرفی موفقیت‌آمیز

مجهولات بستگی دارد. برای روشن کردن این نکته به مثال زیر می‌پردازیم:

مثال ۶. در یک مثلث قائم الزاویه طول وتر برابر c و طول نیمساز یکی از زوایای حاده مثلث برابر $\frac{c\sqrt{3}}{3}$ است. طول اضلاع زاویه قائمه مثلث را پیدا کنید (شکل ۲۸).



شکل ۲۸

حل ● روش اول. با منظور کردن $AC = x$ ، $BC = y$ ، $CD = z$ ، طبق قضیه فیثاغورس چنین داریم:
 $x^2 + y^2 = c^2$ و $x^2 + z^2 = \left(\frac{c\sqrt{3}}{3}\right)^2$ علاوه بر این براساس ویژگی نیمساز زاویه (قضیه ۵)
 $\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{DB}$ یعنی $\frac{x}{c} = \frac{z}{y-z}$ حاصل می شود. سرانجام دستگاہ معادلات سه متغیره زیر حاصل می شود.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = c^2, \\ x^2 + z^2 = \frac{c^2}{3}, \\ \frac{x}{c} = \frac{z}{y-z}, \end{cases}$$

حل این دستگاہ از پیچیدگی های جبری قابل ملاحظه ای برخوردار است.


روش دوم. تساوی $\angle CAD = \angle BAD = x$ را منظور می کنیم. با استفاده از پاره خط AC به عنوان «عنصر مرجع» یک معادله تشکیل می دهیم. از مثلث ABC به $AC = c \cos 2x$ و از مثلث ACD به $AC = \frac{c\sqrt{3}}{3}$ وصول می یابیم. با مساوی قرار دادن این عبارات، معادله مثلث ها بدست می آید: $c \cos 2x = \frac{c\sqrt{3}}{3} \cos x$. این معادله را حل می کنیم:

$$\sqrt{3} \cos 2x = \cos x, \quad \sqrt{3} (2 \cos^2 x - 1) = \cos x, \quad 2\sqrt{3} \cos^2 x - \cos x - \sqrt{3} = 0$$

از این تساوی به $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ یا $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ وصول می یابیم. از آنجا که با توجه به مفاد مسئله، $\cos x > 0$ است، بنابراین $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ خواهد بود. از این زاویه BAD برابر 30° و زاویه BAC برابر 60° خواهد بود. در نتیجه $AC = \frac{c}{2}$ و $BC = \frac{c\sqrt{3}}{2}$ بدست می آید.

اگر مسئله یافتن نسبت کمیت های معین (طول ها یا مساحت ها) بویژه یافتن اندازه زاویه ای (که معمولاً به یافتن توابع مثلثاتی معینی از آن زاویه و در نتیجه به یافتن نسبت اضلاع مثلث قائم الزاویه تحویل می یابد) مطلوب باشد معمولاً به شرح زیر عمل می کنیم: یکی از عناصر خطی را معلوم در نظر گرفته و کمیت های مطلوب را بر حسب این عنصر بیان کرده و سپس نسبت این کمیت ها را پیدا می کنیم. عنصر خطی منظور شده، پارامتر کمکی و این روش حل مسائل هندسی، روش معرفی پارامتر کمکی نامیده می شود. از این روش در حل مسائلی استفاده می شود که در آن اشکال هندسی مشابهی وجود دارد.

مثال ۷ ● در مثلث قائم الزاویه ABC ، از رأس قائمه C ، میانه و ارتفاع را رسم می کنیم. α ، زاویه بین این دو خط برابر $\arccos \frac{40}{41}$ است.
 نسبت اضلاع زاویه قائمه این مثلث را بیابید (شکل ۲۹).



شکل ۲۹

حل • قبل از همه، ابتدا طبق فرض $\cos \alpha = \frac{40}{41}$ یعنی $\frac{CK}{CM} = \frac{40}{41}$ را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. با استفاده از روش معرفی پارامتر کمکی به حل مسئله می‌پردازیم. اگر $CK = h$ را در نظر بگیریم، آنگاه $CM = \frac{41}{40}h$ و $KM = \sqrt{CM^2 - CK^2} = \frac{9}{40}h$ را خواهیم داشت. از آنجا که در مثلث قائم الزاویه میانه وارد بر وتر نصف وتر است (قضیه ۴) از اینرو $AM = CM = MB = \frac{41}{40}h$ را داریم. آنگاه چنین خواهیم داشت:


$$AK = AM - KM = \frac{41}{40}h - \frac{9}{40}h = \frac{4}{5}h, \quad KB = KM + BM = \frac{9}{40}h + \frac{41}{40}h = \frac{5}{4}h$$

$$AC = \sqrt{AK^2 + CK^2} = \sqrt{\frac{16}{25}h^2 + h^2} = \frac{h}{5} \sqrt{41}$$

$$BC = \sqrt{BK^2 + CK^2} = \sqrt{\frac{25}{16}h^2 + h^2} = \frac{h}{4} \sqrt{41}$$

$$\frac{AC}{BC} = \frac{h \sqrt{41}}{5} \div \frac{h \sqrt{41}}{4} = \frac{4}{5}$$

مثال ۸ • اندازه زاویه C که تارک مثلث متساوی الساقین ABC است برابر 100° می‌باشد. دو شعاع رسم می‌کنیم: یکی به مرکز A که با زاویه 30° می‌سازد و دیگری به مرکز B که با زاویه 20° می‌سازد. این شعاعها همدیگر را در M قطع می‌کنند. زوایای ACM و BCM را پیدا کنید (شکل ۳۰).



شکل ۳۰

حل • نقاط M و C را بهم وصل کرده و زاویه ACM را با x نشان می‌دهیم. از نقطه M عمودهایی را به اضلاع مثلث رسم می‌کنیم: $MA_1 \perp BC$ و $MB_1 \perp AC$ ، $MC_1 \perp AB$. با در نظر گرفتن $CM = a$ پارامتر کمکی را معرفی می‌کنیم و MC_1 را از دو طریق یعنی با استفاده از MC_1 به عنوان عنصر مرجع محاسبه می‌کنیم. از مثلث CMB_1 درمی‌یابیم که $MB_1 = MC \sin x = a \sin x$ است. بدلیل اینکه $\angle ACB = 100^\circ$ بوده و ABC طبق فرض، متساوی الساقین است

از اینرو $\angle CAB = \angle ABC = 40^\circ$ بوده و در نتیجه $\angle CAM = 10^\circ$ را خواهیم داشت.

از مثلث AMB_1 نیز $AM = \frac{MB_1}{\sin 10^\circ} = \frac{a \sin x}{\sin 10^\circ}$ را داریم. سرانجام از مثلث AMC_1 چنین حاصل

می‌شود: $MC_1 = AM \sin 30^\circ = \frac{a \sin x}{2 \sin 10^\circ}$. مثلث CMA_1 را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. در این

مثلث $\angle MCA_1 = 100^\circ - x$ بوده و از اینرو $MA_1 = CM \sin (100^\circ - x) = a \sin (100^\circ - x)$ و از اینرو $\angle MBC = 40^\circ - 20^\circ = 20^\circ$ بدلیل $\angle MBC = 40^\circ - 20^\circ = 20^\circ$ خواهیم داشت. بدلیل $\angle MBC = 40^\circ - 20^\circ = 20^\circ$ مثلث‌های BMA_1 و BMC_1 باهم مساوی بوده

و در نتیجه $MC_1 = MA_1 = a \sin(100^\circ - x)$ را خواهیم داشت. با مساوی قرار دادن عبارتهای
 معادل MC_1 معادله مثلثاتی $\frac{a \sin x}{2 \sin 10^\circ} = a \sin(100^\circ - x)$ بدست می آید. از این معادله بترتیب
 چنین حاصل می شود:


$$\sin x = 2 \sin(100^\circ - x) \cdot \sin 10^\circ, \quad \sin x = \cos(90^\circ - x) - \cos(110^\circ - x)$$

$$\cos(110^\circ - x) = 0$$

و در نتیجه $x = 20^\circ$ خواهد بود.

بخش ۲ • مثلث ها و چهارضلعی ها

مشال ۱ • قاعده های دوزنقه ای عبارت از a و b هستند.
 طول پاره خطی که وسط قطرهای آن را بهم متصل می کند
 پیدا کنید (شکل ۳۱).



شکل ۳۱


حل • از آنجا که نقطه P وسط قطر AC و نقطه K وسط قطر BD است از اینرو نقاط P و K روی میانه
 EF دوزنقه واقع خواهد بود (قضیه ۲۷). چون خط EK دو ضلع مثلث ABD را بهم وصل می کند از
 اینرو $EK = \frac{a}{2}$ خواهد بود. بدلیل اینکه خط EP نیز وسط دو ضلع از مثلث ABC را بهم وصل می کند
 $EP = \frac{b}{2}$ استنتاج می شود. بدین ترتیب $PK = EK - EP = \frac{a-b}{2}$ بدست می آید.

مثال ۲ • با معلوم بودن میانه های m_a, m_b, m_c از مثلث ABC طول ضلع $AC = b$ را بدست آورید.


حل • طبق قضیه ۳۸ میانه های مثلث در نقطه ای مانند M متقارب هستند. فاصله این نقطه از رأس مثلث
 روی هر یک از میانه ها برابر دو سوم طول همان میانه است (شکل ۳۲). بنابراین دو ضلع از مثلث
 AMC یعنی $AM = \frac{2}{3} m_a, MC = \frac{2}{3} m_c$ و نیز میانه $MD = \frac{1}{3} m_b$ معلوم است. مثلث AMC
 را مورد ملاحظه قرار می دهیم. در این مثلث میانه MD را دو برابر کرده و پاره خط MP را بدست می آوریم.
 سپس نقطه P را به نقاط A و C وصل می کنیم. در نتیجه متوازی الاضلاع $AMCP$ بدست می آید
 (شکل ۳۳). آنگاه طبق قضیه ۱۱ به:

$$b^2 + \frac{4}{9} m_b^2 = 2 \cdot \frac{4}{9} m_a^2 + \frac{4}{9} m_c^2 \quad \text{یعنی} \quad AC^2 + MP^2 = 2AM^2 + 2MC^2$$


که از آن نیز $b = \frac{2}{3} \sqrt{2m_a^2 + 2m_c^2 - m_b^2}$ بدست می آید.



شکل ۳۳



شکل ۳۲




شکل ۳۴

مثال ۳ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC مربعات $ABDE$ و $BCKM$ را رسم کرده ایم. ثابت کنید که طول پاره خط DM دو برابر طول میانه BP از مثلث ABC است (شکل ۳۴).


اثبات • از آنجا که بایستی $DM = 2BP$ را ثابت کنیم از اینرو مناسب بنظر می رسد که طول BP را دو برابر کرده و مثلث ABC را به متوازی الاضلاع $ABCT$ تبدیل کنیم و سپس $DM = BT$ را ثابت کنیم (شکل ۳۵). برای اثبات برابری DM و BT ، این دو پاره خط را به عنوان دو ضلع از دو مثلث مورد ملاحظه قرار داده و سپس به اثبات تساوی این دو مثلث می پردازیم. بر اساس این طرح، حل مسئله مفروض انجام می گیرد.

با ادامه دادن پاره خط BP به اندازه ای که برابر خود BP است و نیز با اتصال نقطه T که انتهای این امتداد است به نقاط A و C به متوازی الاضلاع $ABCT$ وصول می یابیم. مثلث های DMB و BCT را مورد ملاحظه قرار می دهیم. چنین داریم: (a) به عنوان اضلاع مربع $BCKM$ تساوی $BM = BC$ برقرار است؛ (b) $DB = CT$ (بطور مشروح در مورد این تساوی چنین می توان گفت: به عنوان اضلاع مربع $ABDE$ ، $DB = AB$ ، و به عنوان اضلاع مقابل متوازی الاضلاع $ABCT$ ، $AB = CT$ ، بوده و از اینرو $DB = CT$ خواهد بود)؛ (c) $\angle DBM = \angle BCT$ (دو زاویه ای که اضلاع آنها بر هم عمود هستند). از اینرو $\triangle DBM = \triangle BCT$ (به حالت دو ضلع و زاویه بین آنها) و در نتیجه $DM = BT$ حاصل می شود. بدلیل $BT = 2BP$ از $DM = BT$ تساوی $DM = 2BP$ استنتاج می شود.



شکل ۳۵

مثال ۴ • در مثلث قائم الزاویه ای ارتفاع وارد بر وتر آن را به دو قسمت با طول های 9cm و 16cm تقسیم می کند. از رأس زاویه حاده بزرگتر مثلث و وسط ارتفاع مثلث خطی عبور می دهیم. قسمتی از این خط را که در داخل مثلث قرار دارد پیدا کنید (شکل ۳۶).



شکل ۳۶


حل • چنین داریم: $CH^2 = AH \cdot BH$ (قضیه ۶۵)؛ و از اینرو $CH^2 = 9 \cdot 16$ یعنی $CH = 12$ cm حاصل می‌شود. از $\triangle ADH$ به $AD = \sqrt{9^2 + 6^2} = 3\sqrt{13}$ cm دست می‌یابیم. خط HM را بصورت $HM \parallel AK$ رسم کرده و $DK = x$ را در نظر می‌گیریم. بدلیل اینکه DK خط واصل وسط دوضلع از $\triangle HCM$ است از اینرو $HM = 2x$ است. از آنجا که مثلث‌های HMB و AKB متشابه هستند از اینرو $\frac{HM}{AK} = \frac{BH}{AB}$ یعنی $\frac{2x}{x + 3\sqrt{13}} = \frac{16}{25}$ استنتاج شده و از آن نیز چنین بدست می‌آید:

$$AK = 3\sqrt{13} + \frac{24\sqrt{13}}{17} = \frac{75\sqrt{13}}{17} \quad \text{و} \quad x = \frac{24\sqrt{13}}{17}$$

$$AK = \frac{75\sqrt{13}}{17} \text{ cm}$$

مثال ۵ • مستطیلی را در داخل مثلثی با اضلاع 10 cm، 17 cm و 21 cm طوری محاط کرده‌ایم که دو رأس مستطیل بر روی یک ضلع و دو رأس دیگر آن بر روی دوضلع مثلث منطبق شده است. اگر محیط مستطیل برابر 22.5 cm باشد طول اضلاع آن را بدست آورید.

حل • ابتدا قبل از هر چیز نوع مثلث مطروحه را پیدا می‌کنیم. چنین داریم: $10^2 = 100$ ، $17^2 = 289$ و $21^2 = 441$. از آنجا که $10^2 + 17^2 > 21^2$ است از اینرو (طبق قضیه ۹) مثلث مزبور منفرجه‌الزاویه بوده و در نتیجه مستطیل را فقط به یک طریق می‌توان در آن محاط کرد و در این طریق دو رأس آن روی ضلع بزرگتر مثلث قرار می‌گیرد (شکل ۳۷). آنگاه به یافتن ارتفاع BH از مثلث ABC مبادرت می‌کنیم. با بکارگیری روش مثال ۴ بخش ۱ (یا فرمول استنتاج شده در آن مثال) به $BH = 8$ cm وصول می‌یابیم. با قرار دادن $ED = x$ به $EF = 11.25 - x$ (بدلیل اینکه محیط مستطیل $DEFK$ برابر 22.5 cm است) و $BP = 8 - x$ می‌رسیم. مثلث‌های BEF و ABC متشابه هستند، از اینرو $\frac{EF}{AC} = \frac{BP}{BH}$ (در مثلث‌های متشابه نسبت ارتفاعات متناظر با نسبت تشابه برابر است) یعنی $\frac{11.25 - x}{21} = \frac{8 - x}{8}$ را خواهیم داشت که از آن نیز $x = 6$ استنتاج می‌شود. بدین ترتیب طول و عرض مستطیل بترتیب 6 cm و 5.25 cm خواهد بود.



شکل ۳۷

مثال ۶ • در مثلث ABC زاویه A دو برابر زاویه C ، ضلع BC از ضلع AB 2 cm بیشتر بوده و

$AC = 5 \text{ cm}$ است. AB و BC را پیدا کنید.

حل • روش اول — با رسم نیمساز AD در زاویه A به $\angle BAD = \angle DAC = \angle ACB$ دست می‌یابیم (شکل ۳۸). در مثلث ADC زاویه‌های مجاور قاعده متساوی بوده و از اینرو مثلث مزبور متساوی الساقین خواهد بود یعنی تساوی $AD = DC$ را خواهیم داشت.

با قراردادن $AB = x$ و $AD = DC = y$ در می‌یابیم که $BC = x + 2$ و $BD = x + 2 - y$ است. مثلث‌های ABD و ABC مشابه هستند. دلیل امر این است که $\angle BAD = \angle BCA$ بوده و

$\angle B$ زاویه مشترک آنهاست. از تشابه این دو مثلث، $\frac{AB}{BC} = \frac{BD}{AB} = \frac{AD}{AC}$ ، یعنی:

$$\frac{x}{x+2} = \frac{x+2-y}{x} = \frac{y}{5}$$

استنتاج می‌شود. برای یافتن x و y به دستگاه دو معادله دو متغیره:

$$\begin{cases} 5x = xy + 2y, \\ 5x + 10 - 5y = xy \end{cases} \text{ وصول می‌یابیم که از آن نیز } \begin{cases} \frac{x}{x+2} = \frac{y}{5} \\ \frac{x+2-y}{x} = \frac{y}{5} \end{cases} \text{ بدست می‌آید.}$$

تفریق معادله دوم این دستگاه از معادله اول آن به $5y - 10 = 2y$ و $y = \frac{10}{3}$ منتهی می‌شود.

بنابراین $\frac{x}{x+2} = \frac{2}{3}$ یعنی $x = 4$ بدست می‌آید. بدین ترتیب $AB = 4 \text{ cm}$ و $BC = 6 \text{ cm}$ خواهد بود.

روش دوم — با قراردادن $\angle C = t$ به $\angle A = 2t$ و $\angle B = 180^\circ - 3t$ همچنین منظور

کردن $AB = x$ به $BC = x + 2$ منتهی می‌شود. طبق قانون سینوس‌ها (قضیه ۸) چنین داریم:

$$\frac{x}{\sin t} = \frac{x+2}{\sin 2t} = \frac{5}{\sin (180^\circ - 3t)}$$

$\sin (180^\circ - 3t) = \sin 3t$ استفاده شده است برحسب x و t بدست می‌آید:

$$\begin{cases} \frac{x}{\sin t} = \frac{x+2}{\sin 2t} \\ \frac{x}{\sin t} = \frac{5}{\sin 3t} \end{cases}$$

به حل این دستگاه مبادرت می‌کنیم.

از معادله دوم دستگاه به $\frac{x}{\sin 3t} = \frac{5 \sin t}{3 \sin t - 4 \sin^3 t} = \frac{5}{3 - 4 \sin^2 t}$ و از معادله اول نیز به

$1 + \frac{x}{2} = 2 \cos t$ یعنی $\frac{x+2}{x} = \frac{\sin 2t}{\sin t}$ وصول می‌یابیم. با قراردادن عبارت معادل x برحسب

t در تساوی آخر به $2 \cos t = 1 + \frac{6-8 \sin^2 t}{5}$ می‌رسیم. با منظور کردن $\cos t = z$ در این معادله

مثلثاتی معادله $1 + \frac{6-8(1-z^2)}{5} = 2z$ بدست می‌آید که از آن نیز $z_1 = \frac{3}{4}$ یا $z_2 = \frac{1}{2}$ یعنی:


$\cos t = \frac{3}{4}$ یا $\cos t = \frac{1}{2}$ نتیجه می‌شود. اگر $\cos t = \frac{3}{4}$ باشد آنگاه از $2 \cos t = 1 + \frac{2}{x}$ به $1 + \frac{2}{x} = 2 \cos t$

اگر $\cos t = \frac{1}{2}$ باشد آنگاه از $2 \cos t = 1 + \frac{2}{x}$ به $1 + \frac{2}{x} = 1$ وصول می‌یابیم

که ممتنع است. بدین ترتیب $AB = 4 \text{ cm}$ و $BC = 6 \text{ cm}$ خواهد بود.

تذکر • عبارت $\cos t = \frac{1}{2}$ به معنی $t = 60^\circ$ است که از آن نیز در مثلث ABC زوایای $\angle C = 60^\circ$ و

$\angle A = 120^\circ$ باشد دست می‌آید که غیرممکن است.



شکل ۳۸

مثال ۷ • در مستطیل $ABCD$ (شکل ۳۹) نقطه K وسط ضلع AD است. اگر $AD:AB = \sqrt{2}$ باشد زاویه بین AC و BK را بیابید.

حل • از روش پارامتر کمکی استفاده می‌کنیم (به مثال ۷ بخش ۱ رجوع کنید). منظور کردن $AB = a$ به $AD = a\sqrt{2}$ منجر می‌شود. طرح کلی حل مسئله به شرح زیر است: همه اضلاع مثلث AMK را برحسب a بیان کرده و سپس در مورد ضلع AK قانون کسینوس ها را اعمال می‌کنیم. این امر محاسبه کسینوس زاویه AMK را که با x نشان داده می‌شود ممکن می‌سازد. پاره خط های AO و BK میانه های مثلث ABD هستند. از اینرو (طبق قضیه ۳) $MK = \frac{1}{3} BK$ و $AM = \frac{2}{3} AO$ را داریم. بدین ترتیب نتیجه می‌شود که:

$$MK = \frac{1}{3} BK = \frac{1}{3} \sqrt{AB^2 + AK^2} = \frac{1}{3} \sqrt{a^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{6}}{6}$$

$$AM = \frac{2}{3} AO = \frac{1}{3} AC = \frac{1}{3} \sqrt{AD^2 + CD^2} = \frac{1}{3} \sqrt{(a\sqrt{2})^2 + a^2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$


در مثلث AMK نیز چنین داریم: $AK = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ و $AM = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ و $MK = \frac{a\sqrt{6}}{6}$. طبق قانون کسینوس ها (قضیه ۷) یعنی:

$$\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{6}}{6}\right)^2 - 2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{6} \cos x$$

و سرانجام $\frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{3} + \frac{a^2}{6} - \frac{a^2\sqrt{2}}{3} \cos x$ استنتاج می‌شود

که از آن نیز $\cos x = 0$ و در نتیجه $x = 90^\circ$ حاصل می‌شود.

بدین ترتیب BK و AC با هم زاویه قائمه می‌سازند.




شکل ۳۹


مثال ۸ • ثابت کنید که در هر مثلثی مانند ABC فاصله مرکز ارتفاعی از رأس B دو برابر فاصله مرکز دایره محیطی مثلث از ضلع AC است.

برهان • مثلث حاده الزاویه ABC را با مرکز ارتفاعی H ، مرکز دایره محیطی O ، ارتفاعات AP و BD ، و نیز با نقاط L و K به عنوان وسط اضلاع، OK و OL که عمود بر اضلاع هستند در نظر می‌گیریم

(شکل ۴۰). مثلث های ABH و KOL متشابه هستند (بدلیل $AH \parallel OL, BH \parallel OK$)؛ و از اینرو $\frac{BH}{OK} = \frac{AB}{LK}$ را داریم. پاره خط LK وسط دو ضلع $\triangle ABC$ را بهم وصل کرده و از اینرو $\frac{AB}{LK} = 2$ است. و آنگاه $\frac{AB}{OK} = 2$ بوده و مطلوب مسئله اثبات می گردد. حال فرض کنید که مثلث ABC یک مثلث منفرجه الزاویه غیر متساوی الساقین باشد. عبارات مورد استفاده برای اثبات مسئله به همان صورت حالت اول خواهد بود. (شکل ۴۱). از تشابه مثلث های ABH و KOL به $\frac{BH}{OK} = \frac{AB}{LK} = 2$ و در نتیجه به $BH = 2OK$ دست می یابیم. خطوط نقطه چین مرسوم در اشکال ۴۰ و ۴۱ را خط اولر می نامند (به تمرین شماره ۵۴ مراجعه کنید).



شکل ۴۱



شکل ۴۰

مثال ۹ • در صفحه مثلث متساوی الاضلاعی خطی را از مرکز ثقل (گرانیگاه) مثلث عبور می دهیم ثابت کنید که مجموع مربعات فاصله های رئوس مثلث از این خط مستقل از انتخاب آن است.

اثبات • فرض کنید که خط مورد نظر با قاعده AC از مثلث ABC زاویه ای برابر α تشکیل دهد (شکل ۴۲). عبارات $AO = BO = CO = a$ را در نظر می گیریم. خطوط AD ، BK و CE عمود بر این

خط مطروحه را بر حسب a و α بیان کرده و ثابت می کنیم که به ازاء هر مقدار α عبارت $AD^2 + BK^2 + CE^2$ مقداری ثابت است. از آنجا که $\angle OAC = 30^\circ$ است از اینرو

$\angle MAO = 150^\circ$ بوده و آنگاه $\alpha - 30^\circ = 180^\circ - (\alpha + 150^\circ) = \angle DOA$ را خواهیم داشت.

از $\triangle DOA$ به $AD = OA \sin \angle AOD = a \sin (30^\circ - \alpha)$ وصول می یابیم.

از $\triangle MOP$ به $\angle BOK = \angle MOP = 90^\circ - \alpha$ می رسمیم.

از $\triangle BOK$ به $BK = BO \sin \angle BOK = a \sin (90^\circ - \alpha) = a \cos \alpha$ می رسمیم.

بدلیل $\angle POE = 90^\circ + \alpha$ (زاویه خارجی $\triangle MOP$) و $\angle POC = 60^\circ$ چنین داریم:


$$\angle COE = \angle POE - \angle POC = (90^\circ + \alpha) - 60^\circ = 30^\circ + \alpha$$

از $\triangle COE$ به $CE = CO \sin \angle COE = a \sin (30^\circ + \alpha)$ چنین نتیجه می شود:

$$\begin{aligned}
 AD^2 + BK^2 + CE^2 &= a^2 \sin^2(30^\circ - \alpha) + a^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2(30^\circ + \alpha) \\
 &= a^2 \left(\frac{1 - \cos(60^\circ - 2\alpha)}{2} + \cos^2 \alpha + \frac{1 - \cos(60^\circ + 2\alpha)}{2} \right) \\
 &= a^2 \left(1 - \frac{\cos(60^\circ + 2\alpha) + \cos(60^\circ - 2\alpha)}{2} + \cos^2 \alpha \right) \\
 &= a^2 \left(1 - \cos 60^\circ \cos 2\alpha + \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \right) \\
 &= a^2 \left(1 - \frac{1}{2} \cos 2\alpha + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\alpha \right) = \frac{3}{2} a^2
 \end{aligned}$$

و بدین ترتیب به ازاء هر مقدار α نتیجه زیر بدست می آید:

$$AD^2 + BK^2 + CE^2 = \frac{3}{2} a^2$$



شکل ۴۲

مثال ۱۰. اگر در مثلث ABC میانۀ AM ، ارتفاع BH و نیمساز CD در یک نقطه متقارب باشند رابطه بین طول اضلاع a, b, c و آن مثلث را بدست آورید (شکل ۴۳).

حل. طبق قضیه سوا (قضیه ۱۰) چنین داریم: $\frac{AD}{BD} \times \frac{BM}{CM} \cdot \frac{CH}{AH} = 1$. از آنجا که M میانۀ AM است از اینرو $BM = CM$ و $\frac{BM}{CM} = 1$ خواهد بود.


بدلیل نیمساز بودن CD نیز، $\frac{AD}{BD} = \frac{b}{a}$ (قضیه ۵) خواهد بود. بدین ترتیب رابطه مفروض به شکل $\frac{b}{a} \cdot \frac{CH}{AH} = 1$ یعنی $\frac{CH}{AH} = \frac{a}{b}$ درمی آید.

با قراردادادن $CH = at$ و $AH = bt$ از طرف دیگر $at + bt = b$ یعنی $t = \frac{b}{a+b}$ را خواهیم داشت. همچنین با استفاده از BH به عنوان عنصر مرجع از $\triangle ABH$ به $BH^2 = c^2 - b^2 t^2$ و از $\triangle BHC$ به $BH^2 = a^2 - a^2 t^2$ وصول می یابیم.

از اینرو $c^2 - b^2 t^2 = a^2 - a^2 t^2$ نتیجه می شود که از آن نیز $t^2 = \frac{a^2 - c^2}{a^2 - b^2}$ بدست می آید. با جاگذاری $t = \frac{b}{a+b}$ در تساوی اخیر رابطه مطلوب بین اضلاع a, b, c بصورت زیر حاصل می شود:

$$\frac{b^2}{(a+b)^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2 - b^2}$$

$$\frac{b^2}{a+b} = \frac{a^2 - c^2}{a-b}$$



شکل ۴۳

مسائل

۱ • مثلث های قائم الزاویه

- ۱ • ثابت کنید که در مثلث قائم الزاویه نیمساز زاویه قائمه، زاویه بین ارتفاع و میانه مرسوم از همان زاویه را نصف می‌کند.
- ۲ • در مثلث قائم الزاویه میانه وارد بر وتر زاویه قائمه را به نسبت 1:2 تقسیم کرده و طول آن معادل m است. اضلاع مثلث را بیابید.
- ۳ • نقطه ای بر روی وتر مثلث قائم الزاویه که از اضلاع قائمه مثلث هم فاصله است وتر را به دو قطعه به طولهای 30 cm و 40 cm تقسیم می‌کند. طول اضلاع زاویه قائمه مثلث را بدست آورید.
- ۴ • طول اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم الزاویه 18 cm و 24 cm است. طول نیمساز زوایای حاده این مثلث را بدست آورید.
- ۵ • نیمساز زاویه قائمه مثلث قائم الزاویه ای را پیدا کنید که طول اضلاع زاویه قائمه آن a و b است.
- ۶ • نیمساز زاویه قائمه در مثلث قائم الزاویه وتر را به دو پاره خط به طول های m و n تقسیم می‌کند. طول ارتفاع وارد بر وتر را پیدا کنید.
- ۷ • در مثلث قائم الزاویه ای طول میانه های وارد بر اضلاع زاویه قائمه معادل $\sqrt{52}\text{ cm}$ و $\sqrt{73}\text{ cm}$ است. طول وتر آن را بیابید.
- ۸ • محیط مثلث قائم الزاویه ای برابر 60 cm و طول ارتفاع وارد بر وتر آن معادل 12 cm است. اضلاع زاویه قائمه این مثلث را محاسبه کنید.
- ۹ • در مثلث قائم الزاویه ABC از رأس زاویه قائمه C ، نیمساز CK و میانه CM را رسم می‌کنیم. اگر $CM = n$ و $CK = m$ باشد در آن صورت طول اضلاع زاویه قائمه را بدست آورید.
- ۱۰ • در یک مثلث قائم الزاویه اندازه یکی از زوایای حاده برابر α است. زاویه بین نیمساز و میانه مرسوم از رأس این زاویه را پیدا کنید.
- ۱۱ • در مثلث قائم الزاویه ABC ، AD و BK ، نیمساز زوایای حاده را رسم می‌کنیم. اگر $AB^2 = AD \cdot BK$ باشد زوایای مثلث را پیدا کنید.
- ۱۲ • اگر در یک مثلث غیر متساوی الساقین ارتفاع و میانه مرسوم از یک رأس مثلث در داخل مثلث واقع شده و با اضلاع آن زاویه، زاویه های متساوی درست کنند، آنگاه ثابت کنید که این مثلث، قائم الزاویه است.

۲ • مثلث های متساوی الساقین

- ۱۳ • ثابت کنید اگر در مثلثی، نسبت تانژانت دوزاویه با نسبت مربعات سینوس های این دوزاویه برابر باشد در آن صورت مثلث مطروحه یا متساوی الساقین و یا قائمه خواهد بود.

۱۴. ثابت کنید اگر در مثلثی رابطه $\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B}$ برقرار باشد آنگاه مثلث مزبور متساوی الساقین خواهد بود.

۱۵. طول قاعده مثلث متساوی الساقینی برابر $4\sqrt{2}$ cm و طول میانه وارد بر ضلع جانبی آن برابر 5 cm است. طول این ضلع را پیدا کنید.

۱۶. طول ضلع جانبی مثلث متساوی الساقینی برابر 4 cm و طول میانه وارد بر این ضلع برابر 3 cm است. طول قاعده مثلث را پیدا کنید.

۱۷. طول قاعده مثلث متساوی الساقینی برابر 12 cm و طول ضلع جانبی آن برابر 18 cm است. ارتفاعات وارد بر اضلاع جانبی را رسم می‌کنیم. طول پاره خطی را پیدا کنید که پای ارتفاعات دوسر آن است.

۱۸. طول قاعده مثلث متساوی الساقینی برابر 12 cm و طول ضلع جانبی آن برابر 18 cm است. نیمساز زوایایی از آن را که بر اضلاع جانبی وارد می‌شوند رسم می‌کنیم. پای این نیمسازها را بهم وصل می‌کنیم. طول پاره خط حاصل از اتصال پای نیمسازها را پیدا کنید.

۱۹. مجموع دو ارتفاع نامساوی از یک مثلث متساوی الساقین برابر l و اندازه تارک آن برابر α است. طول ضلع جانبی مثلث را بیابید.

۲۰. نقطه M روی ارتفاع BH از مثلث متساوی الساقین ABC ($AB = BC$) طوری انتخاب شده است که زوایای AMB ، BMC و AMC باهم برابرند. اگر زاویه مجاور به قاعده برابر α باشد، نقطه M ارتفاع مرسوم را به چه نسبتی (از طرف تارک) تقسیم می‌کند؟

۲۱. اندازه زاویه‌های مجاور به قاعده در مثلث متساوی الساقین برابر α است. نسبت قاعده به میانه وارد بر ضلع جانبی مثلث را بیابید.

۲۲. اگر در مثلث متساوی الساقینی مرکز ارتفاع وارد بر قاعده را نصف کند زوایای آن را پیدا کنید.

۲۳. خطوط l_1 ، l_2 و l_3 باهم موازی بوده و l_2 بین l_1 و l_3 قرار دارد. فاصله‌های خط وسط از خطوط دیگر بترتیب برابر p و q است. طول اضلاع مثلث متساوی الاضلاعی را پیدا کنید که هریک از رئوس آن روی هریک از سه خط مفروض قرار دارد.

۲۴. نقطه D روی ضلع AB و نقطه E روی ضلع BC مثلث متساوی الساقین ABC ($AB = BC$) طوری قرار دارند که $BD = CE$ است. ثابت کنید که وسط پاره خط DE بر خط واصل اوساط و ساق مثلث منطبق است.

۲۵. در مثلث متساوی الساقینی، اندازه زاویه تارک برابر 36° و طول قاعده آن برابر α است. طول اضلاع جانبی مثلث را پیدا کنید.

۲۶. نقطه D روی ضلع BC از مثلث متساوی الساقین ABC ($AB = BC$) طوری انتخاب شده است که $BD:DC = 1:4$ است. $BM:ME$ را پیدا کنید بطوریکه BE ارتفاع مثلث M نقطه تلاقی BE و

AD باشد.

۲۷. طول قاعده مثلث متساوی الساقینی برابر r و اندازه زاویه تارک آن برابر 2α است. طول نیمساز زاویه ای از آن را که بر ضلع جانبی وارد می شود پیدا کنید.

۲۸. خط مرسوم از یک رأس مثلث متساوی الاضلاعی ضلع مقابل را به نسبت $1:2$ تقسیم می کند. اندازه زاویه های تشکیل شده با این خط و اضلاع مجاور زاویه مزبور چقدر است؟

۲۹. زاویه مجاور قاعده مثلث متساوی الساقین برابر $\arctan \frac{3}{4}$ است. زاویه بین میانه و نیمساز مرسوم بر ضلع جانبی مثلث را بیابید.

۳۰. در مثلث متساوی الساقینی میانه وارده بر ضلع جانبی مثلث با قاعده زاویه $\arcsin \frac{3}{5}$ می سازد. زاویه تارک مثلث را پیدا کنید.

۳۱. زاویه B از مثلث متساوی الساقین ABC برابر 110° است. در داخل مثلث نقطه M را طوری انتخاب می کنیم که $\angle MAC = 30^\circ$ و $\angle MCA = 25^\circ$ باشد. زاویه BMC را محاسبه کنید.

۳. مثلث های دلخواه

۳۲. ثابت کنید اگر دو ضلع و ارتفاع یک مثلث حاده الزاویه با دو ضلع و ارتفاع مثلث حاده الزاویه دیگری برابر باشد آنگاه این دو مثلث با هم برابر خواهند بود (دو حالت را مورد بررسی قرار دهید).

۳۳. ثابت کنید اگر دو ضلع و میانه یک مثلث بترتیب با دو ضلع و میانه مثلث دیگری برابر باشد آنگاه دو مثلث با هم برابر خواهند بود (دو حالت را در نظر بگیرید).

۳۴. ثابت کنید که در هر مثلث نیمساز یک زاویه یا بر ارتفاع و میانه مرسوم از آن زاویه واقع است و یا بین آن دو قرار دارد.

۳۵. ثابت کنید که در هر مثلث مجموع میانه ها از $\frac{3}{4}$ محیط آن مثلث بزرگتر و از تمام محیط آن کوچکتر است.

۳۶. l ، خط مارآز مرکز ثقل مثلث متساوی الاضلاع ABC ، اضلاع AB و BC را قطع می کند. ثابت کنید که مجموع فواصل A و C از l با فاصله B از l برابر است.

۳۷. زاویه B از مثلث ABC برابر 115° است. از میانگاه ضلع AC عمودی را بر آن رسم می کنیم و این عمود ضلع BC را در نقطه D قطع می کند. پاره خط AD زاویه A را از طرف ضلع AB به نسبت $3:5$ تقسیم می کند. زاویه های A و C از مثلث ABC را بدست آورید.

۳۸. نیمساز زاویه مثلثی ضلع مقابل به آن زاویه را به پاره خط هایی به طول 2 cm و 4 cm تقسیم کرده و طول ارتفاع وارد بر همان ضلع نیز برابر $\sqrt{15}\text{ cm}$ است. طول اضلاع مثلث را پیدا کرده و نوع آن را تعیین کنید.

۳۹. نسبت مجموع مربعات میانه های مثلث بر مجموع مربعات اضلاع آن را بدست آورید.

۴۰. اگر در مثلثی رابطه $m_a^2 + m_b^2 = 5m_c^2$ بین میانه های آن برقرار باشد نوع مثلث را تعیین کنید.
۴۱. طول دو ضلع از مثلثی برابر a و b بوده و میانه های وارد بر این دو ضلع نیز متعامد هستند. طول ضلع سوم مثلث را بدست آورید.
۴۲. در مثلث ABC نیمساز AD را رسم می کنیم. اگر $AB = a$ ، $AC = b$ و $AD = BD$ باشد طول BC را پیدا کنید.
۴۳. در مثلث ABC ، $BC = 12\text{ cm}$ ، $AC = 8\text{ cm}$ ، زاویه A در این مثلث دو برابر زاویه B است. طول AB را محاسبه کنید.
۴۴. طول ارتفاع مثلثی برابر 6 cm بوده و ارتفاع، زاویه مربوط به خود را نیز به نسبت $2:1$ تقسیم کرده است. ارتفاع مزبور قاعده را نیز به دو قسمت تقسیم کرده است که طول کوچکترین آنها 3 cm است. اضلاع مثلث را بدست آورید.
۴۵. ارتفاع مثلثی زاویه ای را که ارتفاع از آن رسم شده است به نسبت $2:1$ قطع کرده است. این ارتفاع قاعده را نیز به پاره خط هایی تقسیم کرده است که نسبت آنها k ($k > 1$) می باشد. اندازه بزرگترین زاویه مجاور به قاعده را محاسبه کنید.
۴۶. در مثلث حاده الزاویه ABC ، زاویه حاده بین ارتفاع های AD و CE برابر α است. اگر $AD = a$ و $CE = b$ باشد آنگاه AC را بدست آورید.
۴۷. طول قاعده مثلثی برابر 4 است. طول میانه وارد بر این قاعده برابر $\sqrt{6} - \sqrt{2}$ بوده و یکی از زوایای مجاور قاعده نیز برابر 15° می باشد. زاویه حاده بین میانه و قاعده را بدست آورید.
۴۸. با استفاده از قضیه سیوا ثابت کنید که:
- (a) میانه های مثلث در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند؛
- (b) نیمسازهای زوایای مثلث در یک نقطه همدیگر را قطع می کنند.
- (c) تلاقی ارتفاعات مثلث در یک نقطه مشترک انجام می گیرد.
۴۹. خط DE موازی قاعده AC از مثلث ABC بوده و نقطه D روی ضلع AB و نقطه E روی ضلع BC قرار دارد. ثابت کنید که AE ، CD و میانه BI همدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.
۵۰. اگر طول اضلاع مثلثی یک تصاعد حسابی تشکیل دهند، آنگاه ثابت کنید که مرکز دایره محاطی این مثلث و مرکز ثقل آن روی خط مستقیمی قرار دارند که با ضلع میانی مثلث موازی است.
۵۱. در مثلث ABC ، AD ارتفاع بوده و نقطه H مرکز ارتفاعی مثلث است. ثابت کنید که:
- $$DC \cdot DB = AD \cdot DH$$
۵۲. در مثلث ABC ، زاویه A برابر 30° و زاویه B برابر 50° است. ثابت کنید که بین اضلاع آن رابطه $c^2 = b(a + b)$ برقرار است.
۵۳. ثابت کنید که در هر مثلثی تفاضل بین مجموع مربعات هر دو ضلع از آن با حاصلضرب همان دو

ضلع وزاویه بین آن دو ضلع مقداری است ثابت.

۵۴ • ثابت کنید در هر مثلث مرکز ارتفاعی، مرکز ثقل و مرکز دایره محیطی بر روی یک خط مستقیم (خط اولر) قرار دارند.

۵۵ • در مثلث های ABC و $A'B'C'$ زوایای B و B' برابر بوده و مجموع زوایای A و A' برابر 180° است. ثابت کنید که بین اضلاع این زوایا رابطه $aa' = bb' + cc'$ برقرار است.

۵۶ • در مثلث ABC اندازه A ، B ، و C با هم دارای نسبت $1:2:4$ است. ثابت کنید که بین اضلاع مثلث تساوی $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ برقرار است.

۴۷ • ارتفاع، میانه و نیمساز مرسوم از یک زاویه در مثلثی، آن زاویه را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند. اندازه زوایای مثلث را بیابید.

۵۸ • در مثلث ABC ، CD ارتفاع است. اگر $CD^2 = AD \cdot DB$ باشد آنگاه رابطه بین زوایای A و B را بیابید.

۵۹ • در مثلث ABC اندازه زاویه A برابر α و اندازه زاویه B برابر β بوده و میانه BD نیمساز CE را در نقطه K قطع می کند. $CK:KE$ را بیابید.

۴ • متوازی الاضلاع ها

۶۰ • اگر در متوازی الاضلاعی اقطار نیمسازها زوایای آن باشد آنگاه ثابت کنید که متوازی الاضلاع مزبور یک لوزی است.

۶۱ • در متوازی الاضلاعی با اضلاع a و b ($a > b$) نیمسازهای زوایای داخلی را رسم می کنیم. نوع چهارضلعی حاصله از تقاطع نیمسازها را تعیین کرده و طول اقطار این چهارضلعی را پیدا کنید.

۶۲ • در یک لوزی ارتفاع وارد بر یک ضلع آن را به دو پاره خط به طول m و n تقسیم می کند. اقطار لوزی را محاسبه کنید.

۶۳ • در یک متوازی الاضلاع عمود مرسوم از یک رأس آن بر یک قطر متوازی الاضلاع، قطر را به دو پاره خط به طول های 6 cm و 15 cm تقسیم می کند. اگر تفاضل بین دو ضلع غیر متوازی الاضلاع برابر 7 cm باشد در آن صورت طول اضلاع و اقطار متوازی الاضلاع را محاسبه کنید.

۶۴ • از یکی از زوایای منفرجه متوازی الاضلاعی دو ارتفاع بترتیب با طول های p و q رسم می کنیم. زاویه بین این دو ارتفاع برابر α است. طول قطر اطول متوازی الاضلاع را محاسبه کنید.

۶۵ • قطر مرسوم از یک زاویه مستطیلی آن زاویه را به نسبت $m:n$ تقسیم کرده است. نسبت محیط مستطیل را بر قطر آن پیدا کنید.

۶۶ • اندازه زاویه حاده متوازی الاضلاعی برابر α و طول اضلاع غیر موازی آن برابر a و b است. تانژانت زوایای حاده ای که با قطر اطول و اضلاع متوازی الاضلاع تشکیل می شود محاسبه کنید.

۶۷. اگر در لوزی $ABCD$ خط مستقیم مرسوم از رأس A زاویه BAD را به نسبت $1:3$ وضع BC را به نسبت $3:5$ قطع کند آنگاه اندازه زوایای حاده و لوزی را پیدا کنید.
۶۸. نسبت محیط یک لوزی به مجموع اقطار آن برابر k است. زوایای لوزی را بیابید.
۶۹. اقطار یک متوازی الاضلاع با اضلاع غیر موازی آن متناسب است. ثابت کنید که زوایای بین اقطار با زوایای متوازی الاضلاع مساوی است.
۷۰. در مستطیل $ABCD$ ، قاعده AD را با نقاط M و P به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. اگر $AD = 3AB$ باشد آنگاه ثابت کنید که حاصل جمع زوایای AMB ، APB برابر 90° است.
۷۱. اضلاع یک متوازی الاضلاع برابر a و b ($a < b$) است. قطر اقصی متوازی الاضلاع با ضلع کوچکتر آن یک زاویه منفرجه و با ضلع بزرگتر متوازی الاضلاع زاویه ای برابر α می‌سازد. قطر اطول متوازی الاضلاع را بیابید.
۷۲. نسبت اضلاع یک متوازی الاضلاع بصورت $p:q$ بوده و قطرهای آن نیز دارای نسبت $m:n$ است. زوایای متوازی الاضلاع را بیابید.
۷۳. نسبت محیط یک متوازی الاضلاع بر قطر اطول آن برابر k است. اگر قطر اطول زوایای متوازی الاضلاع را به نسبت $1:2$ تقسیم کند آنگاه اندازه زوایای آن را بیابید.

۵. دوزنقه‌ها

۷۴. ثابت کنید که اگر اضلاع یک دوزنقه با اضلاع متناظر به آنها در دوزنقه دیگر برابر باشد آنگاه آن دو دوزنقه متساوی خواهند بود.
۷۵. قضیه زیر را ثابت کنید: برای متساوی الساقین بودن یک دوزنقه لازم و کافی است که: (a) زوایای مجاور به قاعده با هم متساوی باشند، (b) اقطار دوزنقه برابر باشند.
۷۶. ثابت کنید که نیمسازهای دوزنقه مجاور به ضلع جانبی دوزنقه با هم زاویه قائمه تشکیل می‌دهند و نقطه تقاطع آنها بر روی خط واصل اوساط دو ضلع غیر موازی دوزنقه واقع است.
۷۷. مجموع زوایای مجاور، به قاعده بزرگ دوزنقه ای برابر 90° است. ثابت کنید که خط واصل اوساط دو قاعده با نصف تفاضل دو قاعده برابر است.
۷۸. اقطار یک دوزنقه مساوی و متعامد هستند و طول ارتفاع آن برابر 15 cm است. طول میانه دوزنقه را پیدا کنید.
۷۹. طول یکی از قاعده‌های دوزنقه ای برابر 24 cm و فاصله بین اوساط اقطار آن نیز معادل 4 cm است. طول قاعده دیگر دوزنقه را پیدا کنید.
۸۰. یکی از زوایای دوزنقه ای برابر 30° بوده و اضلاع جانبی آن بر هم عمود هستند. اگر طول میانه دوزنقه برابر 10 cm و طول یکی از قاعده‌های آن برابر 8 cm باشد در این صورت طول ضلع جانبی کوچکتر

آن را پیدا کنید.

۸۱. در یک دوزنقه قائم الزاویه طول قاعده‌ها و ضلع جانبی کوچکتر برابر a ، b و c است. طول ضلع جانبی کوچکتر و فاصله نقطه تلاقی اقطار از قاعده‌های دوزنقه را پیدا کنید.

۸۲. نقطه تلاقی نیمسازهای زوایای منفرجه دوزنقه ای روی قاعده مقابل قرار دارد و طول آنها 13 cm و 15 cm است. اگر طول ارتفاع دوزنقه برابر 12 cm باشد آنگاه طول اضلاع دوزنقه را بیابید.

۸۳. طول ارتفاع دوزنقه متساوی الساقینی برابر h و زاویه حاده بین اقطار آن نیز برابر 2α است. طول میانه دوزنقه را پیدا کنید.

۸۴. در دوزنقه $ABCD$ ، زوایای A و B قائمه بوده و $AB=5\text{ cm}$ ، $BC=1\text{ cm}$ و $AD=4\text{ cm}$ است. نقطه M را روی ضلع AB طوری اختیار می‌کنیم که زاویه AMD دو برابر BMC شود. نسبت $AM:MB$ را بیابید.

۸۵. اندازه زاویه A از دوزنقه $ABCD$ برابر α و طول ضلع جانبی AB دو برابر قاعده کوچکتر BC است. زاویه BAC را بدست آورید.

۸۶. طول قاعده بزرگتر دوزنقه برابر a ، طول اضلاع جانبی آن برابر b و c ($b < c$) و نسبت زوایای مجاور به قاعده بزرگتر عبارت از $2:1$ است. طول قاعده کوچکتر دوزنقه را محاسبه کنید.

۸۷. اقطار AC و BD از دوزنقه $ABCD$ ($AD \parallel BC$) در نقطه O همدیگر را قطع می‌کنند و زاویه AOD از آن برابر 60° است. ثابت کنید که نقاط K ، M و P که بترتیب میانگانه پاره خط‌های AO ، BO و CD هستند رئوس یک مثلث متساوی الاضلاع می‌باشند.

۸۸. ثابت کنید که مجموع مربعات اقطار یک دوزنقه با دو برابر حاصلضرب قاعده‌ها به اضافه مجموع مربعات اضلاع جانبی دوزنقه برابر است.

۸۹. ثابت کنید که اگر نقطه تلاقی امتداد اضلاع جانبی دوزنقه را به نقطه تلاقی اقطار آن وصل کنیم خط حاصل قاعده‌های دوزنقه را نصف می‌کند.

۹۰. در دوزنقه ای با قاعده‌های a و b خطی از نقطه تلاقی اقطار به موازات قاعده‌ها رسم می‌کنیم. طول قطعه ای از این خط را که بین اضلاع جانبی دوزنقه محصور است بدست آورید.

۹۱. در دوزنقه $ABCD$ ، هر یک از قاعده‌های AD و BC را در هر دو جهت امتداد می‌دهیم. نیمساز زوایای خارجی A و B در نقطه K و نیمساز زوایای خارجی C و D در نقطه E همدیگر را قطع می‌کنند. محیط دوزنقه را با توجه به $KE = 20\text{ cm}$ بدست آورید.

۹۲. از نقطه O محل تلاقی اقطار متعامد دوزنقه $ABCD$ ($AD \parallel BC$) خط MK را عمود بر ضلع CD رسم می‌کنیم (نقطه M روی AB ، و نقطه K روی CD قرار دارد). اگر $AD = 40\text{ cm}$ و $BC = 30\text{ cm}$ باشد آنگاه MK را پیدا کنید.

۶. مسائل گوناگون

۹۳. در چهارضلعی $ABCD$ نقاط E, K, P و M بترتیب میانگاه اضلاع AB, BC, CD و AD هستند. ثابت کنید که چهارضلعی $PKEM$ یک متوازی الاضلاع است.

۹۴. روی اضلاع زاویه قائمه AC و BC از مثلث قائم الزاویه ABC مربعات $ADKC$ و $CEMB$ را رسم می‌کنیم. عمودهای DH و MP را از نقاط D و M بر امتداد وتر AB وارد می‌کنیم. ثابت کنید که:
 $DH + MP = AB$

۹۵. بر روی اضلاع یک متوازی الاضلاع و بیرون آن چهار مربع رسم می‌کنیم. ثابت کنید اگر مرکز این مربعات را به ترتیب بهم وصل کنیم چهارضلعی حاصل نیز یک مربع خواهد بود.

۹۶. در درون مثلث قائم الزاویه ای با اضلاع زاویه قائمه a و b مربعی را محاط کرده ایم که با مثلث در یک زاویه قائمه مشترک است. محیط مربع را بدست آورید.

۹۷. در یک مثلث قائم الزاویه، لوزی ای را طوری محاط کرده ایم که همه رئوس آن روی اضلاع مثلث واقع بوده و آنها در یک زاویه 60° درجه ای باهم مشترک هستند. اگر طول هر یک از اضلاع لوزی 6cm باشد طول اضلاع مثلث را بیابید.

۹۸. یک لوزی را در درون مثلثی طوری محاط کرده ایم که در یک زاویه مشترک بوده و زاویه مقابل به این زاویه لوزی، ضلع مثلث را به پاره خط هایی با نسبت $2:3$ تقسیم می‌کند. طول اضلاع مثلث را که اضلاع زاویه مشترک بین لوزی و مثلث محسوب می‌شوند پیدا کنید با این شرط که اقطار لوزی برابر m باشند.

۹۹. در مثلثی با اضلاع جانبی 9cm و 15cm متوازی الاضلاعی را طوری محاط کرده ایم که یکی از اضلاع آن به طول 6cm روی قاعده مثلث قرار داشته و اقطار آن موازی اضلاع جانبی مثلث است. طول اضلاع دیگر متوازی الاضلاع و نیز طول قاعده مثلث را بدست آورید.

۱۰۰. در داخل مربع $ABCD$ مثلث AKM را طوری محاط کرده ایم که نقطه K روی ضلع BC و نقطه M روی ضلع CD قرار گرفته و $AM = AK$ است. اگر $\angle AKM = 3^\circ$ باشد در آنصورت اندازه زاویه $\angle MAD$ را بدست آورید.

۱۰۱. در داخل مثلث متساوی الاضلاع ABC ، مثلث متساوی الاضلاع DEK را طوری محاط کرده ایم که نقطه D روی ضلع BC ، نقطه E روی ضلع AC و نقطه K روی ضلع AB قرار دارد. اگر $\angle DEC = \alpha$ باشد نسبت $AB:DE$ را بدست آورید.

۱۰۲. در یک چهارضلعی محدب میانگاه های اضلاع روبرو را دبدو بهم وصل می‌کنیم و همچنین میانگاه های اقطار این متوازی الاضلاع را بهم متصل می‌کنیم. ثابت کنید که این خطوط در یک نقطه همدیگر را قطع کرده و نقطه مزبور میانگاه آنها محسوب می‌شود.

۱۰۳. ثابت کنید که در یک چهارضلعی محدب، میانگاه های اقطار و میانگاه های خطوطی که

میانگانه‌های اضلاع مقابل آن را بهم وصل می‌کنند بر روی یک خط مستقیم قرار دارند.

۱۰۴. اگر در یک چهارضلعی مجموع مربعات دو ضلع روبرو با مجموع مربعات دیگر برابر باشد آنگاه ثابت کنید که اقطار این چهارضلعی بر هم عمود هستند.

۱۰۵. ثابت کنید اگر در یک متوازی‌الاضلاع خط واصل میانگانه‌های دو ضلع مقابل با نصف مجموع دو ضلع دیگر برابر باشد آنگاه چهارضلعی مزبور یک ذوزنقه خواهد بود.

۱۰۶. قاعده‌های دو مثلث متساوی‌الاضلاع با طول ضلع a و $3a$ روی دو طرف یک خط مستقیم قرار دارند. فاصله دو رأس از قاعده‌ها که دورترین آنها از همدیگر محسوب می‌شوند معادل $2a$ است. فاصله رؤس دو مثلث را که روی خط مفروض قرار ندارند بدست آورید.

۱۰۷. در چهارضلعی $ABCD$ ، $AB = \sqrt{3}$ ، $BC = 3$ ، $\angle A = \angle D = 60^\circ$ و $CD = 2\sqrt{3}$ را داریم. زوایای B و C را بدست آورید.

۱۰۸. اقطار چهارضلعی محدب $ABCD$ در نقطه O با زوایای قائمه همدیگر را قطع می‌کنند و $AO = 8$ cm، $BO = CO = 1$ cm و $DO = 7$ cm است. امتداد اضلاع AB و CD همدیگر را در نقطه M قطع می‌کنند. زاویه AMD را بدست آورید.

۱۰۹. در چهارضلعی $ABCD$ ، B زاویه قائمه بوده و $AB:BD = 2:4\sqrt{2}$ است. امتدادهای اضلاع AD و BC همدیگر را در نقطه M قطع می‌کنند. با شرط $\angle ABD = 45^\circ$ اندازه زاویه DMC را بدست آورید.

۱۱۰. در داخل مستطیل $ABCD$ مثلث AEK را طوری محاط کرده‌ایم که نقطه E روی BC و نقطه K روی CD قرار دارد. اگر $\frac{AB}{BC} = \frac{BE}{CE} = \frac{CK}{DK} = m$ باشد آنگاه تاثرات زاویه $\angle EAK$ را بدست آورید.


بخش ۳ • دایره‌ها

مثال ۱. اگر a و b اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم الزاویه و c طول وتر و r شعاع دایره محاطی آن باشد آنگاه ثابت کنید که: $\frac{a+b-c}{2}$

حل. خطوط کمکی زیر را که لازم هستند رسم می‌کنیم: از نقطه O مرکز دایره محاطی شعاع‌های OE ، OF و OD را به نقاط تماس وصل می‌کنیم. آنگاه $OE \perp AC$ ، $OF \perp AB$ و $OD \perp BC$ خواهد بود (شکل ۴۴).

از آنجا که $ODCE$ یک مربع است (همه زوایای آن قائمه بوده و $OE = OD$ است) از اینرو $AE = AF$ و $BD = BF$ ولی $AE = b - r$ و $CE = CD = r$. $BD = a - r$ (طبق قضیه ۱۲b) بوده و از اینرو $BF = a - r$ و $AF = b - r$ خواهد بود. بدلیل $AB = BF + AF$ یعنی $c = (a - r) + (b - r)$ به $r = \frac{a+b-c}{2}$ وصول می‌یابیم.

توجه: فرمول حاصله را می‌توان در مورد مسائل مربوط به مثلث‌های قائم الزاویه مورد استفاده قرار داد.



شکل ۴۴

مثال ۲ • دایره ای در درون مثلثی با محیط 18 cm محاط شده است. خطی بر این دایره به موازات قاعده مثلث مماس می‌کنیم. طولی از این خط که بین دو ضلع جانبی مثلث محدود شده است برابر 2 cm می‌باشد. طول قاعده مثلث را بدست آورید.

حل • M, P, N و نقاط تماس دایره و مثلث در نظر می‌گیریم (شکل ۴۵). آنگاه $AM = AN$ ، $BP = BM$ و $CN = CP$ (قضیه ۱۲). با منظور کردن $CN = CP = y$ ، $AM = AN = x$ و $BP = BM = z$ محیط مثلث برابر $2x + 2y + 2z = 9$ بوده و در نتیجه $x + y + z = 9$ خواهد بود.

مماس DE بر دایره را به موازات AC رسم می‌کنیم. آنگاه مثلث‌های ABC و DBE متشابه بوده و بنابراین نسبت اضلاع آنها با نسبت محیط‌ها برابر خواهد بود: $\frac{DE}{AC} = \frac{P_{DBE}}{P_{ABC}}$ ؛ یعنی چنین خواهیم داشت:

$$\frac{2}{x+y} = \frac{P_{DBE}}{18} \quad (1)$$

بطوریکه در آن داریم.


$$P_{DBE} = BD + BE + DE = BD + BE + (DK + KE) = BD + BE + (DM + EP)$$

(در اینجا از تساوی‌های $DM = DK$ و $KE = EP$ استفاده شده است).


از اینرو و $P_{DBE} = (BD + DM) + (BE + EP) = BM + BP = 2z$ بصورت $\frac{2}{x+y} = \frac{2z}{18}$ باز نوشت.

بدین ترتیب دستگاه معادلات $\begin{cases} x + y + z = 9 \\ \frac{2}{x+y} = \frac{z}{9} \end{cases}$ بدست می‌آید. با منظور کردن $x + y = b$ به

$$\left\{ \begin{array}{l} b + z = 9 \\ bz = 18 \end{array} \right. \text{ وصول می‌یابیم که از آن نیز } b = 3 \text{ cm یا } b = 6 \text{ cm بدست می‌آید.}$$



شکل ۴۵




شکل ۴۶

مثال ۳ • از نقطه A مربوط به وتر مشترک AB بین دو دایره، خط مستقیمی رسم می‌کنیم. این خط دایره اول را در C و دایره دوم را در D قطع می‌کند. خط مماس بر دایره اول در نقطه C و خط مماس بر دایره دوم در نقطه D ، همدیگر را در M قطع می‌کنند. ثابت کنید که نقاط M, C, B, D روی یک دایره قرار دارند (شکل ۴۶).

حل • کافی است که $\angle CMD + \angle CBD = 180^\circ$ (قضیه ۱۵۵) را ثابت کنیم. چنین داریم:
 $\angle CBA = \frac{1}{2} \cup AC$ (زاویه محاطی) و $\angle MCA = \frac{1}{2} \cup AC$ (زاویه ظلّی).
 از اینرو $\angle CBA = \angle MCA$ بوده و بطریق مشابه $\angle ABD = \angle ADM$ ثابت می‌گردد. از مثلث MCD نتیجه می‌گیریم که $\angle CMD + \angle MCD + \angle MDC = 180^\circ$ است.
 $\angle MCD + \angle MDC = \angle CBA + \angle ABD = \angle CBD$ را نیز داریم.
 از اینرو $\angle CMD + \angle CBD = 180^\circ$ استنتاج می‌شود که مطلوب مسئله بود.

مثال ۴ • در دایره ای مثلث متساوی الساقین ABC محاط شده است که طول قاعده آن $AC = b$ و اندازه زوایای مجاور به قاعده در آن برابر α است. دایره دیگری را بر قاعده مثلث و دایره اول مماس می‌کنیم. نقطه تماس این دایره با مثلث بر میانگانه قاعده آن یعنی نقطه D منطبق است. شعاع دایره دوم را محاسبه کنید (شکل ۴۷).



شکل ۴۷


حل • از تساوی $AD \cdot DC = BD \cdot DK$ (قضیه ۱۶۸) استفاده می‌کنیم.

بدلیل $AD = DC = \frac{b}{2}$ ، $BD = \frac{b}{2} \tan \alpha$ و $DK = 2r$ به $\frac{b^2}{4} = \frac{b}{2} \tan \alpha \cdot 2r$ وصول می‌یابیم که از آن نیز $r = \frac{b}{4} \cot \alpha$ نتیجه می‌شود.

مثال ۵ • دایره ای به شعاع R را از دور رأس مجاور مربعی عبور داده ایم. از رأس سوم مربع مماسی را بر دایره رسم کرده ایم. طول این مماس دو برابر ضلع مربع است. طول ضلع مربع را بدست آورید.


حل • بعد از منظور کردن $AB = x$ و $BM = 2x$ (شکل ۴۸) پاره خط AB را امتداد می‌دهیم تا دایره را در نقطه K قطع کند. آنگاه $BK \cdot AB = BM^2$ (قضیه ۱۶۷) یعنی $BK \cdot x = 4x^2$ را خواهیم داشت که از آن نیز $BK = 4x$ و در نتیجه $AK = 3x$ استنتاج می‌شود. زاویه KAD معادل 90° بوده و در نتیجه KD قطر

دایره خواهد بود. از مثلث قائم الزاویه ADK به تساوی $AD^2 + AK^2 = KD^2$ یعنی $x^2 + 9x^2 = 4R^2$ و وصول می‌یابیم که از آن نیز $x = \frac{R\sqrt{10}}{5}$ حاصل می‌شود.



شکل ۴۸

مثال ۶. قطاع قائم الزاویه ای از یک دایره مفروض است. به شعاع همین دایره و به مرکز واقع در نقطه انتهایی کمان قطاع، دایره ای رسم می‌کنیم. این دایره، قطاع مفروض را به دو مثلث خمیده تقسیم می‌کند. دایره ای را در مثلث کوچک محاط می‌کنیم. شعاع دایره محاطی و قطاع دایره را پیدا کنید.




شکل ۴۹

حل. تمام خطوطی را که به هنگام بحث در مورد دو دایره مماس داخلی یا خارجی، و یا خط مماس بر یک دایره ضروری هستند، رسم می‌کنیم: عبارت از خط مرکزین، B عبارت از نقطه تماس، O_1O_3 عبارت از خط مرکزین، A نقطه تماس، O_3C عمود بر O_1C ، و C نقطه تماس است (شکل ۴۹).

تساوی $O_1O_2 = R$ (پارامتر کمکی) را منظور کرده r ، شعاع دایره محاطی را بر حسب R بیان می‌کنیم، مثلث $O_1O_2O_3$ را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. $O_1O_2 = R$ ، $O_1O_3 = R - r$ و $O_2O_3 = R + r$ را داریم. اگر ارتفاع O_3H را رسم کنیم آنگاه $O_1H = O_3C = r$ و $O_2H = R - r$ خواهد بود. O_3H را به عنوان عنصر مرجع اختیار می‌کنیم.

از مثلث O_1O_3H به $r^2 = O_1O_3^2 - O_1H^2 = (R - r)^2 - r^2$ وصول می‌یابیم. از مثلث O_3HO_2 نیز $O_3H^2 = O_2O_3^2 - O_2H^2 = (R + r)^2 - (R - r)^2$ استنتاج می‌شود. بدین ترتیب $(R - r)^2 - r^2 = (R + r)^2 - (R - r)^2$ را خواهیم داشت که از آن نیز $r = \frac{R}{6}$ حاصل شده و در نتیجه $\frac{r}{R} = \frac{1}{6}$ خواهد بود.

مثال ۷. دو دایره به شعاع های r و R در خارج هم، مماس بوده AB و CD مماس های مشترک خارجی آنها هستند. ثابت کنید که در چهارضلعی $ABCD$ می‌توان یک دایره را محاط کرد. شعاع این دایره را پیدا کنید (شکل ۵۰).




شکل ۵۰

حل ● همه ترسیمات کمکی ضروری را انجام می‌دهیم. خطوط مماس را امتداد می‌دهیم تا همدیگر را در نقطه O قطع کرده و خط مرکزین OO_1O_2 را رسم می‌کنیم. سپس شعاع‌های O_1D و O_2C را بر نقاط تماس رسم می‌کنیم: $O_1D \perp CD$ و $O_2C \perp CD$. از آنجا که خط مرکزین محور تقارن شکل محسوب می‌شود از این رونقاط A و D و نقاط B و C نسبت به محور OO_2 دو بدو متقارن خواهند بود. این نکته بدین معنی است که $ABCD$ دوزنقه متساوی الساقین است. برای محاط کردن دایره‌ای در دوزنقه $ABCD$ لازم و کافی است که تساوی $AD + BC = AB + CD$ (قضیه ۱۶b) یا بدلیل $AB = CD$ تساوی $AB = \frac{AD + BC}{2}$ متقاعد شود. از اینرو کافی است که ثابت کنیم پاره خط AB میانه دوزنقه مزبور به حساب می‌آید. اگر مماس مشترک داخلی KP را رسم کنیم آنگاه:

$CP = PM$ و $DP = PM$ ، $BK = KM$ ، $AK = KM$ معنی است که KP میانه دوزنقه $ABCD$ بوده و $KP = AB$ است. بدین ترتیب می‌توان در دوزنقه دایره‌ای را محاط کرد که EF قطر آن باشد. اگر $O_1E = x$ و $O_2F = y$ را منظور کنیم آنگاه از تساوی $MF = ME$ (میانه KP پاره خط EF را نصف می‌کند) نتیجه می‌شود که $R - y = r + x$ است. از تشابه مثلث‌های O_2CF و O_1DE به $\frac{O_1E}{O_2F} = \frac{O_1D}{O_2C}$ یعنی $\frac{x}{y} = \frac{r}{R}$ وصول می‌یابیم.

از دستگاه معادلات
$$\begin{cases} R - y = r + x \\ \frac{x}{y} = \frac{r}{R} \end{cases}$$
 درمی‌یابیم که $y = \frac{R^2 - rR}{R - r}$ بوده و آنگاه شعاع دایره محاطی برابر

$$R - y = \frac{2Rr}{R + r} \text{ خواهد بود.}$$



شکل ۵۱

مثال ۸ ● زاویه حاده‌ای از مثلث قائم الزاویه برابر α است. اگر شعاع دایره مماس بر وتر و امتداد اضلاع قائمه این مثلث برابر R باشد در آنصورت طول وتر مثلث مفروض را بدست آورید (شکل ۵۱).


حل • بدلیل $AB = AK + BK$ مسئله به محاسبه پاره خط های AK (از $\triangle AOK$) و BK (از $\triangle OBK$) تحویل می یابد. مثلث AOK را مورد ملاحظه قرار می دهیم. بدلیل $\angle KOF = \angle BAC = \alpha$ (به عنوان زوایایی که اضلاع آنها بر هم عمود هستند) چنین داریم: $\angle KOA = \frac{\alpha}{2}$ ($\triangle KOA = \triangle AOF$). از اینرو $AK = OK \tan \frac{\alpha}{2} = R \tan \frac{\alpha}{2}$ چنین داریم: $\angle BOK = \frac{1}{2} \angle DOK = \frac{1}{2} (90^\circ - \angle KOF) = 45^\circ - \frac{\alpha}{2}$. (در اینجا از این حقیقت استفاده کرده ایم که در چهارضلعی $ODCF$ سه زاویه D, C, F قائمه بوده و از اینرو زاویه چهارم یعنی زاویه DOF نیز قائمه خواهد بود). آنگاه چنین خواهیم داشت:

$$BK = OK \tan \angle BOK = R \tan \left(45^\circ - \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$AB = AK + BK = R \tan \frac{\alpha}{2} + R \tan \left(45^\circ - \frac{\alpha}{2} \right) = R \frac{\sin \left(\frac{\alpha}{2} + 45^\circ - \frac{\alpha}{2} \right)}{\cos \frac{\alpha}{2} \cos \left(45^\circ - \frac{\alpha}{2} \right)} =$$

$$\frac{R\sqrt{2}}{2 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \left(45^\circ - \frac{\alpha}{2} \right)}$$

(در اینجا فرمول $\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$ بکار گرفته شده است).



شکل ۵۲

مثال ۹ • مثلث حاده الزاویه ABC با زوایای α و $\angle A$ و $\angle C = \gamma$ ، $\angle B = \beta$ مفروض است (شکل ۵۲). ارتفاع مرسوم از رأس A توسط مرکز ارتفاعی مثلث به چه نسبتی تقسیم می شود؟


حل • دایره ای را بر مثلث ABC محیط کرده و شعاع آن را با R (پارامتر کمکی) نشان می دهیم. سپس OP را بر BC عمود کرده و از تساوی $AH = 2OP$ (مثال ۸ بخش ۲ را نگاه کنید) استفاده می کنیم که در آن H مرکز ارتفاعی است. مثلث OPB را مورد ملاحظه قرار می دهیم. از آنجا که اندازه زاویه $\angle KOB$ با کمان BK اندازه گرفته می شود و $\angle BOK = \frac{1}{2} \angle BOC$ بوده و زاویه $\angle CAB$ برابر نصف کمان BC است از اینرو چنین داریم: $\angle KOB = \angle CAB = \alpha$. آنگاه $OP = R \cos \alpha$ بوده و بنابراین $AH = 2R \cos \alpha$ خواهد بود. طبق قانون سینوس ها $\frac{AC}{\sin \angle ABC} = 2R$ (قضیه ۸) بوده و از اینرو $AD = AC \sin \angle ACB = 2R \sin \beta \sin \gamma$ که آنگاه از $\triangle ACD$ درمی یابیم که $AH = 2R \cos \alpha$ بوده و در نتیجه چنین داریم:

$$HD = AD - AH = 2R \sin \beta \sin \gamma - 2R \cos \alpha = 2R (\sin \beta \sin \gamma - \cos (180^\circ - (\beta + \gamma))) = 2R (\sin \beta \sin \gamma + \cos (\beta + \gamma)) = 2R (\sin \beta \sin \gamma \times \cos \beta \cos \gamma - \sin \beta \times \sin \gamma) = 2R \cos \beta \cos \gamma$$

بدین ترتیب تساوی زیر استنتاج می‌شود:

$$\frac{AH}{HD} = \frac{2R \cos \alpha}{2R \cos \beta \cos \gamma} = \frac{\cos \alpha}{\cos \beta \cos \gamma}$$


مثال ۱۰ • ثابت کنید که اگر در یک مثلث غیر متساوی الساقین ارتفاع و میانه مرسوم از یک رأس واقع در درون مثلث با اضلاع جانبی آن زوایای متساوی تشکیل دهند آنگاه این مثلث، قائم الزاویه خواهد بود.



شکل ۵۳

حل • دایره ای را بر مثلث مفروض ABC محیط کرده، ارتفاع BD و میانه BM را امتداد می‌دهیم تا دایره را بترتیب در نقاط E و K قطع کنند (شکل ۵۳). بدلیل $\angle ABE = \angle KBC$ به $\cup AE = \cup KC$ وصول یافته و وترهای AC و EK که کمان‌های مساوی را بین خود محصور کرده‌اند باهم مساوی خواهند بود. ولی $\angle BDM = 90^\circ$ را داریم که بنا بر آن $\angle BEK = 90^\circ$ بوده و از اینرو BK قطر دایره خواهد بود. بدلیل اینکه مرکز دایره محیطی از یک طرف روی قطر BK و از طرف دیگر روی عمود مرسوم از M بر AC قرار دارد، از اینرو خود نقطه M مرکز دایره خواهد بود. بنا بر این AC قطر دایره بوده و در نتیجه $\angle ABC = 90^\circ$ خواهد بود.

مثال ۱۱ • در مثلث حاده الزاویه ABC ، AD و CM ارتفاعات آن بوده، محیط مثلث MBD برابر 15cm ، محیط مثلث MBD برابر 9cm و شعاع دایره محیط بر مثلث MBD نیز معادل 1.5cm است. طول AC را محاسبه کنید (شکل ۵۴).



شکل ۵۴

حل • قبل از هر چیزی ثابت می‌کنیم که مثلث‌های ABC و MBD متشابه هستند. درحقیقت مثلث‌های ABD و MBC قائم الزاویه بوده و هر دو در زاویه حاده B مشترک هستند. از اینرو آنها باهم متشابه بوده و در نتیجه $\frac{AB}{BC} = \frac{BD}{BM}$ خواهد بود. آنگاه در مثلث‌های ABC و MBD با زاویه مشترک B

اضلاع این زاویه متناسب بوده و در نتیجه مثلث های مزبور متشابه خواهند بود. حال از این نکته استفاده می‌کنیم که در مثلث های متشابه، نسبت محیط ها و نسبت شعاع های دایره های محیطی با نسبت تشابه آنها برابر است. طبق فرض $P_{MBD} = 9 \text{ cm}$ و $P_{ABC} = 15 \text{ cm}$ بوده و از اینرو نسبت تشابه برابر $\frac{5}{3}$ خواهد بود. بدلیل اینکه شعاع دایره محیط بر مثلث MBD برابر 1.8 cm است از اینرو در می‌یابیم که شعاع دایره محیط بر مثلث ABC برابر $1.8 \cdot \frac{5}{3} = 3 \text{ cm}$ خواهد بود. اگر O را مرکز دایره محیط بر مثلث ABC و OP را عمود بر AC در نظر بگیریم، آنگاه $BH = 2OP$ (به قضیه ۸ بخش ۲ مراجعه کنید) خواهد بود. ولی BH قطر دایره محیط بر مثلث MBD (بدلیل اینکه زاویه BDH برابر 90° است) بوده و از اینرو $BH = 3.6 \text{ cm}$ و در نتیجه $OP = 1.8 \text{ cm}$ خواهد بود. حال در مثلث قائم الزاویه AOP دو ضلع یعنی $AO = 3$ (شعاع دایره محیطی) و $OP = AO = 3 \text{ cm}$ معلوم است.

آنگاه $AP = \sqrt{9 - \left(\frac{9}{5}\right)^2} = \frac{12}{5} \text{ cm}$ و در نتیجه $AC = 4.8 \text{ cm}$ خواهد بود.

مسائل

۱. دایره‌ها

۱۱۱. دو دایره در نقطه A بر یکدیگر مماس خارجی بوده و BC خط مماس مشترک آنهاست. ثابت

کنید که: $\angle BAC = 90^\circ$

۱۱۲. دو دایره در نقاط A و B متقاطع هستند. خط l دایره‌ها را در نقاط C, D, E و M قطع می‌کند.

نقاط A و B در طرفین این خط قرار دارند. ثابت کنید که مجموع زوایای DBE و CAM برابر 180° است.

۱۱۳. دو دایره همدیگر را در نقاط A و B قطع می‌کنند. دو خط l_1 و l_2 موازی بوده، l_1 از نقطه A عبور

کرده و دایره‌ها را در نقاط E و A قطع می‌کند. خط l_2 نیز از نقطه B عبور کرده و دایره‌ها را در M و P قطع می‌کند. ثابت کنید چهار ضلعی $EKMP$ متوازی الاضلاع است.

۱۱۴. بر دایره‌ای به مرکز O از نقطه M دو خط مماس MA و MB را رسم می‌کنیم. خط مستقیم l بر

دایره در نقطه C مماس شده و MA و MB را بر ترتیب در نقاط D و E قطع می‌کند. ثابت کنید که: (a) محیط مثلث MDE از انتخاب نقطه C مستقل است؛ (b) اندازه زاویه DOE به انتخاب نقطه C وابسته نیست.

۱۱۵. نقاط A, B, C, D دایره‌ای را به نسبت $1:3:5:6$ تقسیم می‌کنند. زاویه بین مماس های

مرسوم بر دایره در نقاط A, B, C, D را پیدا کنید.

۱۱۶. دو دایره مساوی با یک دایره دوبرو مماس هستند. شعاع دایره سوم برابر 8 cm است. طول خط

واصل نقاط تماس دایره سوم با دو دایره مساوی برابر 12 cm است. شعاع دایره های مساوی را بیابید.

۱۱۷. وتر مشترک دو دایره متقاطع به طول a نقش یک ضلع شش ضلعی منتظم محاط در یکی از

دایره‌ها و نیز نقش یک ضلع مربع محاط در دایره دیگر را ایفاء می‌کند. طول خط‌المرکزین دودایره را بدست آورید.

۱۱۸ • دودایره با شعاع‌های r و R برهم مماس خارجی هستند. طول مماس مشترک خارجی آنها را بدست آورید.

۱۱۹ • دودایره با شعاع r و R برهم مماس خارجی هستند. خط دایره‌ها را در نقاط A, B, C, D با شرط $AB = BC = CD$ قطع می‌کند. طول AD را پیدا کنید.

۱۲۰ • دودایره که نسبت شعاع‌های آنها ۱:۳ است برهم مماس خارجی بوده و طول مماس مشترک خارجی آنها برابر $6\sqrt{3}$ cm است. محیط شکل حاصل از مماس‌های خارجی و کمان‌های واقع در خارج مماس‌ها را بدست آورید.

۱۲۱ • از نقطه‌ای قاطعی را بر دایره‌ای رسم می‌کنیم که طول آن ۴۸ cm است. از همین نقطه مماسی بر دایره رسم می‌کنیم که طول آن $\frac{2}{3}$ برابر طولی از خط قاطع است که در داخل دایره قرار دارد. اگر فاصله قاطع از مرکز دایره ۲۴ cm باشد در آن صورت شعاع دایره را پیدا کنید.

۱۲۲ • مماس مشترک دودایره مماس خارجی با خط‌المرکزین دایره‌ها زاویه‌ای برابر α درست می‌کند. نسبت شعاع‌های دودایره را پیدا کنید.

۱۲۳ • از نقطه A واقع در خارج دایره‌ای به مرکز O دو قاطع ABC و AMK را رسم می‌کنیم. نقاط B و M محل تلاقی قاطع‌ها و دایره از دو نقطه دیگر محل تلاقی آنها به نقطه A نزدیک‌تراند. اگر $\angle COK = \beta$ ، $AC = a$ ، $\angle CAO = \alpha$ بوده و قاطع AMK از مرکز دایره بگذرد در آن صورت BC را بیابید.

۱۲۴ • دودایره همدیگر را در نقاط A و B قطع کرده‌اند. از نقطه A دو پاره خط AC و AD را رسم می‌کنیم که هر یک از آنها وترى از یک دایره بوده و بر دایره دیگر نیز مماس هستند. ثابت کنید که:
 $AC^2 \cdot BD = AD^2 \cdot BC$

۱۲۵ • در دایره‌ای به شعاع R ، دو وتر AB و CD برهم عمود هستند. ثابت کنید که: $AC^2 + BD^2 = 4R^2$

۱۲۶ • ثابت کنید که مجموع مربعات فواصل نقطه M واقع بر روی قطر یک دایره از نقاط انتهایی تمام وترهای موازی با آن قطر در دایره، یک مقدار ثابت است.

۱۲۷ • دودایره در نقطه C بر یکدیگر مماس خارجی بوده و AB مماس مشترک آنهاست اگر $AC = 8$ cm و $BC = 6$ cm باشد شعاع دایره‌ها را بیابید.

۱۲۸ • دودایره با شعاع‌های R و $\frac{R}{2}$ برهم مماس خارجی هستند. از مرکز دایره کوچکتر پاره خطی به طول $2R$ و با زاویه 30° با خط‌المرکزین رسم می‌کنیم. طول قسمتهایی از این پاره خط را بیابید که در خارج دودایره قرار دارند.

۱۲۹ • دودایره با شعاع‌های a و b ($a < b$) برهم مماس داخلی بوده و مرکز دایره بزرگتر در خارج دایره

کوچکتر قرار دارد. وتر AB . از دایره بزرگتر بردایره کوچکتر مماس بوده و با مماس مشترک آنها زاویه α درست می‌کند. AB را بیابید.

۲. مثلث های محاطی و محیطی

۱۳۰. روی اضلاع AB و AC از مثلث متساوی الاضلاع ABC نقاط M و K را طوری انتخاب کرده ایم که $AM:MB = 2:1$ و $AK:KC = 1:2$ است. ثابت کنید که پاره خط KM با شعاع دایره محیط بر مثلث ABC برابر است.

۱۳۱. دایره ای را بر مثلث ABC ($AB = BC$) محیط کرده ایم. امتداد نیمسازهای زوایای A و C دایره را در نقاط K و P و همدیگر را در E قطع می‌کنند. ثابت کنید که چهارضلعی $BKEP$ یک لوزی است.

۱۳۲. در مثلث ABC ، AD و CE نیمساز زوایا هستند. دایره محیط بر مثلث BDE از مرکز دایره محاط در مثلث ABC می‌گذرد. ثابت کنید که $\angle ABC = 60^\circ$

۱۳۳. ثابت کنید که مرکز محاط در یک مثلث در درون مثلث تشکیل شده بوسیله خطوط واصل میانگاه های اضلاع قرار دارد.

۱۳۴. خط مستقیم l بردایره محیطی مثلث ABC در نقطه C مماس است. ثابت کنید که مربع ارتفاع CH از مثلث ABC با حاصلضرب فواصل نقاط A و B از خط l برابر است.

۱۳۵. اگر در مثلثی مراکز دایره های محاطی و محیطی نسبت به یکی از اضلاع آن متقارن باشد زوایای مثلث را بدست آورید.

۱۳۶. قاعده مثلث متساوی الساقینی برابر $2a$ و ارتفاع آن برابر h است. بردایره محاطی مثلث خطی را به موازات قاعده مماس می‌کنیم. طولی از این پاره خط را که بین دوساق مثلث قرار دارد بدست آورید.

۱۳۷. در مثلث قائم الزاویه ای، نقطه تماس دایره محاطی وتر آن را به پاره خط هایی به طول 24 cm و 36 cm تقسیم می‌کند. طول اضلاع زاویه قائمه را بدست آورید.

۱۳۸. در مثلث قائم الزاویه ای طول یک ضلع زاویه برابر 48 cm و طول تصویر دیگر بر روی وتر معادل $3,92$ cm است. محیط دایره محاطی مثلث را بدست آورید.

۱۳۹. در مثلث قائم الزاویه ای با اضلاع زاویه قائمه با طول های 18 cm و 24 cm فاصله بین مراکز دایره های محاطی و محیطی را بدست آورید.

۱۴۰. در مثلث متساوی الساقینی ارتفاع وارد بر قاعده برابر دوسوم شعاع دایره محیطی است. اندازه زاویه های مجاور به قاعده را محاسبه کنید.

۱۴۱. در مثلثی با دو ضلع به طول های a و b که اندازه زاویه بین آنها برابر γ است شعاع دایره محیطی را بدست آورید.

۱۴۲ ● در مثلث متساوی الساقینی طول قاعده برابر b و زاویه های مجاور به قاعده برابر α هستند. بر دایره محاطی مثلث مماسی را به موازات قاعده رسم می‌کنیم. طول قطعه ای از این پاره خط را که بین دو ساق مثلث واقع است محاسبه کنید.

۱۴۳ ● در مثلث متساوی الساقینی نسبت شعاع های دایره های محاطی و محیطی برابر h است. زاویه های مثلث را بدست آورید.

۱۴۴ ● ثابت کنید نامساوی زیر که در آن r شعاع دایره محاطی و h ارتفاع وارد بر وتر است در مورد هر مثلث قائم الزاویه برقرار است: $0.4 < \frac{r}{h} < 0.5$

۱۴۵ ● ثابت کنید که دایره محیطی یک مثلث با دایره مار بر دور آس و مرکز ارتفاعی مثلث برابر است.

۱۴۶ ● مثلث متساوی الاضلاع ABC در دایره ای محاط شده است. روی کمان BC نقطه دلخواه M را اختیار کرده و وترهای AM ، BM ، CM را رسم می‌کنیم. تساوی $AM = BM + CM$ را ثابت کنید.

۱۴۷ ● ثابت کنید که مجموع مربعات فواصل نقطه دلخواه از دایره ای تا رئوس یک مثلث متساوی الاضلاع محاط در این دایره مقدار ثابتی است که مستقل از موقعیت نقطه است.

۱۴۸ ● مثلث متساوی الساقین ABC ($AB = BC$) را در دایره ای محاط کرده ایم. روی کمان AB نقطه دلخواه K را اختیار کرده و آن را بوسیله وترهایی به رئوس مثلث وصل می‌کنیم. تساوی زیر را ثابت کنید. $AK \cdot KC = AB^2 - KB^2$

۱۴۹ ● در مثلث حاده الزاویه ای با اضلاع a ، b و c از مرکز دایره محیطی بر اضلاع آن عمودهایی را رسم می‌کنیم. طول این عمودها بترتیب برابر m ، n و p است. ثابت کنید که: $\frac{m}{a} + \frac{n}{b} + \frac{p}{c} = \frac{mnp}{abc}$

۱۵۰ ● ثابت کنید که پای عمودهای مرسوم از نقطه دلخواهی روی دایره محیطی یک مثلث بر اضلاع یا امتداد اضلاع آن روی یک خط مستقیم قرار دارد.

۱۵۱ ● در مثلثی، a و b طول دو ضلع از آن و l طول نیمساز زاویه بین این دو ضلع است. نیمساز مزبور ضلع سوم را به پاره خط هایی با طول های a' و b' تقسیم می‌کند. ثابت کنید که در این مثلث $l^2 = ab - a'b'$ است.

۱۵۲ ● شعاع دایره محیطی یک مثلث را به یکی از رئوس مثلث وصل می‌کنیم. ثابت کنید این خط بر خطی عمود است که پای عمودهای مرسوم از دور آس دیگر را بهم وصل می‌کند.

۱۵۳ ● دایره ای را بر مثلث ABC محیط کرده ایم. از نقطه B مماسی بر دایره رسم می‌کنیم و این مماس ضلع CA را در نقطه D واقع در بیرون نقطه A قطع می‌کند. اگر $AB + AD = AC$ و $CD = 3$ و $\angle BAC = 60^\circ$ باشد محیط مثلث را محاسبه کنید.

۱۵۴ ● مثلث متساوی الاضلاع ABC را در دایره ای به شعاع R محاط کرده ایم. وتر BD ، ضلع AC را در نقطه E طوری قطع می‌کند که تناسب $AE:CE = 2:3$ برقرار می‌شود. طول CD را پیدا کنید.

۱۵۵ ● در ذوزنقه $ABCD$ ، نیمساز زاویه A قاعده BC (یا امتداد آن) را در نقطه E قطع می‌کند. دایره

محاطی مثلث ABE بر ضلع AB در نقطه M و بر ضلع BE در نقطه P مماس است. اگر $AB:MP = 2$ باشد در آن صورت زاویه BAD را پیدا کنید.

۱۵۶. در مثلث قائم الزاویه ای دایره ای را محاط کرده ایم. نقطه تماس دایره با وتر مثلث آن را به دو قطعه تقسیم می کند که نسبت آنها برابر k ($k > 1$) است. زاویه های مثلث را بدست آورید.

۱۵۷. اگر در مثلث متساوی الساقینی مرکز ارتفاعی مثلث روی دایره محاطی قرار داشته باشد زاویه مجاور به قاعده را بیابید.

۳. ترتیب های گوناگون از دایره و مثلث

۱۵۸. پاره خط های AD ، BM و CP میانه های مثلث ABC هستند. دایره محیطی مثلث DMC از

گرانگه مثلث ABC عبور می کند. ثابت کنید که: $\angle ABM = \angle PCB$ و $\angle BAD = \angle PCA$

۱۵۹. نیم دایره ای داخل مثلث قائم الزاویه ای طوری محاط شده است که قطر آن روی وتر مثلث قرار گرفته و مرکز دایره وتر مثلث را به دو قطعه به طول های 15 cm و 20 cm تقسیم کرده است. شعاع نیم دایره را بیابید.

۱۶۰. دایره ای از رأس A مثلث قائم الزاویه ABC عبور کرده و بر ضلع قائمه BC مماس می شود.

مرکز آن نیز روی وتر AB از مثلث قرار می گیرد. اگر $AB = c$ و $BC = a$ باشد شعاع دایره را بیابید.

۱۶۱. ضلع BC از مثلث قائم الزاویه ABC را به عنوان قطر دایره ای در نظر می گیریم. این دایره وتر

AB از مثلث را در نقطه D طوری قطع می کند که $AD:DB = 3:1$ باشد. اگر ارتفاع وارد بر وتر مثلث

برابر 3 cm باشد اضلاع مثلث ABC را بیابید.

۱۶۲. دو ضلع از مثلثی برابر a و b بوده و زاویه بین آنها برابر 120° است. شعاع دایره ماربر انتهای ضلع

سوم و مرکز دایره محاطی مثلث را بیابید.

۱۶۳. دایره ای از رئوس A و B مثلث ABC عبور کرده و بر ضلع BC در نقطه B مماس می شود. ضلع

AC بوسیله دایره به دو قطعه AM و MC طوری تقسیم می شود که $AM = MC + BC$ درمی آید. اگر

$AC = 4\text{ cm}$ باشد در آن صورت BC را بیابید.

۱۶۴. ضلع AB از مثلث ABC قطر دایره ای محسوب می شود که ضلع BC را در نقطه D قطع می کند.

اگر $CD = 2\text{ cm}$ و $AB = BC = 6\text{ cm}$ باشد در آن صورت AC را بیابید.

۱۶۵. ضلع AB از مثلث ABC قطر دایره ای محسوب می شود که ضلع AC را در نقطه D و ضلع BC

را در نقطه E قطع می کند. اگر $AB = 3\text{ cm}$ ، $AD:DC = 1:1$ و $BE:EC = 7:2$ باشد آنگاه AC و BC را

بدست آورید.

۱۶۶. پاره خط BD ارتفاعی از مثلث ABC و DE میانه مثلث BCD است. دایره محاط در مثلث

BDE بر ضلع BE در نقطه K و بر ضلع DE در نقطه M مماس است. اگر $AB = BC = 8\text{ cm}$ و

$K.M = 2 \text{ cm}$ باشد زوایای مثلث مفروض را بدست آورید.

۱۶۷. در مثلث ABC ارتفاع AD و دایره ای به شعاع AD و مرکز A رسم می‌کنیم. اگر $\angle B = \beta$ ، $BC = a$ و $\angle C = \gamma$ باشد طول کمانی از این دایره را پیدا کنید که در داخل مثلث قرار دارد.

۱۶۸. ثابت کنید که شعاع دایره مماس بر وتر مثلث قائم الزاویه و امتدادهای اضلاع آن با مجموع طول های وتر و شعاع دایره محاطی مثلث برابر است.

۱۶۹. نیمسازهای AD و CK از مثلث ABC در نقطه O همدیگر را قطع کرده اند و $KD = 1 \text{ cm}$ است. اگر نقطه B روی دایره محیطی مثلث KDO قرار داشته باشد زوایا و طول دو ضلع دیگر مثلث KDO را بدست آورید.

۱۷۰. دایره ای بر اضلاع AC و BC مثلث ABC مماس بوده و مرکز آن روی AB قرار دارد. اگر $AB = 148 \text{ cm}$ ، $AC = 48 \text{ cm}$ ، $BC = 140 \text{ cm}$ باشد آنگاه شعاع دایره مزبور را بدست آورید.

۱۷۱. در مثلث ABC ، نقطه D میانگاه AC و E میانگاه ضلع BC است. دایره محیط بر مثلث CDE از گرانیگاه مثلث ABC عبور می‌کند. اگر $AB = c$ باشد آنگاه طول میانه CK را بدست آورید.

۱۷۲. اگر در مثلث ABC ، رأس C ، گرانیگاه M ، میانگاه های اضلاع AC و BC روی یک دایره واقع باشند طول اضلاع a ، b و c را بیابید..

۱۷۳. در مثلث متساوی الساقین ABC که اندازه زاویه B در آن برابر 120° است نیمدایره ای به شعاع $(3\sqrt{3} + \sqrt{21}) \text{ cm}$ با مرکز واقع بر روی AC محاط شده است. بر نیمدایره مماسی رسم شده است که ساق های AB و BC مثلث را به ترتیب در نقاط D و E قطع می‌کند. اگر $DE = 2\sqrt{7} \text{ cm}$ باشد BD و BE را بدست آورید.

۱۷۴. در مثلث ABC طول سه ضلع بصورت $AB = BC = 39 \text{ cm}$ ، $AC = 30 \text{ cm}$ معلوم است. در این مثلث ارتفاعات AD و BE زارسم کرده ایم. شعاع دایره ای را پیدا کنید که از نقاط D و E عبور کرده و بر ضلع BC مماس باشد.

۱۷۵. در مثلث ABC ، ارتفاعات CD و AE را رسم کرده ایم. دایره ای بر مثلث BDE محیط شده است. اگر $AC = b$ و $\angle ABC = \beta$ باشد آنگاه طول کمانی از این دایره را پیدا کنید که در درون مثلث ABC قرار دارد.

۴. دایره و چهارضلعی

۱۷۶. ثابت کنید اگر دوزنقه ای دارای یک دایره محیطی و یک دایره محاطی باشد آنگاه ارتفاع دوزنقه یک واسطه هندسی بین قاعده های آن است.

۱۷۷. قاعده های دوزنقه متساوی الساقینی برابر 21 cm و 9 cm و ارتفاع آن برابر 8 cm است. شعاع دایره محیطی آن را بدست آورید.

۱۷۸ • قاعده‌های دوزنقه متساوی الساقینی برابر a و b و اندازه زاویه‌های حاده آن برابر α است. شعاع دایره محیطی دوزنقه را پیدا کنید.

۱۷۹ • دورأس مربعی روی دایره‌ای به شعاع R و دو ضلع دیگر آن نیز روی خط مماس بر این دایره قرار دارند. طول ضلع مربع را بدست آورید.

۱۸۰ • اندازه زاویه‌های حاده لوزی $ABCD$ برابر α است. نسبت شعاع دایره محیطی لوزی به شعاع دایره محیطی مثلث ABC را پیدا کنید.

۱۸۱ • دوزنقه متساوی الساقینی بر دایره‌ای محیط شده است. اگر نسبت ساق دوزنقه بر قاعده کوچکتر آن برابر k باشد زوایای دوزنقه را بدست آورید.

۱۸۲ • بر دوزنقه‌ای با زوایای حاده α و β دایره‌ای محیط شده است. نسبت محیط دوزنقه بر محیط دایره را بیابید.

۱۸۳ • (a) قضیه بطلمیوس را ثابت کنید: شرط لازم و کافی برای محاط شدن یک چهارضلعی محدب در یک دایره این است که مجموع حاصلضرب‌های اضلاع متقابل با حاصلضرب قطرهای برابر باشد؛ به عبارت دیگر اگر طول اضلاع متقابل یک چهارضلعی محاط در دایره‌ای برابر a و b ، c و m بوده و طول قطرهای آن d_1 و d_2 باشد آنگاه $d_1 d_2 = ab + cm$ خواهد بود. (b) با استفاده از قضیه بطلمیوس گزاره مسئله 146 را ثابت کنید.

۱۸۴ • در یک مثلث حاده الزاویه هر ارتفاعی را در قطعه‌ای از آن ضرب می‌کنیم که بین مرکز ارتفاعی و رأس مثلث واقع است. سپس در مورد هر سه ارتفاع مجموع این حاصلضرب‌ها را بدست می‌آوریم، ثابت کنید این حاصلجمع با نصف مجموع مربعات اضلاع برابر است.

۱۸۵ • روی وتر مثلث قائم الزاویه‌ای مربعی در خارج مثلث می‌سازیم و وتریکی از اضلاع آن محسوب می‌شود. مرکز مربع را به رأس قائمه مثلث وصل می‌کنیم. اگر طول اضلاع زاویه قائمه مثلث 21 cm و 28 cm باشد خط مزبور وتر را به چه قطعاتی تقسیم می‌کند؟

۱۸۶ • دایره‌ای بر دو ضلع مجاور مربعی مماس شده و هر یک از دو ضلع دیگر مربع را به قطعاتی به طول‌های 2 cm و 23 cm تقسیم می‌کند. شعاع دایره را پیدا کنید.

۱۸۷ • در لوزی $ABCD$ با ضلع 4 cm و با زاویه BAD مساوی 60° دایره‌ای محاط شده است. مماس مرسوم بر این دایره ضلع AB را در نقطه M و ضلع AD را در نقطه D قطع می‌کند. اگر $MP = 2\text{ cm}$ باشد MB و PD را بدست آورید.

۱۸۸ • نسبت شعاع دایره محیطی دوزنقه‌ای به شعاع دایره محیطی آن برابر k است. زاویه حاده دوزنقه را بدست آورید.

۱۸۹ • بر چهارضلعی $ABCD$ که اقطار آنها در نقطه E بر هم عمود هستند دایره‌ای را محیط می‌کنیم. خط عمود بر AB از نقطه E ضلع CD را در نقطه M قطع می‌کند. اگر $AB = 4\text{ cm}$ ، $AD = 8\text{ cm}$ و

$\angle CDB = \alpha$ باشد EM را بدست آورید.

۱۹۰. در درون دایره ای چهارضلعی $ABCD$ را محاط می‌کنیم که اقطار آن بر هم عمود بوده و در نقطه E همدیگر را قطع می‌کنند. خط ماژ از نقطه E و میانگاه ضلع CD ، ضلع AB را در نقطه H قطع می‌کند. اگر $ED = 6\text{ cm}$ ، $BE = 5\text{ cm}$ و $\angle ADB = \alpha$ باشد HB را بدست آورید.

۱۹۱. در چهارضلعی محدب $ABCD$ ضلع AB برابر $\frac{25}{64}$ ، ضلع BC برابر $\frac{25}{64}$ ، و ضلع CD برابر $\frac{12}{64}$ است. می‌دانیم که زاویه DAB حاده، زاویه ADC منفرجه، $\sin \angle DAB = \frac{3}{5}$ و $\cos \angle ABC = -\frac{63}{85}$ است. دایره‌ای با مرکز O بر اضلاع BC ، CD و AD مماس است. طول پاره خط OC را پیدا کنید.

مسائل گوناگون

۱۹۲. از نقطه C دو مماس CA و CB را که زاویه بین آنها 60° است رسم می‌کنیم. در درون مثلث خمیده‌ای که با این دو مماس و کمان کوچک AB تشکیل می‌شود دایره‌ای را محاط می‌کنیم. ثابت کنید که طول این کمان با محیط دایره محاطی برابر است.

۱۹۳. یک مستطیل با طول و عرض 48 cm و 36 cm بوسیله قطر به دو مثلث تقسیم می‌شود. در هریک از این مثلث‌ها دایره‌ای را محاط می‌کنیم. فاصله بین مراکز این دو دایره را بدست آورید.

۱۹۴. دو دایره با شعاعهای 16 cm و 9 cm بر هم مماس خارجی هستند. شعاع دایره محاط در داخل مثلث خمیده‌ای که با کمان‌هایی از دو دایره مزبور و مماس مشترک خارجی آنها بوجود می‌آید بدست آورید.

۱۹۵. وتری به طول 6 cm دایره‌ای را به دو قسمت تقسیم می‌کند. مربعی با ضلع 2 cm را در داخل قطعه کوچکتر محاط می‌کنیم. شعاع دایره را بیابید.

۱۹۶. دو دایره با شعاع R طوری مرتب شده‌اند که خط المرکزین آنها برابر R است. مربعی در قسمت مشترک دو دایره محاط شده است. طول ضلع مربع را بدست آورید.

۱۹۷. در داخل قطاع دایره‌ای با زاویه مرکزی 2α دایره‌ای محاط شده است. نسبت شعاع دایره محاطی بر شعاع قطاع را بیابید.

۱۹۸. در داخل قطاع AOB از دایره‌ای با شعاع R و زاویه مرکزی α مثلث متساوی الاضلاعی را محاط کرده‌ایم. یکی از رئوس این مثلث بر میانگاه کمان AB قرار دارد و دو رأس دیگر آن نیز روی شعاعهای OA و OB واقع است. طول ضلع مثلث را بدست آورید.

۱۹۹. کمانی از دایره‌ای به شعاع R به زاویه مرکزی 2α ($\alpha < \frac{\pi}{2}$) نگاه می‌کند. وتر این کمان دایره‌ای را به دو قسمت تقسیم می‌کند. در قسمت کوچکتر مربعی را محاط می‌کنیم. طول ضلع مربع را بدست آورید.

۲۰۰ • کمانی از دایره‌ای به شعاع R به زاویه مرکزی 2α ($\frac{\pi}{2} < \alpha$) نگاه می‌کند. وتر این کمان دایره مزبور را به دو قسمت تقسیم می‌کند. در داخل قسمت کوچکتر مثلث متساوی الاضلاعی را طوری محاط کرده‌ایم که یک رأس آن بر میانگانه کمان و دو رأس دیگر روی وتر همین قطعه واقع شده است. طول ضلع مثلث را بیابید.

۲۰۱ • کمانی از دایره‌ای به شعاع R به زاویه مرکزی 2α ($\frac{\pi}{2} < \alpha$) نگاه می‌کند. وتر این کمان دایره را به دو قطعه تقسیم می‌کند. در قطعه بزرگتر مثلث متساوی الاضلاعی را طوری محاط کرده‌ایم که یک رأس آن بر میانگانه وتر و دو رأس دیگر روی کمان واقع است. طول ضلع مثلث را بدست آورید.

۲۰۲ • دایره‌ای به شعاع a در داخل مثلث متساوی الساقینی محاط شده است. دایره‌ای به شعاع b را بر ساق‌های مثلث و دایره محاطی مماس کرده‌ایم. قاعده مثلث را بیابید.

۲۰۳ • نقطه B روی پاره خط AC با طول 12 cm طوری انتخاب شده است که $AB = 4\text{ cm}$ است. روی AC و AB به عنوان قطر دو دایره، دایره‌هایی را رسم کرده‌ایم. شعاع دایره مماس بر این دو دایره و پاره خط AC را بیابید.

۲۰۴ • قاعده مثلث متساوی الساقینی برابر b و زاویه مجاور قاعده نیز برابر α است. دایره‌ای را در این مثلث محاط می‌کنیم. دایره‌ای را نیز بر این دایره و دو ساق مثلث مماس رسم می‌کنیم. شعاع دایره دوم را محاسبه کنید.

۲۰۵ • در دایره‌ای با شعاع R و مرکز O دو شعاع OA و OB را طوری رسم می‌کنیم که $\angle AOB = \alpha$ ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$) باشد. شعاع دایره‌ای را پیدا کنید که بر کمان AB از قطاع OAB ، وتر AB و نیمساز زاویه $\angle AOB$ مماس است.

۲۰۶ • دو دایره مساوی با شعاع a طوری در کنار هم قرار گرفته‌اند که طول خط‌المركزین آنها برابر a است. مقطع این دو دایره با خط‌المركزین به دو مثلث خمیده تقسیم می‌شود. در یکی از این مثلث‌ها دایره‌ای را محاط می‌کنیم. طول پاره خطی را پیدا کنید که نقاط تماس دایره محاطی و دو دایره مفروض را بهم وصل می‌کند.

۲۰۷ • از نقطه A مماس AK را به دایره‌ای به شعاع 2 cm و با مرکز O رسم می‌کنیم. پاره خط OA دایره را در نقطه M قطع می‌کند و با خط مماس زاویه 60° می‌سازد. شعاع دایره محاط در مثلث خمیده MKA را بیابید.

۲۰۸ • دایره‌ای به مرکز O و شعاع r ($\alpha > r$) مفروض است. از نقطه A واقع در فاصله α از مرکز دایره قاطعی را بر این دایره رسم می‌کنیم. این قاطع با قاطع AO زاویه 60° می‌سازد و دایره را در نقاط K و P قطع می‌کند (نقطه K بین A و P قرار می‌گیرد). اگر M نقطه تلاقی دایره و پاره خط AO باشد قطاع دایره محاط در مثلث خمیده MKA را پیدا کنید.

۲۰۹ ● طول قاعده مثلث متساوی الساقینی برابر b و زاویه مجاور به قاعده آن برابر α است. دایره ای را در این مثلث محاط می‌کنیم. دایره دیگری نیز بر این دایره، قاعده و یک ساق آن مماس می‌شود. شعاع دایره دوم را بیابید.

۲۱۰ ● دایره ای را بر مثلث متساوی الساقینی محاط کنیم که طول قاعده آن b و زاویه مجاور به قاعده آن برابر α است. دایره دیگری را بر این دایره و ساق‌های مثلث محاط می‌کنیم. شعاع دایره دوم را بدست آورید.

۲۱۱ ● در درون قطعه ای از دایره ای با شعاع R و زاویه مرکزی α ($\alpha < \pi$) دو دایره مماس بر هم مساوی را محاط کرده ایم. شعاع آنها را بیابید.

۲۱۲ ● نقاط D ، K و M بر ترتیب روی اضلاع AB ، BC و AC از مثلث ABC قرار دارند. ثابت کنید که دایره‌های محیطی مثلث‌های ADM ، BDK و CKM در یک نقطه متقارب هستند.

۲۱۳ ● از نقطه C دو مماس AC و BC را بر دایره ای به شعاع 12 cm و با مرکز O رسم می‌کنیم. در مثلث ABC دایره ای را با مرکز O_1 محاط می‌کنیم. این دایره بر اضلاع AC و BC در نقاط H و K مماس می‌شود. اگر فاصله O_1 تا خط مستقیم KH برابر 3 cm باشد آنگاه زاویه AOB را بیابید.

۲۱۴ ● از مرکز O دایره ای به شعاع r دو شعاع OA و OB را با شرط $\angle AOB = \alpha$ ($\alpha < \pi$) رسم می‌کنیم. دایره با وتر AB به دو قطعه تقسیم می‌شود. در داخل قطعه کوچکتر مثلث متساوی الاضلاعی را محاط می‌کنیم بطوریکه یکی از اضلاع آن بر وتر AB عمود شود. طول ضلع مثلث را محاسبه کنید.

۲۱۵ ● در دایره ای به شعاع r قطر AB و وتر AC را رسم می‌کنیم. در داخل مثلث خمیده حاصل با ترسیمات فوق، دایره ای را محاط می‌کنیم. اگر $\angle CAB = \alpha$ باشد شعاع این دایره را بیابید.

۲۱۶ ● در دایره ای به مرکز O شعاع OM و وتر KP در نقطه A متقاطع بوده و $\angle MAK = \alpha$ ($\alpha < \frac{\pi}{2}$) است. در داخل مثلث خمیده حاصل بطریق فوق دایره ای را محاط می‌کنیم. اگر $OA = a$ و $OM = r$ باشد شعاع این دایره را بیابید.


۲۱۷ ● از نقطه A واقع بر روی دایره ای به شعاع r دو وتر AB و AC و قطر AD را رسم می‌کنیم. اگر $\angle BAC = \alpha$ ، $AB = b$ و $AC > AB$ باشد آنگاه شعاع دایره مماس بر کمان BC و وترهای AB و AC را پیدا کنید.

۲۱۸ ● روی یک ضلع زاویه ای به اندازه α دو نقطه مفروض است که فاصله هر یک از آنها از ضلع دیگر زاویه برابر b و c ($b < c$) است. شعاع دایره ساز از این دو نقطه و مماس بر ضلع دیگر زاویه را پیدا کنید.

۲۱۹ ● اندازه زاویه AOB برابر α است. دایره ای بر ضلع AO در نقطه C مماس بوده و ضلع OB را در نقاط D و E قطع می‌کند. اگر $OC = a$ و $OD = b$ ($b > a$) باشد آنگاه DE و شعاع دایره را پیدا کنید.

بخش ۴ • مساحت های اشکال مسطحه

مثال ۱ • نقطه H مرکز ارتفاعی مثلث ABC است. نقطه K را روی خط مستقیم CH طوری انتخاب می‌کنیم که ABK یک مثلث قائم الزاویه باشد. ثابت کنید که مساحت مثلث ABK واسطه هندسی بین مساحت های مثلث های ABC و ABH است (شکل ۵۵).



شکل ۵۵

حل • نمادهای $S_{ABH} = S_2$ و $S_{ABC} = S_1$ ، $S_{ABK} = S$ را در نظر می‌گیریم. آنگاه داریم:
 $S_2 = \frac{1}{2} AB \cdot HD$ و $S_1 = \frac{1}{2} AB \cdot CD$ ، $S = \frac{1}{2} AB \cdot KD$
 بایستی $S = \sqrt{S_1 S_2}$ یعنی رابطه های زیر را ثابت کنیم.

$$\frac{1}{2} AB \cdot KD = \sqrt{\frac{1}{2} AB \cdot CD \cdot \frac{1}{2} AB \cdot HD} \quad (1)$$

$$KD^2 = CD \cdot HD \quad (2)$$

مثلث ABK قائم الزاویه بوده و بنابراین $KD^2 = BD \cdot AD$ (قضیه ۶a) است. بدین ترتیب تساوی (2) وقتی برقرار می‌شود که $BD \cdot AD = CD \cdot DH$ یا $\frac{BD}{CD} = \frac{DH}{AD}$ ثابت شود. تساوی آخر بوضوح از تشابه مثلث های HDA و BCD (در این مثلث ها، زوایای BCD و HAD به علت تعامد اضلاع آنها بر یکدیگر بر اساس ارتفاع بودن AE ، برابر هستند) استنتاج می‌شود. از اینرو تساوی (2) و نیز تساوی (1) اثبات می‌گردد.

مثال ۲ • در مثلثی میانه های m_a ، m_b و m_c معلوم هستند مساحت آن را محاسبه کنید.

حل • قبل از هر چیز $S_{AMC} = \frac{1}{3} S_{ABC}$ را مورد ملاحظه قرار دهید (شکل ۵۶). در حقیقت این مثلث ها دارای قاعده مشترک AC بوده و از اینرو نسبت مساحت های آنها با نسبت ارتفاعات IK و BH برابر خواهد بود (قضیه ۱۸). از تشابه مثلث های MKE و BHE تناسب های $\frac{MK}{BH} = \frac{ME}{BE}$ و $\frac{ME}{BE} = 1:3$ (قضیه ۳b) استنتاج می‌شوند. بدین ترتیب مساحت مطلوب S عبارت از $3S_{AMC}$ خواهد بود. مثلث AMC (شکل ۶۷) را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. در مورد دو ضلع آن $AM = \frac{2}{3} m_a$ ، $MC = \frac{2}{3} m_c$ ، $ME = \frac{1}{3} m_b$ معلوم است (قضیه ۳ مجدداً بکار گرفته شده است).
 پاره خط EP را مساوی ME جدا کرده و P را به A و C وصل می‌کنیم تا متوازی الاضلاع $MCPA$ بدست


آید. چنین استنتاج می‌شود: $S_{AMC} = S_{MCP} = \frac{1}{2} S_{AMCP}$. سه ضلع یعنی $\frac{2}{3}m_a$ ، $\frac{2}{3}m_b$ ، و $\frac{2}{3}m_c$ در مثلث MCP معلوم هستند. از اینرو مساحت مثلث MCP را می‌توان با فرمول هرو و بدست آورد (قضیه ۱۹۰). بدین ترتیب داریم:

$$S = 3S_{AMC} = 3S_{MCP}$$


$$= 3 \sqrt{\frac{1}{3}(m_a + m_b + m_c) \frac{1}{3}(m_a + m_b - m_c) \frac{1}{3}(m_a + m_c - m_b)}$$

$$\times \sqrt{\frac{1}{3}(m_b + m_c - m_a)} = \frac{1}{3} \sqrt{(m_a + m_b + m_c)(m_a + m_b - m_c)}$$

$$\times \sqrt{(m_a + m_c - m_b)(m_b + m_c - m_a)}$$



شکل ۵۷



شکل ۵۶

مثال ۳. در مثلثی اندازه سه زاویه آن برابر مقادیر معلوم α ، β و γ است. فاصله‌های نقطه اختیاری M در درون مثلث از سه ضلع آن برابر مقادیر معلوم m ، n ، و k است (شکل ۵۸). مساحت این مثلث را محاسبه کنید.

حل ۳. مساحت مثلث ABC را می‌توان از طریق فرمول $S = \frac{1}{2} AC \cdot BC \cdot \sin \gamma$ بدست آورد که در این رابطه نیز بایستی مقادیر AC و BC یافته شوند. با منظور کردن x در $BC = x$ ، آنگاه طبق قانون

سینوس ها (قضیه ۸) به $\frac{AC}{\sin \beta} = \frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin \gamma}$ وصول خواهیم یافت که از آن نیز:

$$AB = \frac{x \sin \gamma}{\sin \alpha} \text{ و } AC = \frac{x \sin \beta}{\sin \alpha}$$

برای تشکیل معادله از روش مساحت ها (به بخش ۱ مراجعه کنید) استفاده کرده و S مثلث ABC را به عنوان عنصر مرجع منظور می‌کنیم. از یک طرف چنین داریم:

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot BC \cdot \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot \frac{x \sin \beta}{\sin \alpha} \times x \sin \gamma = \frac{x^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha}$$

و از طرف دیگر نیز تساوی زیر در دسترس است:


$$S = S_{AMB} + S_{BMC} + S_{AMC} = \frac{1}{2} AB \cdot k + \frac{1}{2} BC \cdot n + \frac{1}{2} AC \cdot m =$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{x \sin \gamma}{\sin \alpha} \cdot k + \frac{1}{2} xn + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \cdot m = \frac{x(k \sin \gamma + n \sin \alpha + m \sin \beta)}{2 \sin \alpha}$$

از این تساوی به $\frac{x^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{k \sin \gamma + n \sin \alpha + m \sin \beta}{\sin \beta \sin \gamma}$ وصول می‌یابیم.

با گذاشتن این مقدار $x = \frac{x(k \sin \gamma + n \sin \alpha + m \sin \beta)}{2 \sin \alpha}$ در فرمول اول در مورد مساحت مثلث ABC تساوی زیر بدست می آید:


$$S = \frac{x^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{(k \sin \gamma + n \sin \alpha + m \sin \beta)^2}{2 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma}$$



شکل ۵۸

مثال ۴ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC نقاط K و P طوری انتخاب شده اند که $AK:BK=1:2$ و $CP:BP=2:1$ است.

خطوط مستقیم AP و CK در نقطه E همدیگر را قطع می کنند. اگر مساحت مثلث BEC برابر 4 cm^2 باشد آنگاه مساحت مثلث ABC را بدست آورید (شکل ۵۹).




شکل ۵۹

حل • تساوی های $AK = x$, $BK = 2x$, $BP = y$, $CP = 2y$ را منظور کرده و $PM \parallel KC$ را رسم می کنیم. طبق قضیه تالس $\frac{BM}{MK} = \frac{BP}{PC} = \frac{1}{2}$ بوده و از اینرو $BM = \frac{2x}{3}$ و $KM = \frac{4x}{3}$ است. از این گذشته مثلث های AKE و AMP مثلث متشابه بوده و از اینرو یعنی $\frac{KE}{MP} = \frac{AK}{AM}$ را داریم. بنابراین $KE = \frac{3}{7} MP$ استنتاج می شود.

از طرف دیگر $\frac{MP}{KC} = \frac{BP}{BC} = \frac{1}{3}$ یعنی $MP = \frac{1}{3} KC$ را داریم. بدین ترتیب $KE = \frac{1}{7} KC$ حاصل می شود و $EC = \frac{6}{7} KC$ خواهد بود. مثلث های BEC و BKC را مورد ملاحظه قرار می دهیم. آنها دارای ارتفاع های مشترک (مرسوم از رأس B) بوده و از اینرو نسبت مساحت های آنها با نسبت قاعده های EC و KC برابر است (قضیه ۱۸).

یعنی چنین داریم: $\frac{S_{BKC}}{S_{BEC}} = \frac{KC}{EC} = \frac{7}{6}$. ولی تساوی $S_{BEC} = 4 \text{ cm}^2$ در دسترس بوده و در نتیجه $S_{BKC} = \frac{7}{6} \cdot 4 = \frac{14}{3} \text{ cm}^2$ خواهد بود. سرانجام مثلث های BKC و ABC را مورد بررسی قرار می دهیم. آنها دارای ارتفاع مشترک (مرسوم از رأس C) بوده و از اینرو نسبت مساحت های آنها با نسبت قاعده هایشان برابر خواهد بود: $\frac{S_{ABC}}{S_{BKC}} = \frac{AB}{BK} = \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$. بدین ترتیب چنین حاصل می شود:

$$S_{ABC} = \frac{3}{2} S_{BKC} = \frac{3}{2} \times \frac{14}{3} = 7 \text{ cm}^2$$



شکل ۶۰

مثال ۵ • زاویه A از مثلث ABC ($AB = BC$) برابر $\arctan \frac{8}{15}$ است (شکل ۶۰). دایره‌ای به شعاع 1 cm بر اضلاع AB و BC مماس بوده و قاعده AC را در نقاط E و K قطع می‌کند (E بین A و K قرار دارد). نقطه M تماس دایره و خط مستقیم BA بوده و $AM = \frac{15}{8} \text{ cm}$ است. مساحت مثلث AMK را محاسبه کنید.

حل • قبل از هر چیز بایستی محاسباتی را انجام دهیم که ما را به یافتن موقعیت مرکز دایره قادر می‌سازد (ابتداءً بدیهی بنظر می‌رسد که چون BA و BC بر دایره مماس هستند از اینرو مرکز دایره روی ارتفاع BH از مثلث متساوی الساقین ABC قرار داشته و در نتیجه مرکز دایره روی نیمساز زاویه بین ساق‌ها واقع خواهد بود) (قضیه 12b). زاویه BAC را با α نشان می‌دهیم. از نقطه تماس، شعاع OM را رسم می‌کنیم. آنگاه زاویه BOM نیز برابر α خواهد بود. طبق فرض، $\tan \alpha = \frac{8}{15}$ است. با استفاده از فرمول $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ به $\cos \alpha = \frac{15}{17}$ و در نتیجه به $\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha = \frac{8}{17}$ وصول می‌یابیم. از مثلث BOM درمی‌یابیم که: $BO = \frac{OM}{\cos \alpha} = \frac{1}{\frac{15}{17}} = \frac{17}{15}$ و $BM = OM \tan \alpha = \frac{8}{15}$.

از این گذشته چنین داریم:

$$AB = AM + BM = \frac{15}{8} + \frac{8}{15} = \frac{289}{120}, \quad BH = AB \sin \alpha = \frac{289}{120} \cdot \frac{8}{17} = \frac{17}{15}$$


این امر بدین معنی است که $BH = BO$ بوده و از اینرو نقاط H و O بر هم منطبق هستند. بنابراین برای حل مجدد مسئله بایستی شکل جدید (صحیح) را رسم کنیم (شکل ۶۱).

با کمک فرمول $S = \frac{1}{2} AM \cdot AK \cdot \sin \alpha$ مساحت مثلث AMK را تعیین می‌کنیم. می‌دانیم که $AM = \frac{15}{8} \text{ cm}$ و $\sin \alpha = \frac{8}{15}$ است.

بدین ترتیب حل مسئله به یافتن طول پاره خط AK تحویل می‌یابد. از تساوی $AM^2 = AE \cdot AK$ (قضیه ۱۶c) استفاده می‌کنیم. اگر $AE = x$ را در نظر بگیریم آنگاه $AK = 2 + x$ بوده و معادله $\frac{225}{64} = x(2+x)$ استنتاج می‌شود که از آن نیز $x = \frac{9}{8}$ بدست می‌آید.

آنگاه $AK = \frac{9}{8} + 2 = \frac{25}{8} \text{ cm}$ بوده و در نتیجه


تساوی زیر را خواهیم داشت:



شکل ۶۱

$$S_{AMK} = \frac{1}{2} AM \cdot AK \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{8} \cdot \frac{25}{8} \cdot \frac{8}{17} = \frac{375}{272} \text{ cm}^2$$

مثال ۶ • از میانگاه قطر BD در چهارضلعی $ABCD$ خطی به موازات قطر AC رسم می‌کنیم. این خط ضلع AD را در نقطه E قطع می‌کند. ثابت کنید که خط CE چهارضلعی $ABCD$ را به دو قسمت هم‌ارز (هم‌مساحت) تقسیم می‌کند (شکل ۶۲).




شکل ۶۲

حل • بایستی ثابت کنیم که مساحت چهارضلعی $ABCE$ برابر نصف مساحت چهارضلعی $ABCD$ است. این نکته دقیقاً به معنی تساوی مساحت‌های دو شکل $ABCE$ و CED یا هم‌ارزی آنها خواهد بود. توجه داشته باشید که چهارضلعی $ABCE$ با چهارضلعی $ABCM$ هم‌ارز است که در آن M نقطه‌ای روی خط EP است؛ درحقیقت مثلث‌های ACE و ACM دارای قاعده مشترک و ارتفاعات مساوی هستند؛ زیرا نقاط E و M روی خط مستقیم موازی با قاعده AC قرار دارند. این حقیقت، اندیشه تعویض چهارضلعی $ABCK$ با چهارضلعی $ABCE$ هم‌ارز با آن را تسریع می‌بخشد که در آن K نقطه اختیاری خاصی روی EP است. میانگاه قطر BD را به عنوان نقطه K در نظر می‌گیریم (شکل ۶۳).

چنین داریم: $S_{ABCK} = \frac{1}{2} AC \cdot BK \cdot \sin \alpha$ ،
 بطوریکه α زاویه بین قطرهاست (قضیه ۲۰b).
 طبق فرض $BK = \frac{1}{2} BD$ را داریم. بدین ترتیب
 رابطه زیر حاصل می‌شود که اثبات آن مطلوب مسئله
 بود:

$$S_{ABCK} = \frac{1}{2} AC \cdot \frac{1}{2} BD \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin \alpha \right) = \frac{1}{2} S_{ABCD}$$



شکل ۶۳


مثال ۷ • مساحت چهارضلعی محدب $ABCD$ برابر 2cm^2 است. ضلع AB را از طرف نقطه B با شرط $BL = \frac{1}{2} AB$ ، ضلع BC را از طرف نقطه C با شرط $CP = \frac{1}{2} BC$ ، ضلع CD را از طرف نقطه D با شرط $DE = \frac{1}{2} CD$ و ضلع DA را از طرف نقطه A با شرط $AM = \frac{1}{2} AD$ امتداد می‌دهیم. مساحت چهارضلعی $MLPE$ را محاسبه کنید (شکل ۶۴).

حل • نمادهای $AB = a$ ، $BC = b$ ، $CD = c$ و $DA = m$ را منظور می‌کنیم. مثلث AML را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. در این مثلث $AM = \frac{1}{2} m$ و $AL = \frac{3}{2} a$ بوده و آنگاه مساحت S_1 با $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m \cdot \frac{3}{2} a \cdot \sin \alpha$ برابر می‌شود که در آن $\alpha = \angle MAL$ است. این عبارت را با مساحت مثلث ABD مقایسه می‌کنیم: $S_{ABD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD \cdot \sin(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{2} am \sin \alpha$. توجه داریم که $S_1 = \frac{3}{4} S_{ABD}$ است. بطریق مشابه مساحت S_3 مربوط به مثلث CPE با مساحت مثلث BCD با فرمول $S_3 = \frac{3}{4} S_{BCD}$ ارتباط پیدا می‌کند. از اینرو داریم:

$$S_1 + S_3 = \frac{3}{4} (S_{ABD} + S_{BCD}) = \frac{3}{4} S_{ABCD} = \frac{3}{4} \cdot 2 = 1.5 \text{ cm}^2$$

به همین طریق اگر $S_2 = S_{BLP}$ و $S_4 = S_{MDE}$ را منظور کنیم به 1.5 cm^2 وصول می‌یابیم. در نتیجه تساوی زیر استنتاج می‌شود:

$$S_{MLPE} = S_{ABCD} + S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 2 + 1.5 + 1.5 = 5 \text{ cm}^2.$$



شکل ۶۴

مثال ۸ • دایره‌ای با مرکز O بر مثلث ABC با زاویه حاده A محیط شده است. شعاع AO با ارتفاع AH زاویه‌ای به اندازه 30° می‌سازد. امتداد نیمساز AF دایره را در نقطه L و شعاع AO ضلع BC را در نقطه E قطع می‌کند (شکل ۶۵). اگر $AL = 4\sqrt{2} \text{ cm}$ و $AH = \sqrt{2\sqrt{3}} \text{ cm}$ باشد آنگاه مساحت چهارضلعی $FEOL$ را محاسبه کنید.

حل • در مثال ۶ مساحت چهارضلعی را با استفاده از قضیه $20b$ ، و در مثال ۷ به عنوان حاصل جمع مساحت‌های اجزاء تشکیل دهنده آن محاسبه کردیم. در حالت اخیر توصیه می‌شود که چهارضلعی مطروحه را به عنوان تفاضل مثلث‌های AOL و AFE مدنظر قرار دهیم.

از اینرو $S_{FEOL} = S_{AOL} - S_{AFE}$ را خواهیم داشت. بنابراین حل دیگر مسئله اساساً به محاسبه

عناصر گوناگون (زوایا، اضلاع) مثلث های AOL و AFE تحویل می یابد. ثابت می کنیم که OL موازی AH است. برای این کار $\angle CAL = \angle LAB$ (طبق فرض) را مورد ملاحظه قرار می دهیم. بنابراین $\angle CBL = \angle OBL$ خواهد بود. آنگاه وترهای CL و BL نیز مساوی بوده و در نتیجه مثلث CBL متساوی الساقین خواهد بود (شکل ۶۶). مرکز O مربوط به دایره محیطی مثلث CBL روی ارتفاع KL قرار دارد. بدیهی است که $AH \parallel KL$ بوده و از اینرو $AH \parallel OL$ خواهد بود. آنگاه داریم:

$$\angle HAF = \angle ALO = \angle LAO = \frac{1}{2} \angle HAO = \frac{1}{2} \cdot 30^\circ = 15^\circ.$$

و بدین ترتیب به عنوان مقدمه، مطالب را چنین خلاصه می کنیم: AOL ، یک مثلث متساوی الساقین با زاویه های 15° ، 15° و 150° است. ضلع AL این مثلث برابر $4\sqrt{2}$ cm است. این امر برای محاسبه مساحت آن کافی است.

طبق قاعده کسینوس ها (قضیه v) چنین داریم: $AL^2 = AO^2 + OL^2 - 2AO \cdot OL \cdot \cos 150^\circ$: از این رابطه با قرار دادن $AO = OL = R$ چنین حاصل می شود: $(4\sqrt{2})^2 = R^2 + R^2 + 2R^2 \frac{\sqrt{3}}{2}$ و $R^2 = \frac{32}{2 + \sqrt{3}} = 32(2 - \sqrt{3})$ از این گذشته داریم:

$$S_{AOL} = \frac{1}{2} AO \cdot OL \cdot \sin 150^\circ = \frac{1}{2} R^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times 32(2 - \sqrt{3}) = 8(2 - \sqrt{3}) \text{ cm}^2.$$

حال مساحت مثلث AFE را محاسبه می کنیم. چنین داریم:


$$HE = AH \tan 30^\circ = \sqrt{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad HF = AH \tan 15^\circ = \sqrt{2\sqrt{3}}(2 - \sqrt{3})$$

$$FE = HE - HF = \sqrt{2\sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - 2 + \sqrt{3} \right) = \sqrt{2\sqrt{3}} \frac{2(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}}$$


$$S_{AFE} = \frac{1}{2} FE \cdot AH = \frac{1}{2} \sqrt{2\sqrt{3}} \frac{2(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} \sqrt{2\sqrt{3}} = 2(2 - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$$

از اینرو تساوی زیر نتیجه می شود:

$$S_{FEOL} = S_{AOL} - S_{AFE} = 8(2 - \sqrt{3}) - 2(2 - \sqrt{3}) = 6(2 - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$$



شکل ۶۶



شکل ۶۵


مثال ۹ • در پنج ضلعی $ABCDE$ معلومات $AB = \sqrt{2}$ ، $BC = CD$ و $\angle ABE = 45^\circ$ و

$\angle DBE = 30^\circ$ را داریم (شکل ۶۷). اگر دایره ای به شعاع ۱ cm را بتوان بر این پنج ضلعی محیط کرد در آن صورت مساحت پنج ضلعی را بدست آورید.

حل • به محاسبه مساحت پنج ضلعی مطروحه بصورت محاسبه حاصلجمع مساحت های مثلث های ABE ، BDE و BCD می پردازیم. طبق قانون سینوس ها در مورد مثلث ABE به $\frac{AE}{\sin 45^\circ} = 2R$ یعنی $AE = \sqrt{2}$ وصول می یابیم. از اینرو ABE ، مثلث متساوی الساقین قائم الزاویه خواهد بود که در آن $AB = AE = \sqrt{2}$ است. بنابراین $BE = 2$ و $S_{ABE} = \frac{1}{2} AB \cdot AE = 1$ حاصل می شود. بدلیل $BE = 2$ ، خط BE قطر دایره خواهد بود. از اینرو BDE مثلث قائم الزاویه بوده و از آن $DE = 1$ ، $BD = \sqrt{3}$ و $S_{BDE} = \frac{1}{2} BD \cdot DE = \frac{\sqrt{3}}{2}$ استنتاج می شود. سرانجام مثلث BCD را مورد ملاحظه قرار می دهیم که در آن $BD = \sqrt{3}$ است. طبق قانون سینوسها، $\frac{BD}{\sin \angle BCD} = 2R$ یعنی $\sin \angle BCD = \frac{\sqrt{3}}{2}$ را داریم. از اینرو چنین حاصل می شود: $\angle BCD = 120^\circ$ و $\angle CBD = \angle CDB = 30^\circ$. بدلیل $\frac{BC}{\sin 30^\circ} = 2R$ نتیجه می شود که:

$$BC = CD = 1 \text{ و } S_{BCD} = \frac{1}{2} BC \cdot CD \cdot \sin \angle BCD = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{بدین ترتیب داریم: } S_5 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{4 + 3\sqrt{3}}{4}$$



شکل ۶۷

مثال ۱۰ • مرکز چهار دایره با شعاع های مساوی a روی رئوس مربعی با ضلع a قرار دارند. مساحت سطح مشترک این دایره ها را محاسبه کنید (شکل ۶۸).


حل • بدلائل تقارن نتیجه می شود که چهار ضلعی $EKMP$ یک مربع است. از اینرو شکل مطلوب از یک مربع و چهار قطعه مساوی ترکیب شده است. برای محاسبه مساحت یکی از این قطعات قبل از هر چیزی بایستی زاویه مرکزی متناظر به آن را بیابیم. از آنجا که مثلث AKD متساوی الاضلاع است از اینرو $\angle KAD = 60^\circ$ بوده و در نتیجه $\angle BAK = 30^\circ$ خواهد بود. بطریق مشابه $\angle MAD = 30^\circ$ و در نتیجه $\angle KAM = 30^\circ$ حاصل می شود. با استفاده از قضیه ۲۴ مساحت یکی از این قطعات بصورت $S_{\text{قطعه}} = \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2} \right)$ حاصل می شود. برای محاسبه طول ضلع مربع $EKMP$ قانون

کسینوس ها را در مورد مثلث AKM بکار می‌گیریم:

$$KM^2 = AK^2 + AM^2 - 2AK \cdot AM \cdot \cos 30^\circ$$

یعنی: $KM^2 = a^2 + a^2 - 2a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = a^2(2 - \sqrt{3})$. سرانجام چنین حاصل می‌شود:

$$S = S_{\text{مربع}} + 4S_{\text{شعاع}} = a^2(2 - \sqrt{3}) + 2a^2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2} \right) = a^2 \left(1 + \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \right)$$



شکل ۶۸

مثال ۱۱ • دایره ای بر اضلاع AC و BC از مثلث ABC بترتیب در نقاط D و E مماس بوده و مرکز آن روی ضلع AB قرار دارد. اگر $AC=15\text{cm}$, $AB=14\text{cm}$, $BC=13\text{cm}$ باشد مساحت قطاع DOE را محاسبه کنید (شکل ۶۹).

حل • برای محاسبه شعاع قطاع روش مساحت ها را بکار می‌گیریم (به بخش ۱ مراجعه کنید). از طرف دیگر S . مساحت مثلث ABC را می‌توان طبق فرمول هرو (قضیه ۱۹۵) محاسبه کرد: $S=84\text{ cm}^2$

$$S = S_{AOC} + S_{BOC} = \frac{1}{2} AC \cdot DO + \frac{1}{2} BC \cdot OE = \frac{1}{2} (15 + 13) r = 14r$$


از اینرو $84 = 14r$ و $r = 6\text{ cm}$ را داریم. برای یافتن مساحت قطاع ضروری است که زاویه مرکزی آن یعنی زاویه DOE را بدست آوریم.

از چهارضلعی $ODCE$ نتیجه می‌شود که $\angle DOE = \pi - \gamma$ است بطوریکه در آن $\angle ACB = \gamma$ است. طبق قانون کسینوسها $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos \gamma$ را داریم.

بنابراین $14^2 = 15^2 + 13^2 - 2 \cdot 13 \cdot 15 \cdot \cos \gamma$ نتیجه می‌شود که از آن $\cos \gamma = \frac{99}{195}$ و در نتیجه $\gamma = \arccos \frac{99}{195}$ استنتاج می‌شود.

بدین ترتیب نتیجه می‌شود که زاویه مرکزی قطاع برابر $\pi - \arccos \frac{99}{195}$ است. طبق قضیه ۲۳ چنین حاصل می‌شود:

$$S_{\text{sector}} = \frac{1}{2} r^2 \left(\pi - \arccos \frac{99}{195} \right) = 18 \left(\pi - \arccos \frac{99}{195} \right)$$



شکل ۶۹

مثال ۱۲ • نقطه M در داخل مثلث ABC با اضلاع a, b, c طوری اختیار شده است که اتصال این نقطه به رئوس مثلث در داخل آن زوایای متساوی تشکیل می‌دهد. عبارت $AM + BM + CM$ را محاسبه کنید (شکل ۷۰).

حل • به عنوان تمایز با مسائل قبل می‌توان، گفت که این مسئله در مورد محاسبه مساحت یک شکل مستوی بحث نمی‌کند. از این گذشته همانطوریکه خواهیم دید، مساحت مثلث به عنوان وسیله ای برای حل مسئله استنتاج می‌شود. تساوی های $AM = x, BM = y, CM = z$ را منظور می‌کنیم. طبق فرض $\angle AMB = \angle BMC = \angle AMC = 120^\circ$ است.

با استفاده از قاعده کسینوس ها در مورد هر یک از مثلث های AMB, BMC, AMC دستگاه معادلات زیر حصول می‌یابد:

$$\begin{cases} a^2 = z^2 + y^2 + yz \\ b^2 = x^2 + z^2 + xz \\ c^2 = x^2 + y^2 + xy \end{cases}$$

از این گذشته چنین داریم:

$$S = S_{ABC} = S_{AMC} + S_{BMC} + S_{AMB} = \frac{1}{2}xz \sin 120^\circ + \frac{1}{2}yz \sin 120^\circ + \frac{1}{2}xy \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}(xz + yz + xy)$$

بنابراین $xy + xz + yz = \frac{4S}{\sqrt{3}}$ را خواهیم داشت که در آن $p = \frac{a+b+c}{2}$ است. یافتن مقدار عبارت $x + y + z$ مورد نیاز است. با جمع سه معادله دستگاه چنین حاصل می‌شود:

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$


$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} - \frac{1}{2}(xy + xz + yz)$$

از اینرو داریم:

$$(x + y + z)^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} + \frac{3}{2}(xy + xz + yz) = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{4S}{\sqrt{3}} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} + 2S\sqrt{3}$$

در نتیجه تساوی زیر بدست می‌آید:

$$x + y + z = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} + 2S\sqrt{3}}$$



شکل ۷۰

مثال ۱۳. در مثلث ABC ، $AC:BC = 2:1$ و $\angle C = \arccos \frac{3}{4}$ است. نقطه D را با شرط $CD:AD = 1:3$ روی ضلع AC اختیار می‌کنیم. نسبت شعاع دایره محیطی مثلث ABC بر شعاع دایره محیطی مثلث ABD را بدست آورید.

حل. پارامتر کمکی $CD = a$ را منظور می‌کنیم. آنگاه $AD = 3a$ ، $AC = 4a$ و $BC = 2a$ خواهد بود (شکل ۷۱). برای یافتن R ، شعاع دایره محیطی مثلث ABC به محاسبه ضلع AB بوسیله قانون کسینوسها مبادرت کرده و سپس قانون سینوسها را بکار می‌گیریم.

چنین داریم: $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos C$ ؛ یعنی:

$$AB^2 = 16a^2 + 4a^2 - 2 \cdot 4a \cdot 2a \cdot \frac{3}{4}$$

از این رابطه $AB = 2a\sqrt{2}$ استنتاج می‌شود. طبق فرض $\cos C = \frac{3}{4}$ بوده و از اینرو

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

را خواهیم داشت. طبق قانون سینوسها $\frac{AB}{\sin C} = 2R$ و در نتیجه $\frac{2a\sqrt{2} \cdot 4}{\sqrt{7}} = 2R$ را داریم.

از این رابطه، $R = \frac{4a\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$ بدست می‌آید. شعاع r دایره محیطی مثلث ABD با فرمول $r = \frac{S}{p}$ بدست می‌آید که در آن S مساحت و p نصف محیط مثلث ABD است.

می‌دانیم که $AD = 3a$ و $AB = 2a\sqrt{2}$ است. ضلع BD از مثلث BCD را طبق قانون کسینوسها بدست می‌آوریم: $BD^2 = a^2 + 4a^2 - 2 \cdot a \cdot 2a \cdot \frac{3}{4}$ ؛ از این تساوی $BD = a\sqrt{2}$ حصول می‌یابد.


از اینرو داریم: $p = \frac{3a + 2a\sqrt{2} + a\sqrt{2}}{2} = \frac{3a}{2} + \frac{3a\sqrt{2}}{2}$. مساحت S مثلث ABD با فرمول هرو محاسبه می‌شود:

$$S = \sqrt{p(p-AD)(p-AB)(p-BD)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{3a}{2} + \frac{3a\sqrt{2}}{2}\right) \left(\frac{3a\sqrt{2}}{2} - \frac{3a}{2}\right) \left(\frac{3a}{2} - \frac{a\sqrt{2}}{2}\right) \left(\frac{3a}{2} + \frac{a\sqrt{2}}{2}\right)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{9a^2}{2} - \frac{9a^2}{4}\right) \left(\frac{9a^2}{4} - \frac{a^2}{2}\right)} = \frac{3a^2\sqrt{7}}{4}$$

$$\cdot \frac{R}{r} = \frac{8}{7}(2 + \sqrt{2}) \text{ و } r = \frac{S}{p} = \frac{a\sqrt{7}}{2(\sqrt{2}+1)}$$



شکل ۷۱

مسائل

۱ • مساحت مثلث ها

- ۲۲۰ • اگر در مثلثی m_α و m_β میانه و α زاویه بین آنها باشد ثابت کنید که مساحت مثلث برابر است. $\frac{2}{3} m_\alpha m_\beta \sin \alpha$.
- ۲۲۱ • در مثلث ABC ، $\angle A = 30^\circ$ ، $AC = 3$ cm، $AB = 2$ cm بوده و شعاع دایره محیطی مثلث برابر 2 است. ثابت کنید که مساحت مثلث ABC از 3 cm^2 کمتر است.
- ۲۲۲ • اگر در مثلثی b و c ، طول دو ضلع از آن و S مساحت مثلث باشد، $S \leq \frac{b^2 + c^2}{4}$ را ثابت کنید.
- ۲۲۳ • اضلاع مثلثی برابر 55 cm، 55 cm و 66 cm است. مساحت مثلثی را پیدا کنید که رؤس آن پای نیمسازهای مثلث مطروحه است.
- ۲۲۴ • در مثلث ABC ، $AB = 13$ cm، $BC = 15$ cm و $AC = 14$ cm است. در این مثلث ارتفاع BH ، نیمساز BD و میانه BM را رسم می‌کنیم. (a) مساحت مثلث BHD را بدست آورید؛ (b) مساحت مثلث BMD را محاسبه کنید؛ (c) مساحت مثلث BHM را پیدا کنید.
- ۲۲۵ • روی هریک از میانه‌های مثلثی نقطه‌ای را اختیار می‌کنیم که آنها را به نسبت 1:5 تقسیم می‌کند. قطعه بزرگتر روی آنها در طرف رأس مثلث قرار دارد. اگر مساحت مثلث مفروض 64 cm^2 باشد مساحت مثلثی را بدست آورید که رؤس آن روی نقاط مطروحه در فرض مسئله قرار دارند.
- ۲۲۶ • مربعی در داخل مثلثی با قاعده a محاط شده است. اگر ضلع مربع از نصف قاعده مثلث بزرگتر بوده و مساحت مربع یک چهارم مساحت مثلث باشد آنگاه مساحت مثلث را محاسبه کنید.
- ۲۲۷ • بر مثلث ABC با زاویه $B = 60^\circ$ دایره‌ای به شعاع 4 cm محیط کرده ایم. قطری از دایره بر ضلع BC عمود بوده و AB را با شرط $AM:BM = 2:3$ در نقطه M قطع می‌کند. مساحت مثلث را محاسبه کنید.
- ۲۲۸ • اگر در مثلث قائم الزاویه ای مجموع سینوس های زوایای حاده آن برابر q باشد آنگاه مساحت مثلث را محاسبه کنید.
- ۲۲۹ • در مثلث قائم الزاویه ای اندازه یکی از زوایای حاده برابر α است. فاصله رأس حاده دیگر از مرکز دایره محاطی آن برابر m است. مساحت مثلث را محاسبه کنید.
- ۲۳۰ • در مثلث حاده الزاویه ABC ، $AB = c$ ، $AC = a$ بوده و در مورد میانه آن نیز $BD = m$ را داریم. همچنین $\angle BDA = \beta$ ($\beta < 90^\circ$) است. مساحت مثلث ABC را محاسبه کنید.
- ۲۳۱ • اندازه هریک از زاویه های مجاوره قاعده در مثلث متساوی الساقینی برابر α است. از رأس یکی از این زاویه ها خطی را عبور می‌دهیم که با قاعده زاویه β می‌سازد ($\beta < \alpha$). این خط مثلث را به دو قسمت تقسیم می‌کند. نسبت مساحت های این دو قسمت را بیابید.
- ۲۳۲ • از میانگانه یکی از اضلاع مثلث متساوی الاضلاع خطی را طوری رسم می‌کنیم که با آن ضلع

زاویه حاده α را تشکیل دهد. این خط مثلث مفروض را به دو بخش تقسیم می‌کند. نسبت مساحت‌های آنها را بیابید.

۲۳۳. در مثلث ABC ، $\angle A = \alpha$ و $\angle C = \gamma$ است. نیمساز BD ، ارتفاع BH و میانه BM را در این

مثلث رسم می‌کنیم. مطلوبست: (a) نسبت مساحت مثلث BDM به مساحت ABC ، (b) نسبت مساحت BHM به مساحت مثلث ABC ؛ (c) نسبت مساحت مثلث BHD به مساحت مثلث ABC .

۲۳۴. مساحت مثلثی با اضلاع a و b را که طول میانه بین این اضلاع برابر $l_c = l$ است بیابید.

۲۳۵. میانه AD در مثلث ABC دایره محیطی مثلث را در نقطه E قطع می‌کند. اگر

$AB + AD = DE$ ، $\angle BAD = 60^\circ$ و $AE = 6$ باشد مساحت مثلث ABC را محاسبه کنید.

۲۳۶. S مساحت یک مثلث و شعاع دایره محیطی آن است. $S < \frac{1}{2} \pi R^2$ را ثابت کنید.

۲۳۷. یکی از زوایای مثلثی برابر 60° است. نقطه تماس دایره محاطی آن ضلع مقابل به این زاویه را به

قطعاتی به طول‌های a و b تقسیم می‌کند. مساحت مثلث را محاسبه کنید.

۲۳۸. از نقطه M واقع بر ضلع AB مثلث ABC خطوطی را بصورت $MP \parallel BC$ و $MQ \parallel AC$ رسم

می‌کنیم. اگر مساحت مثلث BMQ برابر S_1 و مساحت مثلث ABC برابر S_2 باشد مساحت مثلث

AMP را بیابید.

۲۳۹. از نقطه ای واقع در درون مثلثی خطوطی به موازات اضلاع آن رسم می‌کنیم. این خطوط مثلث را

به شش قسمت تقسیم می‌کند که سه تا از آنها مثلث بوده و مساحت این مثلث‌ها برابر S_1 ، S_2 و S_3

است. مساحت مثلث اصلی را بیابید.

۲۴۰. دایره ای درون مثلثی با اضلاع 16 cm، 30 cm و 34 cm محاط شده است. مساحت مثلثی را پیدا

کنید که رئوس آن بر نقاط تماس دایره و مثلث فوق الذکر قرار دارد.

۲۴۱. مثلث ABC با ضلع $AC = 20$ cm درون دایره ای محاط شده است. از نقطه B خطی را بر دایره

مماس رسم می‌کنیم. فاصله نقاط A و C از خط مماس بترتیب برابر 25 cm و 16 cm است. مساحت

مثلث ABC را بدست آورید.

۲۴۲. از نقطه M واقع در درون مثلث ABC عمودهای MD ، ME و MF را بترتیب بر اضلاع AB ،

BC و AC رسم می‌کنیم. اگر $AB = c$ ، $MF = m$ ، $ME = k$ ، $AC = b$ ، $BC = a$ و $MD = n$

باشد نسبت مساحت مثلث‌های ABC و DEF را بدست آورید.

۲۴۳. در مثلث ABC ارتفاعات AD ، BE و CF را رسم می‌کنیم. اگر زوایای مثلث ABC برابر

α ، β و γ باشد در آنصورت نسبت مساحت مثلث‌های ABC و DEF را بیابید.

۲۴۴. وتر AB به کمانی از یک دایره نگاه می‌کند که طول آن یک سوم کمان محیط دایره است. نقطه

C را روی این کمان و نقطه D را روی وتر AB اختیار می‌کنیم.

اگر $AD = 2$ cm، $BD = 1$ cm و $CD = \sqrt{2}$ cm باشد مساحت مثلث ABC را بدست آورید.

۲۴۵ ● در مثلث ABC ، زاویه C برابر 60° و شعاع دایره محیطی برابر $2\sqrt{3}$ cm است. روی ضلع AB نقطه D را با شرایط $AD:DB = 2:1$ و $CD=2\sqrt{2}$ cm اختیار می‌کنیم. مساحت مثلث ABC را محاسبه کنید.

۲۴۶ ● زاویه A از مثلث متساوی الساقین ABC ($AB = BC$) برابر $\frac{5}{13}$ arcsin است. دایره‌ای که فاصله مرکز آن از رأس B برابر $\frac{13}{24}$ cm است ساق‌های AB و BC را به ترتیب در نقاط K و P قطع کرده و پاره خط EF را روی قاعده جدا می‌کند. اگر $PC = \frac{6}{5}$ cm باشد مساحت مثلث EPC را پیدا کنید.

۲۴۷ ● دایره‌ای بر مثلث ABC محیط شده است. در نقطه B دایره مماس رسم می‌کنیم و این مماس خط AC را در نقطه D قطع می‌کند. نقطه C بین A و D قرار دارد.

اگر $BD = 29$ cm و $\angle BDC = \arccos \frac{21}{29}$ بوده و فاصله مرکز دایره تا AC برابر 10 cm باشد آنگاه مساحت مثلث BCD را بدست آورید.

۲ ● مساحت چهارضلعی‌ها

۲۴۸ ● از رئوس یک چهارضلعی خطوطی را به موازات اقطار آن رسم می‌کنیم. ثابت کنید که مساحت متوازی الاضلاع حاصله دو برابر چهارضلعی مفروض است.

۲۴۹ ● طول اضلاع غیرموازی متوازی الاضلاعی برابر a و b و زاویه بین آنها برابر α است. مساحت چهارضلعی حاصل از تقاطع نیمسازهای داخلی متوازی الاضلاع را محاسبه کنید.

۲۵۰ ● میانهٔ دوزنقه متساوی الساقینی برابر a و اقطار آن متعامد هستند. مساحت دوزنقه را محاسبه کنید.

۲۵۱ ● محیط دوزنقه‌ای برابر 52 cm و طول قاعده کوچکتر آن برابر 1 cm است. اگر اقطار دوزنقه نیمساز زوایای منفرجه آن باشد مساحت دوزنقه را محاسبه کنید.

۲۵۲ ● دو دایره با شعاع‌های 4 cm و 8 cm و با مراکز O_1 و O_2 همدیگر را در نقاط C و D قطع کرده و AB مماس مشترک خارجی آنها محسوب می‌شود. اگر مماس‌های مرسوم بر دو دایره در نقطه C متعامد باشند مساحت چهارضلعی $O_1 A B O_2$ را محاسبه کنید.

۲۵۳ ● دو دایره با شعاع R و مراکز O_1 و O_2 بر هم مماس خارجی هستند. خط مستقیم l دو دایره را در نقاط A ، B ، C و D با شرط $AB=BC=CD$ قطع می‌کند. مساحت چهارضلعی $O_1 A D O_2$ را بدست آورید.

۲۵۴ ● اضلاع مثلثی برابر 20 cm، 34 cm و 42 cm است. یکی از ارتفاعات از طرف رأس به نسبت $3:1$ تقسیم شده است. در این نقطه تقسیم خطی را بر ارتفاع عمود کرده ایم. مساحت دوزنقه حاصله را بدست آورید.

۲۵۵ ● اضلاع مثلثی برابر 20 cm، 34 cm است. اگر محیط مستطیل محاط در این دایره برابر 45 cm

باشد مساحت آن را بدست آورید.

۲۵۶. طول قاعده‌های دوزنقه‌ای برابر 20 cm ، 62 cm و طول اضلاع غیرموازی آن برابر 45 cm و 39 cm است. مساحت دوزنقه را محاسبه کنید.

۲۵۷. طول قاعده‌های دوزنقه‌ای برابر 30 cm و 112 cm ، و طول اقطار آن نیز برابر 20 cm و 34 cm است. مساحت این دوزنقه را محاسبه کنید.

۲۵۸. طول یکی از قاعده‌های دوزنقه‌ای برابر 7 cm است. دایره محاط در دوزنقه یکی از اضلاع جانبی آن را به دو پاره خط به طولهای 4 cm و 9 cm تقسیم می‌کند، مساحت دوزنقه را محاسبه کنید.

۲۵۹. در دوزنقه $ABCD$ ، نقطه K میانگاه قاعده AD ، نقطه M میانگاه قاعده BC ، BK نیمساز زاویه ABC و DM نیز نیمساز زاویه ADC است. اگر محیط دوزنقه $ABCD$ برابر 30 cm و $\angle BAD = 60^\circ$ باشد مساحت این دوزنقه را محاسبه کنید.

۲۶۰. در چهارضلعی $ABCD$ نقاط P ، F ، E و K بترتیب میانگاه اضلاع AB ، BC ، CD و AD است. اگر $AC = 15\text{ cm}$ و $BD = 20\text{ cm}$ و $EP = KF$ باشد مساحت چهارضلعی $ABCD$ را محاسبه کنید.

۲۶۱. در یک متوازی‌الاضلاع، اضلاع a و b ($a > b$)، α ، اندازه زاویه بین قطرهای معلوم است. مساحت این متوازی‌الاضلاع را محاسبه کنید.

۲۶۲. در دوزنقه‌ای یکی از قاعده‌ها، قطر دایره‌ای به شعاع R محسوب می‌شود که بر دوزنقه محیط است. اندازه زاویه یکی از زوایای حاده در این دوزنقه برابر α است. مساحت دوزنقه را محاسبه کنید.

۲۶۳. دایره‌ای در دوزنقه‌ای با زوایای حاده α و β محاط شده است. نسبت مساحت دوزنقه را به مساحت دایره محاسبه کنید.

۲۶۴. در مثلث ABC ، $\angle A = \alpha$ ، $\angle B = \beta$ ، $\angle C = \gamma$ ، و ارتفاع $BD = H$ را داریم. روی ضلع BD به عنوان قطر، دایره‌ای رسم می‌کنیم و این دایره اضلاع AB و BC را بترتیب در نقاط E و F قطع می‌کند. مساحت چهارضلعی $BFDE$ را محاسبه کنید.

۲۶۵. خط مستقیم l به موازات قاعده AC از مثلث ABC مثلث BED را از این مثلث جدا می‌کند. نقطه دلخواه M را روی ضلع AC اختیار می‌کنیم. ثابت کنید که مساحت چهارضلعی $BEMD$ بین مساحت مثلث ABC و مساحت مثلث BED واسطه هندسی است.

۲۶۶. اقطار دوزنقه $ABCD$ ($AD \parallel BC$) همدیگر را در نقطه O قطع می‌کند. اگر مساحت مثلث AOD برابر a^2 و مساحت مثلث BOC برابر b^2 باشد مساحت دوزنقه را محاسبه کنید.

۲۶۷. در لوزی $ABCD$ ، نقاط M ، N ، P و Q بترتیب میانگاه‌های اضلاع AB ، BC ، CD و AD است. اگر مساحت لوزی برابر 100 cm^2 باشد مساحت چهارضلعی محصور با خطوط DM ، BP ، CQ را محاسبه کنید.

۲۶۸ • دایره‌هایی به شعاع a و b برهم مماس خارجی هستند. مماس‌های مشترک خارجی آنها را رسم می‌کنیم. مساحت چهارضلعی ای را بیابید که رئوس آن نقاط تماس خطوط و دایره‌ها محسوب می‌شود.

۲۶۹ • اقطار چهارضلعی $ABCD$ همدیگر را در نقطه O قطع می‌کنند. اگر مساحت‌های مثلث‌های AOB ، BOC و COD برابر 12 cm^2 ، 18 cm^2 و 24 cm^2 باشند مساحت چهارضلعی را محاسبه کنید.

۲۷۰ • دایره‌ای بر اضلاع AB و AD از مستطیل $ABCD$ مماس بوده و از رأس C آن عبور می‌کند. این دایره ضلع DC را در نقطه K قطع می‌کند. اگر $AB = 9 \text{ cm}$ و $AD = 8 \text{ cm}$ باشد مساحت چهارضلعی $ABKD$ را محاسبه کنید.

۲۷۱ • نقطه M را در درون مستطیل $ABCD$ طوری اختیار می‌کنیم که:

$AM = \sqrt{2}$ ، $BM = 2$ و $CM = 6$ باشد. اگر $AD = 2AB$ باشد مساحت مستطیل $ABCD$ را محاسبه کنید.

۳ • مساحت چندضلعی‌ها

۲۷۲ • روی اضلاع AC و BC ، و وتر AB مثلث قائم الزاویه ABC و در بیرون آن مربع‌های $CMPA$ ، $BEFC$ و $ADKB$ را رسم می‌کنیم. اگر $AB = c$ و $S_{\Delta ABC} = S$ باشد مساحت شش ضلعی $DKEFMP$ را محاسبه کنید.

۲۷۳ • روی اضلاع AC ، BC و AB از مثلث ABC مربع‌های $CMPA$ ، $BEFC$ و $ADKB$ را رسم می‌کنیم. اگر $AB = 13 \text{ cm}$ ، $AC = 14 \text{ cm}$ و $BC = 15 \text{ cm}$ باشد مساحت شش ضلعی $DKEFMP$ را محاسبه کنید.

۲۷۴ • روی گوشه‌های مربعی به ضلع a ، قطعاتی را طوری می‌بریم که یک هشت ضلعی منتظم بدست آید. مساحت این هشت ضلعی را محاسبه کنید.

۲۷۵ • مربعی با ضلع a معلوم است. روی هر یک از اضلاع مربع و خارج آن دوزنقه‌هایی را طوری رسم می‌کنیم که قاعده‌های بالائی و اضلاع جانبی آن‌ها یک دوازده ضلعی منتظم تشکیل دهند. مساحت این دوازده ضلعی را محاسبه کنید.

۲۷۶ • دایره‌ای را با نقاط A ، B ، C ، D ، E ، F ، P ، K به هشت قسمت تقسیم کرده ایم. می‌دانیم که $AB = 2BC$ و $BC = \cup DE = \cup FP = \cup KA$ ، $AB = \cup CD = \cup EF = \cup PK$ است. اگر مساحت دایره برابر $289\pi \text{ cm}^2$ باشد مساحت هشت ضلعی $ABCDEFPK$ را محاسبه کنید.

۲۷۷ • در درون دایره‌ای به شعاع R یک مثلث متساوی‌الاضلاع و یک مربع را که دارای یک رأس مشترک هستند محاط کرده ایم. مساحت مقطع این دو شکل را محاسبه کنید.

۲۷۸ • هر یک از اضلاع مثلثی را به قسمت‌های با نسبت $3:2:3$ تقسیم کرده ایم. از اتصال این نقاط یک شش ضلعی بدست می‌آید. نسبت مساحت شش ضلعی را بر مساحت مثلث محاسبه کنید.

۲۷۹ • مساحت چهارضلعی $ABCD$ برابر 12 cm^2 است. نقاط F ، K ، M و P را بترتیب روی اضلاع

AB, BC, CD و DA طوری انتخاب می‌کنیم که $AF:FB = 2:1$ ، $BK:KC = 1:3$ ، $CM:MD = 1:1$ و $DP:PA = 1:5$ باشد.

مساحت شش ضلعی $AFKCM$ را محاسبه کنید.

۴. مساحت اشکال مرکب

۲۸۰. اضلاع مثلثی برابر 20 cm ، 34 cm و 42 cm است. نسبت مساحت دایره محاطی مثلث را بر دایره محاطی آن محاسبه کنید.

۲۸۱. طول ضلع مثلث متساوی الاضلاعی برابر a است. روی یک ضلع آن به عنوان قطر، دایره‌ای را رسم می‌کنیم. قسمتی از مساحت مثلث را که در خارج دایره قرار دارد محاسبه کنید.

۲۸۲. دایره‌ای در مثلث متساوی الاضلاعی محاط شده است. دایره‌ای دیگری رسم می‌کنیم. مرکز این دایره بر یکی از رئوس مثلث واقع بوده و شعاع آن نصف ضلع مثلث است. مساحت مقطع این دو شکل چه قسمتی از مساحت مثلث محسوب می‌شود؟

۲۸۳. دو دایره با شعاعهای a و b ($a > b$) بر هم مماس خارجی هستند. مماس مشترک خارجی آنها را رسم می‌کنیم. مطلوبست: (a) محاسبه مساحت مثلث خمیده حاصله؛ (b) مساحت دایره محاط در این مثلث.

۲۸۴. طول ضلع مثلث متساوی الاضلاعی برابر a است. گرانیگاه مثلث مرکز دایره‌ای به شعاع $\frac{a}{3}$ محسوب می‌شود. مساحت قطعه‌ای از دایره را پیدا کنید که در خارج دایره قرار دارد.

۲۸۵. روی اضلاع مربعی به طول ضلع a ، نیم‌دایره‌هایی در خارج مربع رسم می‌کنیم بطوریکه اضلاع مربع قطر آنها محسوب می‌شوند. مساحت شکل گلبرگی حاصل را بدست آورید.

۲۸۶. n دایره مساوی را طوری کنار هم قرار می‌دهیم که در کناره هر یک از آنها دو دایره بصورت مماس قرار گیرند. هر یک از دایره‌ها از طریق نقاط تماس به دو کمان تقسیم می‌شوند. کمانهای نزدیک بهم این دایره شکلی را بوجود می‌آورند که محاسبه مساحت آن در هر یک از حالات زیر با در نظر گرفتن شعاع هر یک از دایره‌ها برابر R ، مطلوب شده است: $n = 3(a)$ ؛ $n = 4(b)$ ؛ $n = 6(c)$

۲۸۷. از نقطه‌ای واقع بر روی دایره‌ای به شعاع R دو وتر مساوی که زاویه بین آنها برابر α است رسم می‌کنیم. مساحت قسمتی از دایره را پیدا کنید که بین این دو وتر محصور است.

۲۸۸. طول ضلع شش ضلعی منتظم $ABCDEF$ برابر a و مرکز آن نیز نقطه O است. سه دایره رسم می‌کنیم: دایره اول به مرکز A از نقاط E و C عبور می‌کند، دایره دوم با مرکز B از نقاط O و C می‌گذرد، و دایره سوم به مرکز K از نقاط O و E عبور می‌کند. مساحت شکلی را که در درون شش ضلعی با این دایره‌ها محدود شده است محاسبه کنید.

۲۸۹. دو دایره با شعاع‌های R و $2R$ و با مراکز O_1 و O_2 طوری ترتیب یافته‌اند که طول خط‌المركزین

آنها $2R\sqrt{3}$ است. مساحت شکلی را پیدا کنید که با پاره خط های مماس و کمانهای بزرگتر دایره ها که نقاط تماس را در آن دایره ها بهم وصل می کنند محدود شده است.

۲۹۰. قاعده مثلثی برابر a و زاویه های مجاور قاعده برابر 15° و 45° است. رأس مقابل به این قاعده را مرکز دایره ای به شعاع ارتفاع مرسوم از این رأس در نظر گرفته و آن دایره را رسم می کنیم. مساحت قطعه ای از این دایره را بیابید که در درون مثلث واقع شده است.

۲۹۱. دو دایره هم شعاع طوری ترتیب یافته اند که طول خط مرکزین آنها برابر شعاع یکی از آنهاست. نسبت مساحت مقطع دو دایره را به مساحت مربع محاط در این مقطع بیابید.

۲۹۲. در نیمدایره ای با قطر AB نقطه دلخواه C روی قطر AB اختیار شده است. در نقطه C عمود CD را بر قطر وارد می کنیم. این عمود نیمدایره را در نقطه D قطع می کند. روی AC و CB به عنوان قطر دو نیمدایره در درون نیمدایره اول می زنیم. ثابت کنید که مساحت شکل محصور با این سه نیمدایره با مساحت دایره رسم شده بر روی قطر CD برابر است.

۲۹۳. در مثلث ABC ، $\angle A = \alpha$ ، $\angle B = \beta$ و $AC = b$ است. ارتفاعات AD و BE همدیگر را در نقطه H قطع می کنند. دایره ای را بر مثلث HDE محیط می کنیم. مساحت مقطع دایره و مثلث را بیابید.

۲۹۴. n ضلعی منتظمی با طول ضلع a مفروض است. n دایره را در درون این n ضلعی طوری رسم می کنیم که هر یک از آنها بر دو دایره و یک ضلع n ضلعی مماس باشد. مساحت «شکل ستاره ای» تشکیل شده در درون n ضلعی را بیابید.

۲۹۵. n ضلعی منتظمی با طول ضلع a مفروض است. n دایره را در درون این n ضلعی طوری رسم می کنیم که هر یک از آنها بر دو دایره و دو ضلع مجاور از n ضلعی مماس باشد. مساحت «شکل ستاره ای» درون n ضلعی را محاسبه کنید.

۵. مسائل گوناگون

۲۹۶. مساحت مثلثی برابر 16 cm^2 و میانه های m_a و m_b بر ترتیب برابر 16 cm و 4 cm است. ثابت کنید که این میانه ها متعامد هستند.

۲۹۷. نقطه دلخواهی در درون n ضلعی منتظمی اختیار شده است. از این نقطه عمودهایی را بر اضلاع و یا امتداد آنها رسم می کنیم. ثابت کنید که حاصل جمع این عمودها مقدار ثابت است.

۲۹۸. از گرانگه مثلث متساوی الاضلاع ABC خطی را به موازات ضلع AB رسم می کنیم. در درون مثلث روی این خط نقطه دلخواه M را اختیار کرده و از این نقطه عمودهای MD ، ME و MF را بر ترتیب بر اضلاع AB ، AC و BC رسم می کنیم. ثابت کنید که: $MD = \frac{1}{2}(ME + MF)$

۲۹۹. ثابت کنید که: $\frac{1}{r} = \frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}$. در این رابطه h_1 ، h_2 و h_3 ارتفاعات مثلث و r شعاع

دایره محاطی آن است.

۳۰۰. در روی ضلع AC از مثلث ABC نقطه D را اختیار می‌کنیم. r_1 و r_2 بترتیب شعاع دایره‌های محاطی مثلث‌های ABD و BDC است. r نیز شعاع دایره محاطی مثلث ABC است. ثابت کنید که: $r < r_1 + r_2$

۳۰۱. مساحت چهارضلعی محدب $ABCD$ برابر 3024 cm^2 و طول اقطار آن برابر 144 cm و 42 cm است. طول پاره‌خطی را پیدا کنید که میانگاهای اضلاع AB و CD را بهم وصل می‌کند.

۳۰۲. مساحت مثلث متساوی‌الساقینی برابر S و زاویه بین میانه‌های وارد بر ساق‌های آن برابر α است. طول قاعده مثلث را محاسبه کنید.

۳۰۳. طول دو ضلع از مثلثی برابر a و b و اندازه زاویه بین آنها برابر γ است. مطلوبست محاسبه: (a) نیمساز l_c ; (b) ارتفاع h_c

۳۰۴. طول قاعده مثلثی برابر a و ارتفاع آن برابر h است. اگر زاویه بین اضلاع جانبی آن برابر α باشد مجموع اضلاع جانبی را محاسبه کنید.

۳۰۵. یکی از زوایای مثلثی برابر تفاضل دوزاویه دیگر است. در این مثلث طول ضلع کوچکتر برابر 1 cm و مجموع مساحت‌های تشکیل شده بر روی دو ضلع دیگر دو برابر مساحت دایره محیطی مثلث است. طول ضلع بزرگتر مثلث را محاسبه کنید.

۳۰۶. از مثلثی طول دو ضلع a و b ($a > b$) و مساحت S معلوم است. زاویه بین ارتفاع و میانه مرسوم از رأس مشترک دو ضلع معلوم را پیدا کنید.

۳۰۷. مساحت S و زاویه‌های α ، β و γ مثلثی معلوم هستند. طول ارتفاع مرسوم از رأس α را پیدا کنید.

۳۰۸. در مثلث ABC دایره‌ای محاط شده است که بر ضلع AB در نقطه M و بر ضلع AC در نقطه N مماس است. زاویه BAC و شعاع دایره محاطی را پیدا کنید. با این شرط که $AM = 1 \text{ cm}$ ، $BM = 6 \text{ cm}$ و $CN = 7 \text{ cm}$ باشد.

۳۰۹. مساحت مستطیل $ABCD$ برابر 48 cm^2 و قطرهای آن نیز معادل 10 cm است. نقطه O به فاصله 13 cm از رئوس B و D قرار دارد. فاصله نقطه O را از دورترین رأس مستطیل محاسبه کنید.

۳۱۰. طول‌های اضلاع مثلثی با اندازه‌های a ، b و c یک تصاعد حسابی افزایشی تشکیل می‌دهند. ثابت کنید که $ac = 6Rr$ است. در این رابطه R و r بترتیب شعاع دایره‌های محیطی و محاطی است.

۳۱۱. طول قاعده‌های دوزنقه‌ای برابر a و b است. طول پاره‌خطی را پیدا کنید که دوزنقه را به دو قطعه هم‌ارز تقسیم می‌کند و با قاعده‌ها موازی بوده و با دو ضلع جانبی دوزنقه محصور شده است.

۳۱۲. در دوزنقه $ABCD$ ، در مورد یکی از قاعده‌ها $AD = BC = 12 \text{ cm}$ را داریم. نقطه M را روی امتداد BC در طرف نقطه C طوری اختیار می‌کنیم که خط AM روی دوزنقه مثلثی بوجود آورد و مساحت

این مثلث معادل یک سوم مساحت ذوزنقه باشد. طول پاره خط CM را محاسبه کنید.

۳۱۳. ارتفاعات AD ، CE در مثلث منفرجه الزاویه ABC را از رئوس A و C رسم می‌کنیم. می‌دانیم که مساحت مثلث ABC برابر 18 cm^2 ، مساحت مثلث BDE برابر 2 cm^2 و طول پاره خط DE برابر $2\sqrt{2} \text{ cm}$ است. شعاع دایره محیطی مثلث ABC را محاسبه کنید.

۳۱۴. ارتفاعات AD و CE از مثلث منفرجه الزاویه ABC از رئوس A و C رسم شده‌اند. می‌دانیم که مساحت مثلث ABC برابر 64 cm^2 و مساحت مثلث BDE برابر 16 cm^2 است. طول پاره خط DE را محاسبه کنید، با این شرط که شعاع دایره محیطی مثلث ABC برابر $16\sqrt{3} \text{ cm}$ باشد.

۳۱۵. روی اضلاع AB و AC از مثلث ABC با مساحت 6 cm^2 نقاط K و M را بر ترتیب طوری انتخاب می‌کنیم که $AK:BK = 2:3$ و $AM:CM = 5:3$ باشد. خطوط CK و BM همدیگر را در نقطه P قطع می‌کنند. اگر فاصله P تا خط AB برابر 1.5 cm باشد طول AB را محاسبه کنید.

۳۱۶. در مثلث متساوی الساقین ABC ($AB = BC$) نیمساز AD را رسم می‌کنیم. اگر $S_{\Delta ABD} = S_{\Delta ADC} = S_0$ باشد AC را پیدا کنید.

۳۱۷. در مثلث ABC ، نقطه H مرکز ارتفاعی است. اگر $AB = 13 \text{ cm}$ ، $BC = 14 \text{ cm}$ و $AC = 15 \text{ cm}$ باشد طول پاره خط AH را پیدا کنید.

۳۱۸. مرکز دایره محاطی در مثلثی را به رئوس مثلث وصل می‌کنیم. در نتیجه سه مثلث بدست می‌آید که مساحت‌های آنها برابر 4 cm^2 ، 13 cm^2 و 15 cm^2 می‌باشند. طول اضلاع مثلث اصلی را بیابید.

۳۱۹. در مثلث ABC می‌دانیم که $BC:AC = 3$ و $\angle C = 30^\circ$ است. روی AB نقاط D و K را طوری اختیار می‌کنیم که $\angle ACD = \angle DCK = \angle KCB$ باشد. نسبت $CD:CK$ را محاسبه کنید.

۳۲۰. در مثلث ABC میانه BD رسم شده است. اگر $AB = 2$ ، $AC = 6$ و $\angle BAC = 60^\circ$ باشد نسبت شعاع دایره محیطی مثلث ABD را بر شعاع دایره محاطی مثلث ABC محاسبه کنید.

۳۲۱. در مثلث ABC می‌دانیم که $AC:BC = 1:3$ و $\angle ACB = \arctan \frac{\sqrt{5}}{2}$ است. روی ضلع AC نقطه D را طوری اختیار می‌کنیم که $AC = CD$ باشد. نسبت مساحت دایره محیطی مثلث ACD را بر مساحت دایره محاطی مثلث ABD محاسبه کنید.

بخش ۵. تبدیلات هندسی

در اینجا مفاهیم تقارن مرکزی و نیز ترکیب تقارن‌های مرکزی را بوسیله مثال‌هایی مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

مثال ۱. از نقطه‌ای واقع در درون دایره‌ای وتری را رسم می‌کنیم که توسط نقطه مزبور نصف شود.

حل. دایره متقارنی را نسبت به دایره مزبور حول نقطه مفروض رسم می‌کنیم. وتر مشترک دو دایره، وتر مطلوب خواهد بود.


مثال ۲ • پنج ضلعی ای رسم کنید که میانگاه های اضلاع آن معلوم است.

حل • میانگاه های اضلاع پنج ضلعی را با M, N, P, Q, K نشان می دهیم. نقطه دلخواه A را اختیار کرده و ترکیب تقارن های مرکزی $Z_M \circ Z_N \circ Z_P \circ Z_Q \circ Z_K$ را مورد ملاحظه قرار می دهیم.

این ترکیب نسبت به نقطه A چه کاری انجام می دهد؟ اگر این ترکیب را با δ نشان دهیم آنگاه $\delta(A) = A$ خواهد بود (شکل ۷۲). اگر $Z_S(A) = Z_P \circ Z_N \circ Z_M(A)$ فرض شود آنگاه

$Z_K \circ Z_Q \circ Z_S(A) = A$ خواهد بود. متوازی الاضلاع های $MNPS$ و $SQKA$ را رسم می کنیم

و پنج ضلعی مطلوب بدین ترتیب بدست می آید. دو مثال از کاربرد تقارن محوری را مورد ملاحظه قرار می دهیم.



شکل ۷۲

مثال ۳ • دو دایره ω_1 و ω_2 و خط مستقیم l مفروض است. یک مثلث متساوی الاضلاع را طوری رسم کنید که دور رأس آن روی دو دایره و رأس سوم آن نیز متعلق به خط مفروض باشد (شکل ۷۳).


حل • فرض کنید که $\triangle ABC$ ، مثلث مطلوب باشد. از آنجا که ارتفاع AD از مثلث متساوی الاضلاع ABC به خط l تعلق دارد از اینرو نقاط B و C نسبت به این خط متقارن بوده و روی دایره های مفروض ω_1 و ω_2 واقع خواهند بود.

از آنجا که نقطه C به دایره ω_2 متعلق بوده و نسبت به خط l متقارن نقطه B از دایره ω_1 است از اینرو نقطه C نیز به تصویر متقارن دایره ω_1 نسبت به خط l متعلق خواهد بود. در نتیجه، C نقطه مشترک دایره ω_2 و تصویر دایره ω_1 نسبت به محور S_1 خواهد بود. بدین ترتیب با رسم دایره ω'_1 که متقارن دایره ω_1 نسبت به محور l است، نقطه C بدست می آید. نقطه B تصویر متقارن نقطه C نسبت به محور تقارن l بوده و تصویر نقطه A نسبت به این محور نیز بر روی خود منطبق می شود.

بنابراین برای رسم مثلث مطلوب به ترتیب زیر باید عمل کنید: (۱) تصویر دایره ω_1 را نسبت به محور تقارن S_1 پیدا کنید؛ (۲) نقاط تقاطع دایره های ω_1 و ω_2 را بیابید؛ (۳) روی دایره ω_1 تصاویر نقاط تلاقی دایره های ω_1 و ω_2 را بدست آورید؛ (۴) مثلث متساوی الاضلاع ABC را رسم کنید که رأس A آن نیز به خط S_1 متعلق است.

اگر دایره های ω_1 و ω_2 متقاطع باشند در آنصورت مسئله چهار جواب خواهد داشت. اگر دایره های ω_1 و ω_2 بر هم مماس باشند مسئله دو جواب پیدا می کند. در صورت انطباق دایره ω_1 بر دایره ω_2 مسئله دارای بینهایت جواب خواهد شد. در صورت فقدان نقطه تقاطع برای دایره های ω_1 و ω_2 مسئله فاقد جواب


می شود.



شکل ۷۳

مثال ۴ • روی قطر AB از نیمدایره ای، نقطه P و روی محیط آن نقاط M, M_1, N و N_1 را طوری انتخاب می کنیم که $\angle MPA = \angle M_1PB$ و $\angle NPA = \angle N_1PB$ باشد.

ثابت کنید که نقطه Q ، محل تلاقی وترهای MN_1 و M_1N به خط عمود مرسوم از P بر قطر AB متعلق است (شکل ۷۴).



شکل ۷۴

حل • M' و N' متقارن نقاط M و N را نسبت به خط AB پیدا می کنیم. نقاط M', P و M_1 روی یک خط، و نقاط N', P و N_1 نیز روی یک خط دیگر قرار دارند. دایره ای را می توان بر چهارضلعی PQN_1M_1 محیط کرد. از این رو $\angle QPN_1 = \angle N_1M_1Q$ خواهد بود. حال چهارضلعی $PQNM$ را مورد ملاحظه قرار می دهیم که دارای همان ویژگی بالاست: $\angle NPQ = \angle NMQ$. از تساوی مثلث های NMQ و N_1M_1Q نتیجه می شود که $\angle NPQ = \angle N_1PQ$ و $PQ \perp AB$ است.

مثال ۵ • مثلث متساوی الاضلاعی رسم کنید که یک رأس آن بر نقطه معین A و دو رأس دیگر روی دو دایره معلوم قرار داشته باشد.


حل • یکی از دایره ها را حول مرکز دوران A و با زاویه 60° دوران می دهیم. نقطه تلاقی دایره دیگر با دایره رسم شده رأس دوم مثلث مطلوب خواهد بود.

مثال ۶ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC مربعات $ABMN$ و $BCQP$ را رسم می کنیم. مرکز آنها را با O_1 و O_2 ، میانگاه ضلع AC را با K و میانگاه پاره خط MP را با L نشان می دهیم. ثابت کنید که چهارضلعی KLO_2O_1 یک مربع است.


حل • حالتی را در نظر بگیرید که مربعا در بیرون مثلث ABC رسم شوند.

توجه دارید که ترکیب $R_{O_1}^{270^\circ} \circ R_{O_1}^{270^\circ}$ نقطه A را به نقطه C انتقال داده و از اینرو $R_K^{180^\circ} \circ R_{O_1}^{270^\circ} = R_{O_1}^{270^\circ}$ خواهد بود. از اینرو نتیجه می شود که مثلث O_1O_2K یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین است. بطریق مشابه $R_{O_2}^{90^\circ} \circ R_{O_1}^{90^\circ} = R_L^{180^\circ}$ بوده و از اینرو مثلث O_1O_2L نیز قائم الزاویه متساوی الساقین ($\angle L = 90^\circ$) خواهد بود. بنابراین O_1LO_2K یک مربع خواهد بود (شکل ۷۵a).

در حالتی که مربع ها به سوی داخل مثلث رسم می شوند نیز مسئله به روش مشابهی حل می شود (شکل ۷۵b).




شکل ۷۵



در ذیل چند مثال در مورد کاربرد «انتقال» مورد بررسی قرار می دهیم.
 مثال ۷ • دو خط موازی P و Q را خط سوم S قطع کرده است. مثلث متساوی الاضلاع با طول ضلع معین را طوری رسم کنید که رئوس آن به خطوط P, Q و S متعلق باشد (شکل ۷۶).

حل • از نقطه اختیاری A_1 روی خط Q دایره ای به شعاع برابر با طول ضلع مثلث رسم می کنیم. این دایره خط P را در نقطه C_1 قطع می کند. مثلث متساوی الاضلاع $A_1B_1C_1$ را رسم می کنیم. از نقطه B_1 خط مستقیم h را به موازات P رسم می کنیم. نقطه تقاطع خطوط h و S را با B نشان می دهیم. آنگاه مثلث $A_1B_1C_1$ را به اندازه v که برابر $\vec{v} = \vec{B_1B}$ است انتقال می دهیم. مسئله می تواند دارای دو جواب، یک جواب و یا فاقد جواب باشد.




شکل ۷۶

مثال ۸ • دو دایره ω_1 و ω_2 و خط مستقیم l مفروض اند. خط مستقیمی به موازات خط l طوری رسم

کنید که دایره های ω_1 و ω_2 روی آن وترهای مساوی درست کنند (شکل ۷۷)

حل • فرض کنید که خط l' روی دایره های مفروض وترهای مساوی AB و $A'B'$ را جدا کند. در این حالت نقاط A و A' ، B و B' را می توان متناسب به انتقال $T_{O_1, O_1'}$ مورد ملاحظه قرار داد که در آن برداری $\vec{O_1 O_1'}$ است که مبدأ آن O_1 یعنی مرکز دایره ω_1 است. در این صورت O_1' مرکز دایره ω_1 خواهد بود. بدلیل اینکه نقطه A تصویر نقطه A' از دایره ω_1 است از اینرو نقطه A' به تصویر ω_1 متعلق خواهد بود.



شکل ۷۷


بنابراین نقطه A' ، نقطه مشترک دایره های ω_1 و ω_1' در انتقال با $T_{O_1, O_1'}$ خواهد بود.

در رسم نقطه A' ، پیش نگار آن را روی دایره ω_1 پیدا می کنیم و آنگاه خط AA' ، همان خط مطلوب خواهد بود. اگر دایره ω_1 بر دایره ω_2 منطبق باشد مسئله دارای بینهایت جواب خواهد بود. در همه حالات دیگر مسئله بیش از یک جواب ندارد.

در مثال های زیر چگونگی کاربرد «انتقال متجانس» بررسی می شود.

مثال ۹ • در ذوزنقه $ABCD$ اقطار AC و BD در نقطه M همدیگر را قطع می کنند (AB و CD قاعده های ذوزنقه هستند). مساحت های مثلث های ABM و CDM را با S_1, S_2 و مساحت ذوزنقه را با S نشان می دهیم.

ثابت کنید که بین این مساحت ها رابطه $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} = \sqrt{S}$ برقرار است (شکل ۷۸).



شکل ۷۸


حل • محل تلاقی خط AB و خط مآبر C به موازات DB را N نشان می دهیم.

مساحت مثلث ACN با S ، مساحت ذوزنقه مفروض برابر است. خط BF را به موازات AC رسم می کنیم. مساحت مثلث BFN با S_1 ، مساحت مثلث DMC برابر است. مثلث های AMB و BFN

با نسبت های k_1 و k_2 مجانس مثلث ACN هستند و بین این نسبت ها رابطه $k_1 + k_2 = 1$ برقرار است. ولی $k_1 = \frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S}}$ و $k_2 = \frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S}}$ را داریم و از اینرو $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} = \sqrt{S}$ خواهد بود.

مثال ۱۰ • در مثلث ABC دایره ای محاط شده است که بر ضلع AB در نقطه M مماس است. نقطه M_1 را انتهای قطری از این دایره در نظر می گیریم که انتهای دیگر آن بر نقطه M منطبق است. ثابت کنید خط CM_1 خط AB را در نقطه C_1 قطع می کند بطوریکه $BC + BC_1 = AC + AC_1$ را داریم.

(شکل ۷۹)



شکل ۷۹

حل • بردایره مماسی در نقطه M_1 رسم می‌کنیم و این مماس AC را در A_1 و BC را در B_1 قطع می‌کند. آنگاه بدیهی است که $CA_1 + A_1M_1 = CB_1 + B_1M_1$ خواهد بود. همچنین از این حقیقت که مثلث‌های ABC و $A_1B_1C_1$ متجانس هستند استفاده می‌کنیم. دلیل این امر این است که $AB \parallel A_1B_1$ و از اینر و عمود بوده MM_1 بر قطر A_1B_1 خواهد بود.

۱ • تقارن نسبت به یک نقطه

۳۲۲ • یک خط مستقیم، یک پاره خط و نقطه O مفروض است. پاره خطی را طوری رسم کنید که نقاط انتهایی آن به خط مستقیم و پاره خط مفروض متعلق بوده و نقطه O وسط آن باشد.

۳۲۳ • در مثلث ABC میانه‌های AA_1 ، BB_1 و CC_1 را که در نقطه M متقاطع هستند رسم می‌کنیم. نقاط P ، Q و R میانگانه پاره خط‌های AM ، BM و CM است. ثابت کنید که: $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle PQR$

۳۲۴ • مثلثی را رسم کنید که طول دو ضلع و میانه وارد بر ضلع سوم آن معلوم است. اگر طول دو ضلع مثلث برابر e و b باشد، طول میانه آن در چه محدوده‌ای تغییر می‌کند؟

۳۲۵ • نقاط M ، N و K میانگانه پاره خط‌هایی هستند که یک سر آنها بر یکی از رئوس مثلث ABC و سر دیگر آنها بر نقطه تقاطع میانه‌های این مثلث منطبق است. ثابت کنید مثلثی که رئوس آن محل تلاقی خطوط موازی اضلاع مثلث ABC بوده و نقاط M ، N و K روی اضلاع آن قرار دارد با مثلث ABC برابر است.

۳۲۶ • دودایره و نقطه P مفروض اند. متوازی‌الاضلاعی را طوری رسم کنید که رئوس آن به دایره‌های مفروض متعلق بوده و نقطه P محل تلاقی اقطار متوازی‌الاضلاع باشد.

۳۲۷ • پاره خطی از محل تلاقی اقطار متوازی‌الاضلاع $ABCD$ عبور کرده و روی اضلاع آن پاره خط‌های BE و DF را جدا می‌کند. ثابت کنید این پاره خط‌ها برابر هستند.

۳۲۸ • یک متوازی‌الاضلاع را به دو قسمت هم‌ارز تقسیم کنید.

۳۲۹ • دو وتر BA و CD را از دوانتهای قطر BC از دایره‌ای به مرکز O طوری رسم می‌کنیم که BA و CD همدیگر را قطع نکرده و روی دو طرف BC واقع شوند. ثابت کنید که OA و OD به یک خط متعلق بوده و $DO = OA$ است.

۳۳۰. یک شش ضلعی را که اضلاع متقابل آن موازی هستند بر یک دایره محیط کرده ایم. ثابت کنید که اضلاع متقابل آن با هم مساوی هستند.
۳۳۱. اضلاع متقابل شش ضلعی محدب $ABCDEF$ دبدو موازی و مساوی هستند. مساحت مثلث ACE چه قسمتی از مساحت شش ضلعی است؟
۳۳۲. نقاط A و B روی یک دایره و نقطه M روی یک خط مفروض است. روی دایره نقطه X را طوری پیدا کنید که خطوط AX و BX خط l را در نقاط هم فاصله از M قطع کنند.
۳۳۳. از نقطه l که روی اضلاع مثلث ABC قرار ندارد قاطعی را طوری رسم کنید که مثلثی با حداقل مساحت ممکنه بدست آید.
۳۳۴. بر دایره ای، یک هشت ضلعی محیط شده است و اضلاع متقابل این هشت ضلعی دبدو موازی هستند. ثابت کنید که اضلاع متقابل آن دبدو مساوی هستند.
۳۳۵. مثلث ABC و نقطه X مفروض است. متوازی الاضلاع $BXCY$ و سپس متوازی الاضلاع $YXAZ$ را رسم کنید. ثابت کنید که تبدیل متجانس نقطه X را به نقطه Z انتقال می دهد. نسبت و مرکز این تجانس را بیابید.
۳۳۶. در یک چهارضلعی، متوازی الاضلعی را طوری محاط کنید که دور آن ثابت و به (a) اضلاع مقابل، (b) اضلاع مجاور چهارضلعی متعلق باشد.
۳۳۷. میانه CM از مثلث ABC با اضلاع AC و BC بترتیب زاویه های α و β تشکیل می دهد. اگر $AC < BC$ باشد کدامیک از این زاویه ها بزرگتر از دیگری است؟

۲. تقارن نسبت به خط مستقیم

۳۳۸. یک پنج ضلعی را طوری رسم کنید که: (a) یک محور تقارن؛ (b) بیش از یک محور تقارن داشته باشد.
۳۳۹. از نقطه معینی خطی را طوری رسم کنید که دو خط مفروض را با زاویه های مساوی قطع کند.
۳۴۰. مثلثی را رسم کنید که طول یک ضلع، تفاضل دو ضلع دیگر، و زاویه بین ضلع اول و بزرگترین دو ضلع دیگر معلوم باشد.
۳۴۱. مثلثی را رسم کنید که طول دو ضلع و تفاضل دو زاویه مقابل به آنها معلوم است.
۳۴۲. نقطه M در درون زاویه منفرجه ای مفروض است. مثلث MAB را طوری رسم کنید که رئوس A و B آن روی اضلاع زاویه واقع شده و محیط آن مقدار حداقل ممکنه را داشته باشد.
۳۴۳. چهارضلعی محدب $ABCD$ را طوری رسم کنید که فقط دارای یک محور تقارن BD باشد.
۳۴۴. آیا می توان پنج ضلعی ای رسم کرد که قطری از آن روی یک محور تقارن قرار بگیرد.
۳۴۵. ثابت کنید که در یک چند ضلعی منتظم با تعداد رئوس فرد که دارای چند محور تقارن است

هیچیک از اقطار نمی‌تواند محورهای تقارن قرار بگیرند.

۳۴۶ • مثلثی را رسم کنید که یک زاویه، یک ضلع مجاور به این زاویه و تفاضل دو ضلع دیگر از آن معلوم است.

۳۴۷ • مثلثی را رسم کنید که مقدار ناصفر تفاضل دو زاویه و طول دو ضلع مقابل به این زوایا از آن معلوم است.

۳۴۸ • دو دایره متحد‌المركز مفروض اند. یک لوزی (متفاوت با مربع) رسم کنید که در آن (a) دو رأس به یک دایره و دو رأس دیگر به دایره دیگر؛ (b) سه رأس به یک دایره و یک رأس آن، به دایره دیگر متعلق باشد.

۳۴۹ • مثلث ABC را رسم کنید که سه عمود منصف آن یعنی p ، q و r معلوم هستند.

۳۵۰ • در دایره مفروض مثلثی را محاط کنید که اضلاع آن با سه خط معین موازی باشند.

۳۵۱ • بر مثلث ABC دایره‌ای محیط شده است که نیمساز زاویه C را در نقطه M قطع می‌کند. عمود HD را از مرکز ارتفاعی H مثلث بر نیمساز زاویه عبور می‌دهیم بطوریکه نقطه D به C متعلق باشد. ثابت کنید که: $CD:CM = \cos C$

۳۵۲ • در دایره‌ای به مرکز O چهار ضلعی $ABCD$ محاط شده است. خط‌های OM ، ON و OP و OQ را طوری رسم می‌کنیم که M ، N ، P ، Q میانگانه‌ها و AB ، BC ، CD و DA باشد. ثابت کنید که: $\angle MON = \angle POQ$ یا $\angle MON + \angle COD = 180^\circ$

۳۵۳ • چهار ضلعی $ABCD$ بر دایره‌ای به مرکز O محیط شده است.

ثابت کنید که: $\angle AOB + \angle COD = 180^\circ$

۳۵۴ • در دایره مفروضی یک پنج ضلعی را محاط کنید که اضلاع آن با پنج خط معینی موازی باشند.

۳۵۵ • روی میز مستطیل شکلی، توپبی قرار دارد. در چه جهتی بایستی به آن ضربه بزنیم تا بعد از برخورد به دیواره‌های میز دوباره در مسیر حرکت اولیه، قرار بگیرد؟

۳۵۶ • ثابت کنید که نقطه تلاقی امتداد اضلاع جانبی یک ذوزنقه متساوی الساقین، نقطه تلاقی قطرهای و نیز میانگانه‌های قاعده‌های آن روی یک خط مستقیم قرار دارد.

۳۵۷ • ثابت کنید که خط واصل میانگانه‌های دو وتر موازی در دایره از مرکز آن می‌گذرد.

۳۵۸ • دایره F_1 دو دایره متحد‌المركز F_2 و F_3 را بترتیب در نقاط A و B قطع می‌کند. ثابت کنید که وترهای AB و CD موازی هستند.

۳۵۹ • سه دایره مساوی دارای یک نقطه مشترک هستند. ثابت کنید که دایره دیگر ماز بر نقاط تقاطع دیگر این سه دایره با دایره‌های مفروض مساوی است.

۳۶۰ • روی یک صفحه چهار دایره مساوی در یک نقطه مشترک بوده و برای بار دوم محوری درشش نقطه با همدیگر متقاطع هستند. ثابت کنید که هر یک از دایره‌ها از سه نقطه از شش نقطه مزبور عبور

می‌کنند.

۳۶۱ • روی صفحه‌ای، یک خط و یک نقطه در خارج این خط مفروض اند. مکان هندسی مرکز مثلی را پیدا کنید که یک رأس بر نقطه و رأس دیگر آن روی خط مفروض قرار دارد.

۳۶۲ • بر روی صفحه‌ای، یک خط مستقیم و نقطه‌ای در خارج آن مفروض است. مکان هندسی رأس سوم مثلی را بیابید که یک رأس آن بر روی نقطه و رأس دیگر آن بر روی خط مستقیم مفروض قرار دارد.

۳ • دوران

۳۶۳ • مربع $ABCD$ را رسم کنید که O مرکز آن و دو نقطه M و N متعلق به اضلاع AB و AC از آن معلوم هستند و $OM \neq ON$ است.

۳۶۴ • مثلث متساوی‌الاضلاع‌ی را طوری رسم کنید که یک رأس آن بر نقطه معلوم O و دو رأس دیگر آن بر دو دایره معلوم دیگر منطبق باشد.

۳۶۵ • از نقطه واقع در درون دایره‌ای وتری با طول معلوم رسم کنید.

۳۶۶ • روی اضلاع BC ، CA و AB از مثلث متساوی‌الاضلاع‌ی بترتیب نقاط M ، N و P مفروض هستند. می‌دانیم که $BM:MC = CN:NA = AP:PB = k$ (a) ثابت کنید که ABC یک مثلث متساوی‌الاضلاع است؛ (b) اگر $BC = a$ و $k = 2$ باشد MN را محاسبه کنید.

۳۶۷ • روی اضلاع BC ، CD ، DA و AB از مربع $ABCD$ نقاط P ، Q ، R ، S بترتیب مفروض هستند. می‌دانیم که $BP:PC = CQ:QD = DR:RA = AS:SB = h$ است.

(a) ثابت کنید $PQRS$ یک مربع است. (b) اگر $AB = a$ و $h = 3$ باشد PQ را محاسبه کنید.

۳۶۸ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC دو مربع هم‌سوی $ABMN$ و $BCOP$ را رسم می‌کنیم. مراکز این مربعات را با O_1 و O_2 نشان می‌دهیم. میانگانه ضلع AC را K و میانگانه پاره خط MP را L می‌نامیم. ثابت کنید که چهارضلعی O_1LO_2K یک مربع است.

۳۶۹ • مثلث‌های متساوی‌الاضلاع ACB_1 و BCA_1 را روی اضلاع AC و BC از مثلث ABC و در خارج آن رسم می‌کنیم. اگر M میانگانه ضلع AB و O مرکز مثلث ACB_1 باشد زوایای مثلث MA_1O را بیابید.

۳۷۰ • روی امتداد اضلاع مثلث قائم‌الزاویه ABC پاره خط‌های AD و AE را بترتیب برابر اضلاع AB و AC از مثلث ABC جدا می‌کنیم. ثابت کنید خطی که شامل میانه AM از مثلث ABC است بر پاره خط DE عمود است.

۳۷۱ • مربع $ABCD$ مفروض است. در مرکز این مربع دو خط را (متفاوت با اقطار AC و BD) برهم

عمود رسم می‌کنیم. از تقاطع این خطوط با مربع چهار چهارضلعی بدست می‌آید. ثابت کنید این چهارضلعی‌ها باهم مساوی هستند.

۳۷۲ • از مرکز O مربوط به مثلث متساوی الاضلاع ABC دو خط مستقیم را رسم می‌کنیم که زاویه بین آنها 60° است. ثابت کنید که قطعات این دو خط واقع در درون مثلث دو بدو باهم مساوی اند.

۳۷۳ • مثلث متساوی الاضلاع را طوری رسم کنید که یکی از رئوس آن بر نقطه P ، رأس دیگر به خط a و رأس سوم به خط b متعلق باشد.

۳۷۴ • مربع‌های $ABNM$ و $ACQP$ را روی اضلاع AB و AC از مثلث ABC و در خارج آن رسم می‌کنیم. ثابت کنید که MC بر BP عمود است.

۳۷۵ • دو مربع هم‌سوی $MPO\hat{R}$ و $MUVW$ را رسم می‌کنیم. ثابت کنید که دو خط PU و RW متعامد هستند.

۳۷۶ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC مربعاتی را با مراکز D و E طوری رسم می‌کنیم که نقاط C و D در یک طرف AB ، و نقاط A و E در دو طرف ضلع BC قرار داشته باشد. ثابت کنید که زاویه بین خطوط AC و DE برابر 45° است.

۳۷۷ • مربع $ABCD$ را رسم کنید. مرکز O و دو نقطه M و N متعلق به اضلاع BC و CD از این مربع معلوم هستند و $OM \neq ON$ است.

۴ • انتقال

۳۷۸ • چهار نقطه A, B, C و D مفروض اند. چهار خط موازی a, b, c, d و بترتیب طوری از این نقاط عبور دهید که فاصله بین خطوط a و b با فاصله بین خطوط c و d برابر باشند.

۳۷۹ • دوزنقه‌ای را رسم کنید که اقطار و زاویه بین آنها و نیز طول یک ضلع از دوزنقه معلوم باشد.

۳۸۰ • ثابت کنید اگر در دوزنقه‌ای خط واصل میانگاه‌های قاعده‌ها با امتداد اضلاع جانبی آن زاویه‌های مساوی تشکیل دهد در آن صورت دوزنقه مفروض متساوی الساقین خواهد بود.

۳۸۱ • دو دایره مساوی در خارج هم در نقطه K مماس هستند. خط قاطعی به موازات خط‌المركزین، دو دایره را در نقاط A, B, C و D قطع می‌کند. ثابت کنید که اندازه زاویه AKC مستقل از انتخاب قاطع است.


۳۸۲ • مساحت دوزنقه‌ای را با معلوم بودن طول همه اضلاع آن تعیین کنید.

۳۸۳ • روی دایره‌ای با مرکز O نقاط A, B, C طوری انتخاب شده‌اند که $\angle AOB = \angle BOC = 60^\circ$ است. ثابت کنید که فاصله نقطه B از قطر دلخواهی از دایره با مجموع یا قدرمطلق تفاضل فواصل نقاط A و C از این قطر برابر است.


۳۸۴ • از نقطه M واقع در خارج دایره ω ، خط مستقیم m را طوری رسم کنید که دایره ω را در دو نقطه

NS نیز روی یک خط دیگر قرار دارند (شکل ۸۱)

۳۹۶ • دو دایره در نقطه A مماس داخلی هستند. قاطع a دایره‌ها را در نقاط M, N, P, Q با همان ترتیبی که در شکل ۸۲ ملاحظه می‌کنید قطع می‌کند. ثابت کنید که: $\angle MAN = \angle PAQ$.



شکل ۸۲



شکل ۸۱

۳۹۷ • چند پاره خط مفروض اند. این پاره خط‌ها در یکی از نقاط انتهایی مشترک بوده و نقاط انتهایی دیگر آنها روی یک خط مستقیم قرار دارند. این پاره خط‌ها را با نسبت‌های یکسانی تقسیم می‌کنیم. ثابت کنید که نقاط تقسیم آنها روی یک خط قرار دارند.

بخش ۶ • بردارها

جمع بردارها • حاصل جمع دو بردار a و b با مختصات a_1, a_2 و b_1, b_2 بصورت بردار c با مختصات $a_1 + b_1, a_2 + b_2$ تعریف می‌شود. یعنی داریم:

$$a(a_1, a_2) + b(b_1, b_2) = c(a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

به ازاء تمام بردارهایی بصورت $a(a_1, a_2), b(b_1, b_2), c(c_1, c_2)$ تساوی‌های $a + b = b + a$ و $a + (b + c) = (a + b) + c$ برقرار هستند.

قاعده مثلث • در مورد هر سه نقطه A, B, C تساوی $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ برقرار است. قاعده متوازی الاضلاع • اگر $ABCD$ یک متوازی الاضلاع باشد آنگاه $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ خواهد بود.

ضرب بردار در یک عدد • ضرب بردار (a_1, a_2) در عدد λ بصورت بردار $(\lambda a_1, \lambda a_2)$ یعنی

$(\lambda a_1, \lambda a_2) \lambda = \lambda (a_1, a_2)$ تعریف می‌شود. طبق تعریف $\lambda (a_1, a_2)$ است.

به ازاء هر بردار a و اعداد λ و μ رابطه $(\lambda + \mu) a = \lambda a + \mu a$ برقرار است.

به ازاء بردارهای a و b و عدد λ نیز $\lambda (a + b) = \lambda a + \lambda b$ و $|\lambda a| = |\lambda| |a|$ برقرار است.

جهت بردار $\lambda \mathbf{a}$ به ازاء $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ با جهت بردار \mathbf{a} با شرط $\lambda > 0$ یکسان بوده و با شرط $\lambda < 0$ با جهت بردار \mathbf{a} مخالف خواهد بود. دو بردار ناصفر در صورتی همخط خوانده می‌شود که بر روی یک خط یا دوخط موازی قرار داشته باشند. اگر $\mathbf{a} (a_1, a_2) \parallel \mathbf{b} (b_1, b_2)$ باشد آنگاه $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$ خواهد بود. عکس این قضیه نیز درست است. بردار یگانه برداری بطول یک واحد است. بردارهای یگانه ای که در جهت نیم محورهاى مختصاتی مثبت قرار دارند بردارهای پایه نامیده می‌شوند. آنها را روی محور x ها با $(1, 0)$ و \mathbf{e}_1 و روی محور y ها با $(0, 1)$ و \mathbf{e}_2 نمایش می‌دهند. هر برداری مانند $\mathbf{a} (a_1, a_2)$ را می‌توان به شکل $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2$ بیان کرد.

حاصلضرب اسکالر (درونی) دو بردار \bullet حاصلضرب درونی بردار $\mathbf{a} (a_1, a_2)$ در بردار $\mathbf{b} (b_1, b_2)$ بصورت عدد $a_1 b_1 + a_2 b_2$ تعریف می‌شود. روابط $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = a^2$ ، $a^2 = |\mathbf{a}|^2$ را نیز داریم. در مورد هر سه بردار مانند $\mathbf{a} (a_1, a_2)$ ، $\mathbf{b} (b_1, b_2)$ و $\mathbf{c} (c_1, c_2)$ تساوی $\mathbf{c} = \mathbf{ac} + \mathbf{bc}$ برقرار است. زاویه بین دو بردار ناصفر \vec{AC} و \vec{AB} بصورت زاویه BAC تعریف می‌شود. زاویه بین دو بردار \mathbf{a} و \mathbf{b} بصورت زاویه بین بردارهایی تعریف می‌شود که با این بردار مساوی بوده و دارای مبدأ مشترک هستند. زاویه بین دو بردار هم جهت برابر صفر در نظر گرفته می‌شود. حاصلضرب درونی دو بردار با حاصلضرب قدرمطلق آنها در کسینوس زاویه بین آنها برابر است. اگر $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ باشد آنگاه $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ و با شرایط $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ و $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ اگر $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ باشد آنگاه $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ خواهد بود.

ساختار جبر برداری، برای حل مسائل گوناگون هندسی ابداع روش خاصی را ممکن می‌سازد. با وجود این باید به خاطر داشته باشیم که این روش کلیت ندارد و می‌تواند در موارد معینی نیز عملی نباشد. در جدول صفحه بعد مثال‌هایی از کاربرد زبان برداری در صورت بندی و اثبات گزاره هندسی معین یا محاسبه کمیت‌های هندسی ارائه شده است. خوانندگان توجه داشته باشند که سه مورد اول جدول در باره مسائل مستوی و سه مورد آخر آن نیز در باره مسائل متریک بکار گرفته می‌شوند.

استفاده از زبان هندسی اثبات این گزاره‌ها مطلوب شده است.	با استفاده از زبان برداری کافی است که ثابت کنیم:
$a \parallel b$ (1)	$\vec{AB} = k\vec{CD}$ ، بطوریکه پاره‌خط‌های AB و CD بترتیب به خطوط a و b تعلق داشته و k نیز یک عدد است. براساس انتخاب AB و CD روابط برداری مختلفی بوجود می‌آیند که از میان آنها رابطه مناسب انتخاب می‌شود.
(2) نقاط A ، B و C به خط a تعلق دارند	(a) درستی یکی از تساوی‌های: $\vec{AB} = k\vec{BC}$ یا $\vec{AC} = k\vec{BC}$ یا $\vec{AC} = k\vec{AB}$ را اثبات کنید؛ (b) تساوی $\vec{QC} = p\vec{QA} + q\vec{QB}$ را ثابت کنید که در آن $p + q = 1$ بوده و Q یک نقطه اختیاری است؛ (c) تساوی $\alpha\vec{OA} + \beta\vec{OB} + \gamma\vec{OC} = \vec{0}$ را ثابت کنید بطوریکه در آن $\alpha + \beta + \gamma = 0$ بوده و Q یک نقطه اختیاری است.
(3) نقطه C به پاره‌خط AB تعلق دارد بطوریکه $AC:AB = m:n$ است.	به ازاء نقطه معین Q ، $\vec{AC} = \frac{m}{n}\vec{CB}$ یا $\vec{QC} = \frac{n}{m+n}\vec{QA} + \frac{m}{m+n}\vec{QB}$ است.
$a \perp b$ (4)	$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = 0$ ، بطوریکه نقاط A و B به خط a و نقاط C و D به خط b تعلق دارند.
(5) محاسبه طول یک پاره‌خط	(a) دو بردار پایه ناهمخط (یا سه بردار ناهم صفحه) را که طول‌ها و زاویه بین آنها معلوم است اختیار کنید. (b) برداری را که طول آن محاسبه شده است بر روی این بردارها تجزیه کنید. (c) مربع اسکالر این بردار را با استفاده از فرمول $a^2 = \mathbf{a} ^2$ پیدا کنید.
(6) محاسبه اندازه یک زاویه	(a) دو بردار پایه ناهمخط را که نسبت طول‌ها و نیز زاویه بین آنها معلوم است اختیار کنید. (b) بردارهایی اختیار کنید که زاویه مطلوب را معین سازند و این بردارها را روی بردارهای پایه تجزیه کنید. (c) $\cos \angle (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{ \mathbf{a} \mathbf{b} }$ محاسبه کنید.

۱ • مسائل مستوی

چند نوع مسئله مستوی را ذیلاً برگزیده ایم تا با استفاده از بردها حل کنیم. (مسائلی را در نظر گرفته ایم که صورت بندی آنها مفاهیم جبر برداری را شامل نیستند).

در نوع اول این مسائل، اثبات ترازوی پاره خط ها و خطوط مستقیم معینی مطرح است. برای حل این نوع مسائل ضروری است که همخطی بردارهای ارائه شده توسط پاره خط های مفروض یعنی $a = kb$ که در آن k یک عدد است، ثابت شود. ذیلاً چند مثال از این نوع مسائل را مورد ملاحظه قرار می دهیم.

مثال ۱ • در صفحه ای چهارضلعی $ABCD$ و نقطه M مفروض است. ثابت کنید نقاطی که متقارن میانگاه های اضلاع چهارضلعی نسبت به نقطه M هستند رؤس یک متوازی الاضلاع می باشند.

حل • چهارضلعی مفروض $ABCD$ (شکل ۸۳) و نقاط متقارن میانگاه های پاره خط های AB ، BC ، CD و DA نسبت به نقطه M را با N ، P ، Q و R نشان می دهیم. طبق قاعده متوازی الاضلاع،

$$\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{MB}, \quad \vec{MP} = \vec{MB} + \vec{MC}, \quad \vec{MQ} = \vec{MC} + \vec{MD},$$


$$\vec{MR} = \vec{MD} + \vec{MA}$$

را داریم. طبق تعریف تفاضل دو بردار $\vec{NR} = \vec{MR} - \vec{MN}$ و $\vec{PQ} = \vec{MQ} - \vec{MP}$ است.

بدلیل $\vec{NR} - \vec{PQ} = (\vec{MR} - \vec{MN}) - (\vec{MQ} - \vec{MP})$ و با استفاده از تساوی های اولیه به

$\vec{NR} - \vec{PQ} = 0$ یعنی $\vec{NR} = \vec{PQ}$ می رسیم. بطریق مشابه $\vec{NP} = \vec{RQ}$ اثبات می شود. نتیجه

$\vec{NP} = \vec{RQ}$ و $\vec{NR} = \vec{PQ}$ بوده و این امر به معنی متوازی الاضلاع بودن چهارضلعی $NPQR$ است.




شکل ۸۳

مثال ۲ • چهارضلعی $ABCD$ مفروض است. خط مستقیمی را که از رأس A به موازات ضلع BC رسم

می کنیم قطر BD را در نقطه M قطع می کند. خط مستقیم مار ب برابر رأس B به موازات ضلع AD نیز قطر AC

را در نقطه N قطع می کند. (شکل ۸۴)

ثابت کنید که: $MN \parallel DC$



شکل ۸۴

حل • برای حل مسئله کافی است که همخطی بردارهای \vec{DC} و \vec{MN} را ثابت کنیم. یعنی بایستی ثابت کنیم که $\vec{DC} = k\vec{MN}$ است بطوریکه در این رابطه k یک عدد است. برای اطمینان یافتن از همخط بودن بردارهای \vec{DC} و \vec{MN} هر یک از آنها را برحسب بردارهای دیگر بیان می‌کنیم. بدین ترتیب \vec{DC} را برحسب بردارهای \vec{OC} و \vec{OD} و بردار \vec{MN} را برحسب بردارهای \vec{OM} و \vec{ON} بیان می‌کنیم که در آنها O نقطه تلاقی خطوط مستقیم AC و BD است. از طرف دیگر بردارهای \vec{OC} و \vec{ON} را نیز می‌توان برحسب بردار \vec{AO} بیان کرد، درحالی‌که بردارهای \vec{OD} و \vec{OM} قابل بیان برحسب بردار \vec{BO} هستند. اگر فرض کنید که $AO:OC = p:q$ و $BO:OD = m:n$ (1) است آنگاه بردار \vec{DC} را برحسب \vec{AO} و \vec{BO} می‌توان بیان کرد:

$$\vec{DC} = \vec{OC} - \vec{OD} = \frac{q}{p} \vec{AO} - \frac{n}{m} \vec{BO} = \frac{1}{mp} (mq\vec{AO} - np\vec{BO})$$

از طرف دیگر از ترازوی پاره خط‌های AD و BE نتیجه می‌شود که $AO:ON = DO:OB = n:m$ (2) آنگاه از روی شکل و تساوی‌های (2) نتیجه می‌شود که: $\vec{ON} = \frac{m}{n} \vec{AO}$.

بطریق مشابه از ترازوی پاره خط‌های AM و BC به $BO:OM = CO:AO = q:p$ و $\vec{OM} = \frac{p}{q} \vec{BO}$ وصول می‌یابیم. آنگاه بردار \vec{MN} را می‌توان برحسب \vec{AO} و \vec{BO} بیان کرد:

$$\vec{MN} = \vec{ON} - \vec{OM} = \frac{p}{q} \vec{BO} + \frac{m}{n} \vec{AO} = \frac{1}{nq} (-np\vec{BO} + mq\vec{AO})$$

بنابراین $\vec{DC} = \frac{nq}{mp} \vec{MN}$ حاصل می‌شود که از نظر هندسی به معنی ترازوی پاره خط‌های DC و MN است.

در نوع دوم این مسائل اثبات تقسیم پاره خطی به نسبت معینی توسط یک نقطه مطرح است. برای اثبات اینکه نقطه C پاره خط AB را به نسبت معین $AC:CB = m:n$ تقسیم می‌کند کافی است که: (a) تساوی $\vec{AC} = \frac{m}{n} \vec{CB}$ یا، (b) تساوی $\vec{QC} = \frac{n}{n+m} \vec{QA} + \frac{m}{n+m} \vec{QB}$ اثبات شود. در این رابطه Q نقطه دلخواه است. اثبات کفایت شرط (b) از سهولت برخوردار است.

اگر $\vec{QC} = \frac{n}{n+m} \vec{QA} + \frac{m}{n+m} \vec{QB}$ باشد آنگاه $\vec{QC} = \frac{n}{m+n} \vec{QA} + \frac{m}{m+n} \vec{QB}$ ، $\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) \vec{QC} = \frac{1}{m} \vec{QA} + \frac{1}{n} \vec{QB}$ ، $\frac{1}{m} \vec{AC} = \frac{1}{n} \vec{CB}$ ، $\frac{1}{m} (\vec{QC} - \vec{QA}) = \frac{1}{n} (\vec{QB} - \vec{QC})$ است.

توجه داشته باشید که برای تقسیم پاره خط AB بوسیله نقطه C به نسبت $m:n$ شرط (b) ضرورت دارد. ذیلاً تعدادی از مسائل نوع دوم را حل می‌کنیم.

مثال ۳ • در چهارضلعی دلخواهی، میانگاه‌های اقطار را و همچنین میانگاه‌های دو ضلع روبرو را بهم وصل می‌کنیم. ثابت کنید پاره خط اول در نقطه تقاطع با پاره خط دوم نصف می‌شود.

حل • با روش‌های مختلفی می‌توان ثابت کرد که نقطه O (شکل ۸۵) وسط پاره خط EF است.

به عنوان مثال:

(1) ثابت کنید که: $\vec{EP} = \vec{QF}$.


این رابطه به این معنی است که $EPFQ$ متوازی الاضلاع بوده و بدلیل قطر بودن EF این خط از نقطه O عبور کرده و در این نقطه نصف می شود؛

(2) ثابت کنید که: $\vec{EO} = \vec{OF}$

(3) ثابت کنید که: $\vec{QO} = \frac{1}{2}(\vec{QE} + \vec{QF})$ یا $\vec{NO} = \frac{1}{2}(\vec{NE} + \vec{NF})$

(4) ثابت کنید که: $\vec{CO} = \frac{1}{2}(\vec{CE} + \vec{CF})$ یا $\vec{DO} = \frac{1}{2}(\vec{DE} + \vec{DF})$

از بین روشهای فوق روش اول را که ساده ترین آنها است مورد ملاحظه قرار می دهیم. در مثلث ABC پاره خط EP خط واصل میانگاههای دو ضلع بوده و از آن $\vec{EP} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ را داریم. در مثلث ABD پاره خط QF خط واصل میانگاههای دو ضلع بوده و از اینرو $\vec{QF} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ است. بنابراین $\vec{EP} = \vec{QF}$ استنتاج می شود و مسئله اثبات می گردد.



شکل ۸۵

مثال ۴ • ضلع AD از متوازی الاضلاع $ABCD$ را به n قسمت مساوی تقسیم کرده و نقطه تقسیم اول (نقطه K) را به رأس B وصل می کنیم (شکل ۸۶). در نقطه تقاطع خط BK با قطر AC ، قطر مزبور به چه نسبتی تقسیم می شود.

حل • روابط $\vec{DA} = \mathbf{a}$ ، $\vec{DC} = \mathbf{b}$ و $\vec{AP} = \alpha \vec{AC}$ را در نظر می گیریم. بردار \vec{AP} را بر حسب بردارهای \mathbf{a} و \mathbf{b} بدو صورت بیان می کنیم:

$$\vec{AP} = \alpha \vec{AC} = \alpha (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \alpha \mathbf{b} - \alpha \mathbf{a} \quad (1)$$


$$\vec{AP} = \vec{AK} + \vec{KP} = -\frac{1}{n} \mathbf{a} + \alpha \vec{KB} = -\frac{1}{n} \mathbf{a} + \alpha \left(\frac{1}{n} \mathbf{a} + \mathbf{b} \right) = \frac{\alpha - 1}{n} \mathbf{a} + \alpha \mathbf{b} \quad (2)$$

(بدلیل $\triangle APK \sim \triangle BPC$ رابطه $\vec{KP} = \alpha \vec{KB}$ را داریم.)

از آنجا که فقط یک صورت برای بیان برداری بر حسب دو بردار ناهمخط وجود دارد از اینرو:

$$-\alpha = \frac{\alpha - 1}{n} \quad \text{را از آن نیز } \alpha = \frac{1}{n+1} \text{ بدست می آید.}$$

این امر به معنی $\vec{AP} = \frac{1}{n+1} \vec{AC}$ است و از اینرو به آسانی $AP:PC = 1:n$ استنتاج می شود.



شکل ۸۶

مثال ۵ • روی ضلع AC از مثلث ABC نقطه M را با شرط $AM = \frac{1}{3}AC$ و روی امتداد BC نقطه N را با شرط $BN = CB$ اختیار کرده ایم. نقطه P پاره خط های AB و MN را به چه نسبتی تقسیم می کند؟ (شکل ۸۷).

حل • چنین فرض می کنیم:

$$NP:PM = \alpha:\beta, \quad AP:PB = \gamma:\delta \quad (1)$$

بدین ترتیب باید $\alpha:\beta$ و $\gamma:\delta$ را بیابیم. برای این منظور چند معادله که دارای α ، β ، γ و δ هستند تشکیل می دهیم. فرض کنید که Q یک نقطه اختیاری در صفحه باشد، آنگاه در مورد پاره خط های AB و MN چنین داریم:

$$\vec{QP} = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \vec{QN} + \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \vec{QM} \quad (2)$$

$$\vec{QP} = \frac{\delta}{\gamma+\delta} \vec{QA} + \frac{\gamma}{\gamma+\delta} \vec{QB} \quad (3)$$

تساوی های (2) و (3) دارای پنج بردار متفاوت هستند. تعداد این بردارها را با تبدیل آنها به بردارهای دیگر کاهش می دهیم. در مورد پاره خط های AC و NC چنین داریم: $\vec{QB} = \frac{1}{2}(\vec{QN} + \vec{QC})$

$$\vec{QM} = \frac{2}{3} \vec{QA} + \frac{1}{3} \vec{QC} \quad (4)$$

با جایگذاری مقادیر \vec{QB} و \vec{QM} از تساوی (4) در تساوی های (2) و (3) چنین حاصل می شود:


$$\vec{QP} = \frac{\delta}{\gamma+\delta} \vec{QA} + \frac{\gamma}{2(\gamma+\delta)} \vec{QN} + \frac{\gamma}{2(\gamma+\delta)} \vec{QC} \quad (5)$$

$$\vec{QP} = \frac{2\alpha}{3(\alpha+\beta)} \vec{QA} + \frac{\beta}{\alpha+\beta} \vec{QN} + \frac{\alpha}{3(\alpha+\beta)} \vec{QC} \quad (6)$$

از اینجا نتیجه می شود که:

$$\begin{cases} \frac{\gamma}{2(\gamma+\delta)} = \frac{\beta}{\alpha+\beta} \\ \frac{\delta}{\gamma+\delta} = \frac{2\alpha}{3\alpha+\beta} \\ \frac{\gamma}{2(\gamma+\delta)} = \frac{\alpha}{3(\alpha+\beta)} \end{cases}$$


با حل این دستگاه معادلات، $\beta = \frac{1}{3}\alpha$ و $\gamma = \delta$ حاصل می‌شود. در نتیجه $AP = BP$ و $NP:PM = 3:1$ را خواهیم داشت.



شکل ۸۷

مسائل نوع دوم را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. در این مسائل اثبات تعلق سه نقطه به یک خط راست مطرح می‌شود. اینگونه مسائل به عنوان حالت خاصی از مسائل نوع دوم مطرح است. با وجود این راه حل آنها، ویژگی‌های خاصی را در ارتباط با کاربرد شرط تعلق سه نقطه به یک خط راست دارا می‌باشد.

مثال ۶ • در مثلث ABC میانه‌های AM_1 و BM_2 را رسم کرده‌ایم. از نقطه P واقع بر روی ضلع AB دو خط به موازات این میانه‌ها رسم می‌کنیم. این خطوط اضلاع مثلث را در نقاط A_1 و B_1 قطع می‌کند. ثابت کنید نقطه E میانگاه A_1B_1 و نقطه G محل تلاقی میانه‌ها روی یک خط مستقیم قرار دارند (شکل ۸۸).



شکل ۸۸

حل • قسمت حکم مسئله را طوری تغییر می‌دهیم که در حل مسئله بردارها کاربرد پذیر شوند. این امر با روشهای زیر ممکن می‌گردد:

(1) تحقیق کنید که $\vec{EP} = k\vec{GP}$ است (بردارهای دیگری را نیز می‌توان اختیار کرد)؛

(2) به ازاء نقطه معین Q تساوی $\vec{QE} = k\vec{QP} + (1-k)\vec{QC}$ را برپا سازید (شرط تعلق سه نقطه به یک خط مستقیم).

روش دوم را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. برای این کار شرط تعلق سه نقطه به یک خط راست را استخراج می‌کنیم. برای تعلق نقاط A, B, C به یک خط مستقیم لازم و کافی است که به ازاء نقطه معین Q تساوی $\vec{QC} = p\vec{QA} + q\vec{QB}$ برقرار باشد که در آن $p + q = 1$ است.

برهان • اگر نقاط A, B, C به یک خط متعلق باشند آنگاه می‌توان $AC:CB = m:n$ را نوشت. از رابطه $AC:CB = m:n$ نیز

$$\vec{QC} = \frac{m}{m+n}\vec{QA} + \frac{n}{m+n}\vec{QB}, \quad \vec{QC} = p\vec{QA} + q\vec{QB}, \quad p + q = 1$$

را داریم. ملاحظات بالا کفایت و ضرورت شرط را ثابت می‌کند. بنابراین حل مسئله مطرحه به یافتن عبارتی تحویل می‌یابد که بردارهای $\vec{QP}, \vec{QE}, \vec{QG}$ را بهم مربوط می‌سازد.

اگر نقطه Q بطور دلخواه اختیار شود آنگاه حل مسئله، خیلی پیچیده خواهد بود. بهترین است که آن را منطبق بر نقطه C اختیار کنیم. در این حالت بردارهای $\vec{CP}, \vec{CE}, \vec{CG}$ را می‌توان به آسانی برحسب \vec{CB} و \vec{CA} بیان کرد. درحقیقت با فرض (1) $AP:PB = m:n$ آنگاه چنین خواهیم داشت:

$$AB_1 : B_1C = m : (m + n + n) = m : (2n + m) \quad (2)$$

(بدلیل اینکه نقطه M_2 میانگاه AC است)

$$BA_1 : A_1C = n : (m + m + n) = n : (2m + n) \quad (3)$$

و (بدلیل اینکه نقطه M_1 میانگاه BC است)

از ویژگی گرانگه G رابطه $\vec{CG} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (\vec{CA} + \vec{CB}) = \frac{1}{3} (\vec{CA} + \vec{CB})$ می توان تساوی های $\vec{CA}_1 = \frac{2m+n}{2(m+n)} \vec{CB}_1$ و $\vec{CB}_1 = \frac{2n+m}{2(m+n)} \vec{CA}_1$ را نوشت. آنگاه با توجه به ویژگی نقطه E ، میانگاه پاره خط A_1B_1 ، چنین می نویسیم:

$$\vec{CE} = \frac{1}{2} (\vec{CB}_1 + \vec{CA}_1) = \frac{1}{4} \left(\frac{2n+m}{m+n} \vec{CA} + \frac{n+2m}{m+n} \vec{CB} \right)$$

با توجه به قضیه تقسیم پاره خطی به نسبت معینی، $\vec{CP} = \frac{n}{m+n} \vec{CA} + \frac{m}{m+n} \vec{CB}$ را خواهیم داشت. برای ارتباط دادن بردارهای \vec{CG} ، \vec{CE} و \vec{CP} بردار \vec{CE} را تبدیل می کنیم:

$$\vec{CE} = \frac{1}{4} \left(\frac{m+2n}{m+n} \vec{CA} + \frac{2m+n}{m+n} \vec{CB} \right) = \frac{1}{4} \left(\vec{CA} + \vec{CB} + \frac{n}{m+n} \vec{CA} + \frac{m}{m+n} \vec{CB} \right) = \frac{1}{4} (3\vec{CG} + \vec{CP}) = \frac{3}{4} \vec{CG} + \frac{1}{4} \vec{CP}$$

یعنی $\vec{CE} = \frac{3}{4} \vec{CG} + \frac{1}{4} \vec{CP}$. و بدلیل $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ نقاط E ، G و P به یک خط متعلق بوده و $EG : PE = 1 : 3$ خواهد بود. بدین ترتیب مسئله حل می گردد.

انواع مسائل مستوی مورد ملاحظه در فوق تمام انواع گوناگون مسائل مستوی را شامل نمی گردد. با این حال، این مسائل، گروه عمده ای از مسائل مستوی را که حائز اهمیت هستند، تشکیل می دهند.

۲ • مسائل متریک

در حل مسائل متریک از حاصلضرب درونی (اسکالر) بردارها استفاده می شود. بدون گروه بندی این مسائل چند مثال از آنها را مورد ملاحظه قرار می دهیم.

مثال ۷ • نقطه P روی قاعده AB از مثلث متساوی الساقین ABC اختیار شده است. (a) ثابت کنید که: $PC^2 = AC^2 - AP \cdot BP$. (b) اگر نقطه P روی امتداد قاعده AB قرار گیرد فرمول فوق به چه شکل درمی آید؟ (شکل ۸۹).

حل • (a) تساوی مطروحه را به شکل برداری می نویسیم. با منظور کردن جهت های بردارهای \vec{AP} و \vec{PB} به $\vec{PC}^2 = \vec{AC}^2 - \vec{AP} \cdot \vec{BP}$ وصول می یابیم. این تساوی را ثابت می کنیم. طرف راست این تساوی را بطریق زیر تبدیل می کنیم:

$$\vec{AC}^2 - \vec{AP} \cdot \vec{BP} = \vec{AC}^2 - (\vec{AC} + \vec{CP}) \cdot (\vec{PC} + \vec{CB}) = \vec{AC}^2 - \vec{AC} \cdot \vec{PC} - \vec{AC} \cdot \vec{CB} +$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CP}^2 - \overrightarrow{CP} \times \overrightarrow{CB} &= (\overrightarrow{AC}^2 - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PC}) - (\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{CB}) + \overrightarrow{CP}^2 = \overrightarrow{AC} (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{PC}) \\ &- \overrightarrow{CB} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CP}) + \overrightarrow{CP}^2 = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CP}) \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}) + \overrightarrow{CP}^2 = \\ &\overrightarrow{AP} (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}) + \overrightarrow{CP}^2. \end{aligned}$$

حال اگر $\overrightarrow{CB}' = \overrightarrow{AC}$ باشد آنگاه $\overrightarrow{CB}' - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BB}' = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$ بوده و $\triangle AB'B$ مثلث قائم الزاویه خواهد بود. بدین ترتیب $\overrightarrow{AP} (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}) = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BB}' = 0$ را خواهیم داشت. در نتیجه تساوی $\overrightarrow{AC}^2 - \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{CP}^2$ بدست می آید.

(b) اگر نقطه P به پاره خط AB متعلق باشد آنگاه در گذر از تساوی برداری به تساوی اسکالر چنین خواهیم داشت:

$$\overrightarrow{PC}^2 = |\overrightarrow{PC}|^2 = PC^2, \quad \overrightarrow{AC}^2 = |\overrightarrow{AC}|^2 = AC^2$$

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{AP}| \cdot |\overrightarrow{PB}| \cdot \cos \angle (\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{PB}) = AP \cdot PB \cdot \cos 0^\circ = AP \cdot PB$$


یعنی: $PC^2 = AC^2 + AP \cdot PB$.

و اگر نقطه P به خط AB متعلق نباشد آنگاه بردارهای \overrightarrow{AP} و \overrightarrow{PB} در جهات متقابل بوده و

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{AP}| \cdot |\overrightarrow{PB}| \cdot \cos 180^\circ = -AP \cdot PB$$

را خواهیم داشت. بدین ترتیب در این حالت تساوی مطروحه به شکل $PC^2 = AC^2 - AP \cdot PB$ در

می آید.



شکل ۸۹

مثال ۸ • مجموع مربعات میانه های مثلثی را پیدا کنید که طول اضلاع آن a, b, c است.

حل • در مثلث ABC ، $\overrightarrow{BC} = a$ ، $\overrightarrow{AB} = c$ ، و $\overrightarrow{CA} = b$ را فرض می کنیم (شکل ۹۰).

آنگاه طبق تعریف مجموع بردارها، $\overrightarrow{BE} = a + \frac{b}{2}$ ، $\overrightarrow{AD} = c + \frac{a}{2}$ و $\overrightarrow{CF} = b + \frac{c}{2}$ خواهد بود.

با استفاده از ویژگی مربع اسکالر چنین خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{BE}^2 + \overrightarrow{CF}^2 &= \left(c + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(b + \frac{c}{2}\right)^2 = c^2 + c \cdot a + \frac{a^2}{4} + a \cdot b + \\ &\frac{b^2}{4} + b^2 + b \cdot c + \frac{c^2}{4} = \frac{5}{4}(a^2 + b^2 + c^2) + (c \cdot a + a \cdot b + b \cdot c). \end{aligned}$$

بدلیل $a + b + c = 0$ به $(a + b + c)^2 = 0$ وصول می یابیم.

بدین ترتیب داریم: $a^2 + b^2 + c^2 + 2(c \cdot a + a \cdot b + b \cdot c) = 0$ ؛ یعنی:

$$a^2 + b^2 + c^2 = -2(c \cdot a + a \cdot b + b \cdot c)$$

از اینرو $c \cdot a + a \cdot b + b \cdot c = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}$ با جایگذاری مقدار حاصله برای


عبارت $c \cdot a + a \cdot b + b \cdot c$ چنین نتیجه می‌شود:

$$AD^2 + BE^2 + CF^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

بدلیل ویژگی مربع اسکالر:

$$\overline{CF^2} = CF^2 \text{ و } \overline{AD^2} = AD^2 \quad \overline{BE^2} = BE^2$$

خواهیم داشت.



شکل ۹۰

مثال ۹ • ثابت کنید ارتفاعات هر مثلث دلخواهی متقارب هستند (در یک نقطه مشترکند).

حل • پاره خط‌های AP ، BQ و CL ارتفاعات مثلث ABC و نقطه O را محل تلاقی ارتفاعات AP و

BQ در نظر می‌گیریم (شکل ۹۱).

جهت اختصار، $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ ، $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ، $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ را منظور می‌کنیم. طبق تعریف تفاضل بردارها:

$$\overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c} \quad \overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b} \quad \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$$

بدلیل $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{BC}$ تساوی $\mathbf{a}(\mathbf{c} - \mathbf{b}) = 0$ یعنی:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \quad (1)$$

را داریم. بطریق مشابه بدلیل $\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{CA}$ تساوی $\mathbf{b}(\mathbf{a} - \mathbf{c}) = 0$ را داریم که از آن نیز

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \quad (2)$$

حاصل می‌شود. بنابراین خاصیت انتقال‌پذیری از تساوی‌های (1) و (2) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$ یا $\mathbf{c}(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$


وصول می‌یابیم. این تساوی به معنی $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{AB}$ یا $\overrightarrow{CO} \perp \overrightarrow{AB}$ است.

از آنجا که از یک نقطه فقط یک خط می‌توان بر خط راست دیگر عمود کرد از اینرو $CO \perp AB$ و

$CL \perp AB$ نتیجه می‌شود که CL بر امتداد

CO منطبق بوده و بدین ترتیب سه ارتفاع مثلث

در یک نقطه مشترک خواهند بود.



شکل ۹۱

۱ • جمع و تفریق بردارها. ضرب بردار در یک عدد

۳۹۸ • برای اینکه چهارضلعی $ABCD$ یک متوازی‌الاضلاع باشد لازم و کافی است که به ازاء هر

نقطه ای مانند Q تساوی $\overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QC} = \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QD}$ برقرار شود. این نکته را ثابت کنید.

۳۹۹ • در چهارضلعی $ABCD$ ، نقاط M ، N ، P و Q بر ترتیب میانگاه اضلاع آن است. ثابت کنید

چهارضلعی $MNPQ$ یک متوازی‌الاضلاع است.

۴۰۰ ● روی ضلع AB از چهارضلعی $ABCD$ ، متوازی الاضلاع $ABCC'$ را رسم کرده و میانگاه ضلع $C'D$ را O می‌نامیم. اگر M و N بترتیب میانگاه‌های اضلاع AB و CD باشد آنگاه ثابت کنید که پاره خط AO موازی و مساوی پاره خط MN است.

۴۰۱ ● در چهارضلعی $ABCD$ ، نقاط M و N بترتیب میانگاه اضلاع AD و BC است. ثابت کنید که: $2MN \leq AB + CD$

۴۰۲ ● ثابت کنید خط واصل میانگاه‌های اقطار یک دوزنقه با نصف تفاضل قاعده‌های آن برابر است.

۴۰۳ ● اگر طول خط واصل میانگاه‌های دو ضلع مقابل یک چهارضلعی محدب برابر نصف مجموع دو ضلع دیگر باشد آنگاه ثابت کنید این چهارضلعی یک دوزنقه یا یک متوازی الاضلاع است.

۴۰۴ ● نقاط M و N بترتیب میانگاه‌های اضلاع AB و CD از چهارضلعی $ABCD$ است. ثابت کنید که میانگاه‌های اقطار چهارضلعی $AMND$ و $BMNC$ رؤس یک متوازی الاضلاع است (یا روی یک خط مستقیم قرار دارد).

۴۰۵ ● برای اینکه Q مرکز ثقل مثلث ABC باشد شرط لازم و کافی عبارت $\vec{QA} + \vec{QB} + \vec{QC} = \vec{0}$ است.

۴۰۶ ● از نقطه M واقع در درون مثلث ABC بر اضلاع BC ، AC ، AB عمودهایی رسم کنیم. روی این عمودها پاره خط‌های MA_1 ، MB_1 ، MC_1 را مساوی اضلاع متناظر به این عمودها جدا می‌کنیم. ثابت کنید که نقطه M مرکز ثقل مثلث $A_1B_1C_1$ است.

۴۰۷ ● ثابت کنید در یک چهارضلعی دلخواه، پاره خط واصل میانگاه‌های اقطار از نقطه تلاقی خطوط واصل میانگاه‌های اضلاع مقابل عبور کرده و در این نقطه نصف می‌شود.

۴۰۸ ● مثلث ABC و نقطه دلخواه Q مفروض است. ثابت کنید اگر متوازی الاضلاع‌های QBB_1C و QAA_1B_1 را رسم کنیم آنگاه قطر QA_1 از متوازی الاضلاع QAA_1B_1 از نقطه مرکز ثقل مثلث مفروض عبور کرده و $QA_1 = 3QO$ است.

۴۰۹ ● ثابت کنید اگر خطی از رأس A مثلث ABC و میانگاه میانه BD عبور کند ضلع BC را به نسبت $1:2$ تقسیم می‌کند.

۴۱۰ ● دو پاره خط مساوی AB و A_1B_1 مفروض اند. اندازه زاویه بین این پاره خط‌ها چقدر باشد تا فاصله میانگاه‌های A_1A_1 و BB_1 مساوی $\frac{1}{2}AB$ شود؟

۴۱۱ ● از نقطه M واقع در درون یک متوازی الاضلاع خطوط مستقیمی را به موازات اضلاع آن رسم می‌کنیم. این خطوط اضلاع متوازی الاضلاع را در نقاط A ، C و B و D قطع می‌کنند. نقطه O مرکز متوازی الاضلاع مفروض است. ثابت کنید که نقطه تلاقی خطوط واصل میانگاه‌های اضلاع روبروی متوازی الاضلاع $ABCD$ میانگاه پاره خط OM است.

۴۱۲ ● ثابت کنید خط واصل میانگاه‌های قاعده‌های یک دوزنقه از نقطه تلاقی امتداد اضلاع جانبی

و نقطه تلاقی اقطار آن عبور می‌کند.

۴۱۳ • دوزنقه $ABCD$ مفروض است. خط موازی با قاعده‌های AB و CD اضلاع جانبی AD و BC را در نقاط M و N قطع می‌کند. ثابت کنید اگر $CM \parallel AN$ باشد آنگاه $BM \parallel DN$ خواهد بود.

۴۱۴ • در دوزنقه $ABCD$ ، اضلاع AB و CD قاعده و نقاط M و N میانگانه‌های اضلاع جانبی AD و BC هستند. ثابت کنید خط مستقیم AN موازی خط CM نیست.

۴۱۵ • در دایره‌ای به مرکز O دو وتر متعامد AR و CD در نقطه M همدیگر را قطع کرده‌اند. ثابت کنید میانگانه‌های اوتار AC و BD و نقطه M و نیز مرکز دایره رئوس یک متوازی الاضلاع هستند.

۴۱۶ • در مثلث ABC میانه CC_1 رسم شده است. ثابت کنید که: $CC_1 < \frac{1}{2}(CA + CB)$.

۴۱۷ • مثلث ABC مفروض است. نقطه M محل تلاقی میانه‌های مثلث و نقطه O ، نقطه دلخواهی از صفحه مثلث است. ثابت کنید که: $OM < \frac{1}{3}(OA + OB + OC)$.

۴۱۸ • دو متوازی الاضلاع $ABCD$ و $AB_1C_1D_1$ در رأس A مشترک هستند. ثابت کنید که:

$$CC_1 \leq BB_1 + DD_1$$

۴۱۹ • دو متوازی الاضلاع $ABCD$ و $A_1B_1C_1D_1$ مفروض‌اند. ثابت کنید در حالت کلی میانگانه‌های پاره‌خط‌های AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 رئوس متوازی الاضلاع $A_0B_0C_0D_0$ هستند. دو متوازی الاضلاع را طوری رسم کنید که نقاط A_0, B_0, C_0, D_0 به یک خط متعلق باشند.

۴۲۰ • متوازی الاضلاع $ABCD$ مفروض است. نقاط P, Q, R, S اضلاع AB, BC, CD, DA را به نسبت‌های مساوی تقسیم می‌کنند. ثابت کنید چهارضلعی $PQRS$ یک متوازی الاضلاع است.

۴۲۱ • دو مثلث ABC و $A_1B_1C_1$ مفروض‌اند. اگر میانه‌های مثلث اول با اضلاع مثلث دوم موازی باشند آنگاه ثابت کنید که میانه‌های مثلث دوم نیز با اضلاع مثلث اول موازی هستند.

۴۲۲ • چهارضلعی $ABCD$ مفروض است. چهارضلعی دیگری را طوری رسم می‌کنیم که رئوس آن مرکز تلاقی میانه‌های مثلث‌های ABC, BCD, CDA, DAB باشند. ثابت کنید که خطوط واصل میانگانه‌های اضلاع روبروی دو چهارضلعی متقارب هستند.

۴۲۳ • روی صفحه‌ای چهار خط مفروض هستند. بطوریکه سه تا از آنها در یک نقطه متقارب نبوده و در بین آنها نیز دو خط موازی یافت نمی‌شود. اگر یکی از این چهار خط با میانه مثلث تشکیل شده با سه خط دیگر موازی باشد آنگاه ثابت کنید که سه خط باقیمانده دارای ویژگی‌های مشابهی هستند.

۴۲۴ • خطوط l, m, n مرسوم از رئوس A, B, C مثلث ABC در نقطه S متقاطع هستند. ثابت کنید خطوط مستقیم l_1, m_1, n_1 به ترتیب از A_0, B_0, C_0 میانگانه‌های اضلاع BC, CA, AB عبور می‌کنند با خطوط l, m, n موازی بوده و در یک نقطه متقارب هستند.

۴۲۵ • مثلث ABC و نقطه M مفروض است. نقاط A_1, B_1, C_1 به ترتیب میانگانه‌های اضلاع BC, CA, AB هستند. از نقاط A, B, C خطوط مستقیمی را به موازات MA_1, MB_1, MC_1 رسم می‌کنیم. ثابت

کنید این خطوط متقارب هستند.

۴۲۶ • ثابت کنید اگر در چهارضلعی $ABCD$ ، خط واصل میانگاه‌های اضلاع BC و AD نصف مجموع دو ضلع AB و CD باشد آنگاه چهارضلعی مزبور دوزنقه یا متوازی الاضلاع خواهد بود.

۴۲۷ • در خارج مثلث ABC ، مثلث‌های ABC_1 ، BA_1C ، CAB_1 رسم شده‌اند. ثابت کنید نقاط تقاطع میانه‌های مثلث‌های ABC و $A_1E_1C_1$ بر هم منطبق‌اند.

۴۲۸ • روی امتداد ارتفاعات AA_1 ، BB_1 از مثلث ABC در سوی رؤس A و B پاره‌خط‌های AA_2 و BB_2 را با شرایط $AA_2 = BC$ و $BB_2 = AC$ جدا می‌کنیم. ثابت کنید که: $CA_2 \perp CB_2$ و $CA_2 = CB_2$.

۴۲۹ • در خارج مثلث ABC و روی اضلاع CA و CB مربعات CAA_1C_1 و CBB_1C_1 را رسم می‌کنیم. ثابت کنید میانه مثلث CC_1C_1 مرسوم از رأس C بر ضلع AB عمود بوده و با نصف آن برابر است.

۴۳۰ • در خارج چهارضلعی $ABCD$ مربعات ABB_1A_1 ، BCC_1B_1 ، CDD_1C_1 و DAA_1D_1 را با مراکز P ، Q ، R و S رسم می‌کنیم. ثابت کنید پاره‌خط‌های PR و QS متعامد و متساوی هستند.

۴۳۱ • چهارضلعی $ABCD$ مفروض است. خطوط واصل میانگاه‌های اضلاع روبرو در نقطه M متقاطع هستند. خط شکسته $MAUV$ را با شرط $\vec{AU} = \vec{MB}$ و $\vec{UV} = \vec{MC}$ رسم می‌کنیم. ثابت کنید که نقطه M میانگاه پاره‌خط VD است. نسبت مساحت چهارضلعی $ABCD$ را به مساحت چهارضلعی $MAUV$ پیدا کنید.

۴۳۲ • ثابت کنید که میانه‌های مثلث در نقطه تلاقی به نسبت $2:1$ تقسیم می‌شوند.


۴۳۳ • روی ضلع AD و قطر AC از متوازی الاضلاع $ABCD$ نقاط M و N را بترتیب با شرایط $AM = \frac{1}{3}AD$ و $AN = \frac{1}{6}AC$ اختیار می‌کنیم. ثابت کنید نقاط B ، V و M روی یک خط مستقیم قرار دارند. نقطه N پاره‌خط MB را به چه نسبتی قطع می‌کند؟

۴۳۴ • ثابت کنید در یک چهارضلعی دلخواه $ABCD$ ، پاره‌خط‌های واصل میانگاه‌های اضلاع روبرو $(P, K, R$ و L میانگاه‌های اضلاع AB ، BC ، CD و AD هستند) و پاره‌خط واصل میانگاه‌های اقطار چهارضلعی (M میانگاه BD است) در یک نقطه متقارب بوده و در این نقطه نصف می‌شوند.

۴۳۵ • دو خط موازی l_1 و l_2 دو جهت نقطه یعنی A_1 ، A_2 ، B_1 و B_2 مفروض‌اند. روی خطوط مفروض نقاط C_1 و C_2 را بترتیب طوری پیدا کنید که $A_2C_2 \parallel A_1C_1$ و $B_2C_2 \parallel B_1C_1$ باشد.

۴۳۶ • روی اضلاع مثلث ABC ، متوازی الاضلاع‌های ABB_2A_1 ، BCC_2B_1 و ACC_2A_1 را رسم می‌کنیم (شکل ۹۲).

آیا می‌توان مثلی رسم کرد که اضلاع آن مساوی پاره‌خط‌های B_1B_2 ، C_1C_2 و A_1A_2 باشد؟



شکل ۹۲

۲ • ضرب اسکالر (درونی) بردارها

۴۳۷ • دو ضلع $a = AB$ و $p = CD$ و زاویه α بین این دو ضلع از چهارضلعی $ABCD$ معلوم هستند. طول پاره خط وصل میانگاه دو ضلع دیگر چهارضلعی را پیدا کنید.

۴۳۸ • در مثلث ABC با اضلاع $AB = 5$ ، $BC = 2$ و $AC = 4$ زاویه ABC را محاسبه کنید.

۴۳۹ • ثابت کنید که ارتفاعات یک مثلث منفرجه الزاویه متقاطع هستند.

۴۴۰ • ثابت کنید که در یک متوازی الاضلاع مجموع مربعات اقطار آن با مجموع مربعات اضلاع متوازی الاضلاع مساوی است.

۴۴۱ • ثابت کنید اگر $ABCD$ یک مستطیل باشد آنگاه به ازاء هر نقطه M تساوی زیر برقرار است.

$$MA^2 + MC^2 = MB^2 + MD^2$$

۴۴۲ • ثابت کنید که با توجه به حاده، قائمه یا منفرجه بودن زاویه C در مثلث ABC میانه CD نیز بترتیب بزرگتر، مساوی یا کوچکتر از $\frac{1}{2}AB$ خواهد بود.

۴۴۳ • ثابت کنید در مثلث ABC با مرکز ثقل M رابطه زیر برقرار است:

$$AB^2 + BC^2 + AC^2 = 3(MA^2 + MB^2 + MC^2)$$

۴۴۴ • ثابت کنید اگر مرکز ثقل مثلث ABC بر نقطه تقارب ارتفاعات منطبق باشد آنگاه مثلث مفروض متساوی الاضلاع خواهد بود.

۴۴۵ • هر یک از میانه های مثلث را بر حسب اضلاع آن بیان کنید.

۴۴۶ • در دوزنقه ای با اقطار متعامد، قاعده بزرگتر برابر ۴ و قاعده کوچکتر برابر ۳ است. اگر یک ضلع جانبی آن با قاعده بزرگتر زاویه 60° تشکیل دهد طول آن را پیدا کنید.

۴۴۷ • مثلث ABC با شرایط $BC = 3$ ، $AC = 4$ و $\angle ABC = 120^\circ$ مفروض است. نقطه M ضلع AB را از طرف رأس B به نسبت ۱:۳ تقسیم کرده است. فاصله نقطه M را تا رأس C محاسبه کنید.

۴۴۸ • اگر ارتفاع CD از مثلث قائم الزاویه ABC از رأس قائمه مثلث رسم شود ثابت کنید که:

$$(a) CD^2 = AD \cdot BD; (b) AC^2 = AB \cdot AD; (c) BC^2 = BA \cdot BD$$

۴۴۹ • اقطار دوزنقه قائم الزاویه ای متعامد هستند. ثابت کنید ارتفاع دوزنقه بین قاعده های آن واسطه

هندسی است.

۴۵۰ • ثابت کنید در ذوزنقه $ABCD$ با قاعده های AB و CD تساوی های زیر برقرارند:

$$AC^2 + BD^2 > AD^2 + BC^2 + 2AB \cdot DC$$

۴۵۱ • برای تعامد اقطار یک چهارضلعی لازم و کافی است که مجموع مربعات دو ضلع روبروی آن برابر مجموع مربعات دیگر باشد. این نکته را ثابت کنید.

۴۵۲ • ثابت کنید اگر دو میانه مثلثی متعامد باشند آنگاه مجموع مربعات آنها با مربع میانه سوم برابر خواهد بود.

۴۵۳ • اگر در مثلث ABC میانه های AA_1 و BB_1 متعامد باشند رابطه بین اضلاع آن را پیدا کنید.

۴۵۴ • اضلاع زاویه قائمه در یک مثلث قائم الزاویه برابر a و b است. نیمساز زاویه مرسوم از رأس قائمه را بیابید.

۴۵۵ • عمود DM را از D ، میانگاه قاعده مثلث متساوی الساقین ABC بر ضلع BC رسم می کنیم. نقطه N میانگاه پاره خط MD است. ثابت کنید که پاره خط های AM و CN متعامد هستند.

۴۵۶ • از رأس قائمه C در مثلث قائم الزاویه ABC خطی را رسم می کنیم. از رئوس A و B مثلث عمودهای AA_1 و BB_1 را بر این خط عمود می کنیم. رأس C نسبت به نقطه M ، میانگاه پاره خط A_1B_1 روی نقطه C_1 منعکس می شود. ثابت کنید که: $\angle AC_1B = \frac{\pi}{2}$

۴۵۷ • در طرفین ضلع AB از مثلث ABC دو مثلث متساوی الاضلاع ABC_1 و ABC_2 را رسم می کنیم. اگر خطوط CC_1 و CC_2 ($C \neq C_2$ و $C \neq C_1$) متعامد باشند رابطه بین اضلاع مثلث مفروض را بیابید.

۳ • مسائل گوناگون

۴۵۸ • بر روی اضلاع یک متوازی الاضلاع و در خارج آن مربعاتی را رسم می کنیم. ثابت کنید که مراکز این مربعات رئوس یک مربع دیگر هستند.

۴۵۹ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC و در خارج آن مربعات $ABDE$ و $BCKF$ را رسم می کنیم. ثابت کنید پاره خط DF دو برابر میانه BP از مثلث ABC بوده و بر آن عمود است.

۴۶۰ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC مثلث های متساوی الاضلاع ABC_1 و BCA_1 را در خارج آن رسم می کنیم. ثابت کنید پاره خط واصل میانگاه های AB و A_1B_1 با نصف طول پاره خط AC برابر بوده و با آن زاویه 60° می سازد.

۴۶۱ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC مثلث های متساوی الاضلاع ABC_1 و BCA_1 را در خارج آن رسم می کنیم. اگر M ، N و P بترتیب میانگاه های اضلاع AC ، C_1B و BA_1 باشد آنگاه ثابت کنید که مثلث MNP متساوی الاضلاع است.

۴۶۲ • اقطار AC و BD از دوزنقه متساوی الساقین $ABCD$ ($AB \parallel CD$) در نقطه O با زاویه 60° همدیگر را قطع می‌کنند. ثابت کنید میانگانه‌های پاره خط‌های OA ، OD ، BC و BC رؤس یک مثلث متساوی الاضلاع است.

۴۶۳ • قطر AC از دوزنقه $ABCD$ مثلث متساوی الاضلاع ACD را تشکیل می‌دهد. از نقطه E واقع بر قطر AC (یا روی امتداد آن) قاعده BC با زاویه 60° دیده می‌شود. ثابت کنید میانگانه‌های پاره خط‌های AE ، BC و CD رؤس یک مثلث متساوی الاضلاع هستند.

۴۶۴ • روی دو ضلع مجاور یک متوازی الاضلاع که در یک رأس مشترک هستند دو مثلث متساوی الاضلاع (در داخل یا خارج متوازی الاضلاع) رسم می‌کنیم. آنگاه ثابت کنید مثلث حاصل از اتصال رأس متقابل به این رأس متوازی الاضلاع و رؤس آزاد مثلث‌های مرسوم تشکیل مثلث متساوی الاضلاع می‌دهند.

۴۶۵ • دو مثلث متساوی الاضلاع و هم جهت $A_1B_1C_1$ و $A_2B_2C_2$ مفروض‌اند. پاره خط‌های A_1A_2 ، B_1B_2 و C_1C_2 از طرف نقاط A_1 ، B_1 و C_1 بوسیله نقاط A ، B و C به نسبت‌های مساوی تقسیم می‌شوند. ثابت کنید مثلث ABC متساوی الاضلاع است.

۴۶۶ • در دوزنقه قائم الزاویه $ABCD$ با زاویه حاده 45° قطر AC برابر ضلع CD است. ثابت کنید میانگانه قاعده کوچکتر، از رأس A و از میانگانه ضلع CD به یک فاصله است.

۴۶۷ • روی پاره خط‌های AB و AC از یک خط مستقیم مثلث‌های متساوی الساقین و قائم الزاویه ABC_1 و ACB_1 ($\angle C_1 = \angle B_1 = 90^\circ$) را در جهات متقابل رسم می‌کنیم. ثابت کنید که میانگانه پاره خط BC و نقاط B_1 و C_1 رؤس یک مثلث متساوی الساقین قائم الزاویه هستند.

۴۶۸ • در مثلث ABC ($\angle B = 45^\circ$) ارتفاعات AA_1 و CC_1 در نقطه O متقاطع هستند. ثابت کنید میانگانه‌های پاره خط‌های BC ، A_1C_1 و CD رؤس یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین هستند.

۴۶۹ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC و در خارج آن مثلث‌های متساوی الاضلاع ABC_1 و BCA_2 را بترتیب با مراکز O_1 و O_2 رسم می‌کنیم. ثابت کنید که پاره خط O_1O_2 دو برابر پاره خطی است که میانگانه‌های O_1C و O_2C_1 را بهم وصل کرده و با پاره خط مزبور زاویه 60° می‌سازد.

۴۷۰ • روی اضلاع AB ، BC و CD از مستطیل $ABCD$ و در خارج آن مثلث‌های متساوی الاضلاع ABO_1 ، BCO_2 و CDO_3 را رسم می‌کنیم. ثابت کنید فاصله‌های بین پاره خط‌های AB ، O_1O_2 و BC ، O_2O_3 برابر هستند.

۴۷۱ • مربعات $ABMN$ و $CDKL$ روی اضلاع AB و CD از چهارضلعی محدب دلخواه $ABCD$ و در خارج آن رسم شده‌اند. ثابت کنید میانگانه‌های اقطار چهارضلعی‌های $ABCD$ و $MNKL$ رؤس یک مربع بوده و یا بر هم منطبق هستند.

۴۷۲ • دو مربع هم جهت $A_1B_1C_1D_1$ و $A_2B_2C_2D_2$ مفروض‌اند. پاره خط‌های A_1A_2 ، B_1B_2 ، D_1D_2 و C_1C_2

از طرف رئوس یکی از این مربعات بوسیله نقاط A_n, B_n, C_n, D_n به نسبت های مساوی تقسیم شده اند. ثابت کنید چهارضلعی $A_0B_0C_0D_0$ یک مربع است.

۴۷۳ • دو چند ضلعی منتظم و هم جهت $A_1A_2 \dots A_n$ و $B_1B_2 \dots B_n$ مفروض اند. پاره خط های $A_1A_2, B_1B_2, \dots, A_nB_n$ از طرف رئوس یکی از این چند ضلعی بترتیب با نقاط C_1, C_2, \dots, C_n به نسبت های مساوی تقسیم شده اند. ثابت کنید چند ضلعی $C_1C_2 \dots C_n$ منتظم است.

۴۷۴ • روی اضلاع AB و BC از مثلث ABC مثلث های قائم الزاویه متساوی الساقین ABD و BCE ($\angle B = \angle C = 90^\circ$) را در یک جهت رسم می کنیم. ثابت کنید میانگاه های پاره خط های AB ، BC و DE رئوس یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین هستند.

۴۷۵ • در مربع $ABCD$ ، O مرکز مربع، M و N ، میانگاه های خطوط BO و CD است. ثابت کنید مثلث AMN یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین است.

۴۷۶ • روی اضلاع چهارضلعی $ABCD$ و در خارج آن مثلث های قائم الزاویه و متساوی الساقین DAQ ، CDP ، BCN ، ABM ($\angle M = \angle N = \angle P = \angle Q = 90^\circ$) را رسم می کنیم. ثابت کنید میانگاه های پاره خط های MP و NQ و میانگاه های اقطار چهارضلعی رئوس یک مربع هستند.

۴۷۷ • در مثلث قائم الزاویه ABC ، ارتفاع CD را از رأس قائمه مثلث رسم می کنیم. نقاط M و N اضلاع AC و CB را بترتیب با نسبت های یکسانی تقسیم می کند (این نسبت ها از سوی نقاط A و C حساب می شوند). ثابت کنید مثلث DMN مشابه مثلث مفروض است.

۴۷۸ • روی قاعده و یکی از اضلاع جانبی مثلث متساوی الساقینی و در خارج آن دو مربع رسم می کنیم. ثابت کنید مراکز این مربعات و میانگاه ضلع جانبی دیگر مثلث رئوس یک مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین است.

۴۷۹ • در مستطیل $ABCD$ ، عمود BK را بر قطر AC رسم می کنیم. نقاط M و N پاره خط های AK و CD را نصف می کنند. ثابت کنید که $\angle BMN = 90^\circ$ است.

۴۸۰ • مثلث ABC_1 را حول وتر AB از مثلث قائم الزاویه ABC متقارن این مثلث رسم می کنیم. اگر M میانگاه ارتفاع C_1D از مثلث ABC و N میانگاه ضلع BC باشد آنگاه ثابت کنید مثلث AMN مشابه مثلث ABC است.

۴۸۱ • متوازی الاضلاع $ABCD$ مفروض است. روی اضلاع AB و BC نقاط H و K را طوری انتخاب می کنیم که مثلث های KAB و HCB متساوی الساقین باشند ($KA = AB$ و $HC = CB$). ثابت کنید مثلث KDH نیز متساوی الساقین است.

۴۸۲ • چهارضلعی $ABCD$ را حول نقطه O واقع بر صفحه آن به اندازه 90° چرخش می دهیم تا در وضعیت $A_1B_1C_1D_1$ قرار گیرد. ثابت کنید اگر P ، Q ، R ، S میانگاه های پاره خط های $A_1B_1C_1$ ، B_1C_1 ، C_1D_1 و D_1A_1 باشد آنگاه پاره خط های PR و QS متعامد و متساوی هستند.

۴۸۳ ● روی اضلاع یک چهارضلعی و در خارج آن مربعاتی را رسم می‌کنیم. ثابت کنید مراکز این مربعات رئوس یک چهارضلعی با اقطار متساوی و متعامد هستند.

۴۸۴ ● در مثلث قائم الزویه ABC ، از راس قائمه ارتفاع CD را رسم کرده و نقطه D_1 را متقارن نقطه D نسبت به ضلع AC مشخص می‌کنیم. ثابت کنید نقطه A و میانگاه‌های پاره‌خط‌های D_1C و CB رئوس یک مثلث مشابه با مثلث مفروض اند.

۴۸۵ ● در مثلث ABC ، نقطه D_1 را متقارن نقطه D از ضلع BC نسبت به وتر AB رسم می‌کنیم. نقطه E محل تلاقی پاره‌خط‌های DD_1 و AB_1 ، نقاط M و N بترتیب میانگاه‌های پاره‌خط‌های AD_1 و CE است. تساوی $\angle MVB = 90^\circ$ را ثابت کنید.

۴۸۶ ● در مثلث ABC ، ارتفاعات AA_1 و BB_1 را رسم می‌کنیم. همچنین نقطه AC را متقارن نقطه A_1 نسبت به خط AC مشخص می‌کنیم. نقاط M و N بترتیب میانگاه‌های پاره‌خط‌های B_1A_2 و AB هستند. ثابت کنید CMN یک مثلث قائم الزویه است.

۴۸۷ ● به عنوان قطر روی ضلع AB از مثلث ABC دایره‌ای رسم می‌کنیم. این دایره خط‌های AC و BC را بترتیب در نقاط A_1 و B_1 قطع می‌کند. ثابت کنید میانگاه‌های وترهای AB_1 و BA_1 و پای ارتفاع مرسوم از رأس C در مثلث مفروض مثلثی بوجود می‌آورند که با مثلث اولیه مشابه است.

۴۸۸ ● عمودهای MA_1 و MB_1 از نقطه دلخواه M واقع بر دایره محیطی مثلث ABC را بر اضلاع BC و AC از این مثلث وارد می‌کنیم. نقاط P و Q بترتیب میانگاه‌های پاره‌خط‌های AB و A_1B_1 هستند. ثابت کنید که: $\angle PQM = 90^\circ$

۴۸۹ ● نیمساز AD مرسوم از رأس A مثلث ABC دایره محیطی مثلث را در نقطه A_1 قطع می‌کند. M و N بترتیب میانگاه‌های پاره‌خط‌های CD و A_1B هستند. ثابت کنید مثلث‌های AMN و ACA_1 متشابه هستند.

۴۹۰ ● وتر مشترک دو دایره متقاطع قطریکی از آنها محسوب می‌شود. از یکی از دو انتهای این قطر مماس‌هایی را بر دو دایره رسم می‌کنیم. ثابت کنید که انتهای دیگر قطر و میانگاه‌های قطعاتی از مماس‌ها که در داخل دایره‌ها قرار دارند، رئوس یک مثلث قائم الزویه هستند.

۴۹۱ ● ارتفاعات AD و BE را از مثلث ABC از طرف رئوس A و B امتداد می‌دهیم. روی این امتدادها پاره‌خط‌های AM و BN را با شرایط $AM = BC$ و $BN = AC$ جدا می‌کنیم. ثابت کنید پاره‌خط‌های CM و CV متعامد و متساوی هستند.

۴۹۲ ● روی اضلاع AC و BC از مثلث ABC و در خارج آن مثلث‌های متساوی‌الاضلاع ACB_1 و BCA_1 را رسم می‌کنیم. نقطه M میانگاه ضلع AB و نقطه O مرکز مثلث ACB_1 است. زوایای مثلث MA_1O را پیدا کنید.

۴۹۳ ● روی اضلاع AC و BC از مثلث ABC و در خارج آن مربعات $ACDA_1$ و $BCEB_1$ را رسم

می‌کنیم. ثابت کنید نقطه تلاقی خطوط AB_1 و BA_1 روی ارتفاع مرسوم بر ضلع AB از مثلث مفروض قرار دارد.

۴۹۴ • سه مثلث متساوی الاضلاع A_1BC ، A_2DE و A_3FQ با جهت های یکسان مفروض هستند. نقاط A_1 ، A_2 و A_3 رئوس یک مثلث متساوی الاضلاع هم جهت با این مثلث هاست. ثابت کنید میانگانه های پاره خط های CD ، EF و QB رئوس یک مثلث متساوی الاضلاع هستند.

۴۹۵ • متوازی الاضلاع $ABCD$ مفروض است. روی اضلاع CD و BC و در خارج این متوازی الاضلاع مثلث های مشابه CDE و FBC را هم جهت رسم می‌کنیم. ثابت کنید مثلث FAE با این مثلث ها مشابه و هم جهت است.

۴۹۶ • روی اضلاع AB و AC از مثلث ABC به عنوان قاعده، سه مثلث متساوی الساقین متشابه ABP ، ACQ و BCR را رسم می‌کنیم. دودایره اول را در خارج مثلث و دایره سوم را در داخل آن رسم می‌کنیم. ثابت کنید چهارضلعی $APBQ$ متوازی الاضلاع است.

۴۹۷ • روی اضلاع AC و BC از مثلث ABC مستطیل های متشابه $ACMN$ و $BCPQ$ را رسم می‌کنیم. ثابت کنید نقطه تلاقی خطوط NB و QA روی ارتفاع مرسوم از رأس C مثلث یا بر امتداد آن واقع است.

۴۹۸ • از انتهای A وتر AB در دایره ای به مرکز O مماسی بر آن رسم می‌کنیم. عمود BM را از نقطه B بر این مماس وارد می‌آوریم. این عمود دایره را در نقطه C قطع می‌کند. ثابت کنید مرکز O و نقطه V که وتر AB را به نسبت $AN:NB = 1:2$ تقسیم می‌کند و نیز نقطه C' متقارن نقطه C نسبت به نقطه M روی یک خط مستقیم قرار دارند.

۴۹۹ • دو ضلع مقابل AB و CD از چهارضلعی $ABCD$ از طرف نقاط A و C بترتیب با نقاط M و N به نسبت های مساوی تقسیم شده اند. ثابت کنید پاره خط MN ، خط واصل میانگانه دو ضلع را به همان نسبت تقسیم کرده و خود نیز بوسیله آن نصف می‌شود.

۵۰۰ • نقاط P ، Q ، R و S اضلاع چهارضلعی $ABCD$ را با شرایط $AP:PB = DQ:QC = m$ و $AR:RD = BS:SC = n$ تقسیم کرده اند. ثابت کنید که پاره خط های PQ و RS نیز همدیگر را با همان نسبت قطع می‌کنند.

۵۰۱ • متوازی الاضلاع $ADEF$ را در مثلث ABC طوری محاط کرده ایم که رئوس D ، E و F بترتیب روی اضلاع AB ، BC و AC قرار گرفته اند. از نقطه M میانگانه ضلع BC خط مستقیم AM را رسم می‌کنیم تا خط DE را در نقطه K قطع کند. ثابت کنید چهارضلعی $CFDK$ یک متوازی الاضلاع است.

۵۰۲ • از دو رأس متقابل یک متوازی الاضلاع خطوط مستقیمی را عبور می‌دهیم. این خطوط اضلاع متوازی الاضلاع یا امتداد آنها را در چهار نقطه قطع می‌کنند. ثابت کنید این نقاط رئوس یک ذوزنقه یا

متوازی الاضلاع هستند.

۵۰۳ ● نقطه M بر ضلع جانبی AB از دوزنقه $ABCD$ را به رؤس C و D وصل می‌کنیم. از رؤس A و B خطوط مستقیم AV و BN را بترتیب موازی خطوط CM و DM رسم می‌کنیم. ثابت کنید نقطه N محل تلاقی این خطوط به ضلع CD تعلق دارد.

۵۰۴ ● چهارضلعی $ABCD$ مفروض است. خط راستی را از رأس A موازی ضلع BC رسم می‌کنیم و این خط قطر BD را در نقطه M قطع می‌کند. خط دیگری را نیز از رأس B به موازات ضلع AD رسم می‌کنیم و این خط نیز قطر AC را در نقطه V قطع می‌کند. ثابت کنید که: $CD \parallel MN$.

۵۰۵ ● شش ضلعی «مرکز تقارن» دلخواهی مفروض است. روی اضلاع آن به عنوان قاعده، مثلث‌های متساوی الاضلاعی رسم می‌کنیم. ثابت کنید میانگاه‌های پاره‌خط‌هایی که هر دو رأس مجاور این مثلث‌ها را بهم وصل می‌کند. رؤس یک شش ضلعی منتظم است.

۵۰۶ ● روی ضلع AC از مثلث ABC نقطه M را طوری اختیار می‌کنیم که $AM = \frac{1}{3}AC$ باشد. روی امتداد ضلع BC نقطه N را نیز طوری انتخاب می‌کنیم که $BN = CB$ باشد. نقطه تلاقی پاره‌خط‌های AB و MN آنها را به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟

۵۰۷ ● سه پاره‌خط $A_1A_2, A_1B_2, B_1B_2, C_1C_2$ مفروض اند. میانگاه‌های این خطوط را بترتیب با A_3, B_3, C_3 و مرکز ثقل مثلث‌های $A_1B_1C_1, A_2B_2C_2, A_3B_3C_3$ را بترتیب با M_1, M_2, M_3 نشان می‌دهیم. ثابت کنید که M_3 ، میانگاه پاره‌خط M_1M_2 است (یا نقاط M_1, M_2, M_3 بر هم منطبق اند).

۵۰۸ ● روی میانه CM از مثلث ABC نقطه N مفروض است. از این نقطه خطوط AN و BN را رسم می‌کنیم تا اضلاع BC و AC را بترتیب در نقاط A_1 و B_1 قطع کنند. ثابت کنید پاره‌خط A_1B_1 بوسیله میانه CM نصف شده و موازی ضلع AB است.

۵۰۹ ● روی ضلع AB از مثلث ABC نقطه P مفروض است. از این نقطه خطوطی را به موازات میانه‌های AM_1 و BM_1 رسم می‌کنیم تا اضلاع مثلث را در نقاط A_1 و B_1 قطع کنند. ثابت کنید میانگاه پاره‌خط A_1B_1 ، نقطه P_1 و نقطه Q محل تلاقی میانه‌های مثلث مفروض بر روی یک خط واقع است.

۵۱۰ ● محل تلاقی میانه‌های مثلثی از مرکز محیطی آن برابر یک سوم شعاع این دایره است. ثابت کنید این مثلث، قائم الزاویه است.

۵۱۱ ● روی دو خط پاره‌خط‌های AB و CD مفروض اند. پاره‌خط AB با نقاط M و M_1 به نسبت‌های $AM:AB = BM_1:AB = AC:BD$ و پاره‌خط CD با نقاط N و N_1 نیز به همان نسبت تقسیم شده اند. ثابت کنید پاره‌خط MM_1 بر پاره‌خط NN_1 عمود است.

۵۱۲ ● ثابت کنید اگر اضلاع جانبی یک دوزنقه بر هم عمود باشند آنگاه مجموع مربعات قاعده‌های آن با مجموع مربعات اقطار این دوزنقه برابر است.

۵۱۳ ● اگر در یک چهارضلعی مجموع مربعات اقطار آن با مجموع مربعات اضلاع آن برابر باشد آنگاه

چهارضلعی یک متوازی الاضلاع خواهد بود.

۵۱۴ • دو مربع هم جهت $ABCD$ و $A_1B_1C_1D_1$ مفروض اند. رابطه $AA_1^2 + CC_1^2 = BB_1^2 + DD_1^2$ را ثابت کنید.

۵۱۵ • روی میانه CM_3 از مثلث ABC نقطه P مفروض است. خطوط AP و BP که از این نقطه عبور داده شده اند اضلاع CB و AC را به ترتیب در A_1 و B_1 قطع می کنند. اگر $AA_1 = BB_1$ باشد آنگاه ثابت کنید مثلث مفروض، متساوی الساقین است.

۵۱۶ • روی قاعده AB از مثلث متساوی الساقین ABC نقطه P مفروض است.

رابطه $PC^2 = AC^2 - AP \cdot BP$ را ثابت کنید. اگر P روی امتداد قاعده AB واقع باشد فرمول فوق به چه صورتی درمی آید؟

۵۱۷ • عمودهای MX ، MY و MZ را از نقطه M واقع در درون مثلث قائم الزاویه ABC (بازاویه قائمه C) به ترتیب بر اضلاع BC ، CA و AB وارد می کنیم. آنگاه رابطه زیر را ثابت کنید:

$$AY \cdot AC + BZ \cdot BA + CX \cdot CB = AB^2$$

۵۱۸ • روی امتدادهای اضلاع AB ، BC و CA از مثلث ABC نقاط M ، N و P را به ترتیب طوری اختیار می کنیم که $BM = AB$ ، $AN = BC$ و $AP = CA$ باشد. نسبت مجموع مربعات اضلاع مثلث PMN را بر مجموع اضلاع مثلث ABC بیابید.

۵۱۹ • اضلاع جانبی BC و AD از دوزنقه $ABCD$ را حول میانگانه های آنها در جهت مثبت به اندازه 90° دوران می دهیم تا در موقعیت A_1D_1 و B_1C_1 قرار گیرند. رابطه $D_1C_1 = A_1B_1$ را ثابت کنید.

۵۲۰ • روی اضلاع AB ، CD و EF از شش ضلعی «مرکز تقارن» مثلث های متساوی الاضلاع هم جهت ABP ، CDQ و EFR را رسم می کنیم. ثابت کنید مثلث PRQ متساوی الاضلاع است.

۵۲۱ • ضلع AC از مثلث ABC را حول رأس A به اندازه $90^\circ +$ وضع BC را حول رأس B به اندازه $90^\circ -$ دوران می دهیم. ثابت کنید که موقعیت میانگانه پاره خط C_1C_2 مستقل از موقعیت رأس C است. نقاط C_1C_2 نقاط انتهایی پاره خط های دوران داده شده است.

۵۲۲ • روی اضلاع یک چهارضلعی به عنوان قطر نیمدایره هایی رسم می کنیم. دوتا از این نیمدایره های متقابل در درون چهارضلعی و دو نیمدایره متقابل دیگر در بیرون آن قرار دارند. ثابت کنید میانگانه های کمانهای این نیمدایره ها رؤس یک متوازی الاضلاع هستند.

۵۲۳ • یک مربع مفروض است. در داخل این مربع همه مثلث های قائم الزاویه متساوی الساقینی را رسم می کنیم که یک رأس حاده آنها بر یکی از رؤس مربع و رأس قائمه آنها بر روی اقطار مربع منطبق اند. مجموعه رؤس سوم این مثلث ها را بیابید.

۵۲۴ • روی اضلاع یک مثلث و در خارج آن مربعاتی را رسم می کنیم. ثابت کنید ارتفاعات مثلثی که رؤس آن مرکز تقارن این مربعات است از رؤس مثلث مفروض عبور می کنند.

۵۲۵ • در مثلث ABC ارتفاع AA_1 ، BB_1 و CC_1 را رسم می کنیم نقاط A_0 ، B_0 و C_0 میانگانه های این

ارتفاعات است.

ثابت کنید مثلث های $A_0B_0C_1$ ، $A_0C_0B_1$ و $B_0C_0A_1$ متشابه هستند.

۵۲۶ • خطوط موازی q_1 و q_2 و دو جفت نقطه یعنی A_1, B_1, A_2, B_2 مفروض اند. روی خطوط مفروض نقاط C_1 و C_2 را طوری بیابید که $A_2C_2 \parallel A_1C_1 \parallel B_2C_2 \parallel B_1C_1$ باشد.

۵۲۷ • اضلاع BC و AD از چهارضلعی $ABCD$ بوسیله نقاط B_1, A_1, B_2, A_2 به قسمت های مساوی تقسیم شده اند. آیا همیشه می توان خط مستقیمی را طوری رسم کرد که قطعه محصور از آن بوسیله اضلاع AB و CD بوسیله خطوط A_1B_1 و A_2B_2 به دو قسمت مساوی تقسیم شوند؟

۵۲۸ • سه نقطه A_1, B_1, C_1 مفروض اند. این نقاط را به عنوان نقاط تقسیم اضلاع مثلث ABC طوری اختیار می کنیم که آنها را به نسبت $2:1$ تقسیم کنند. مثلث ABC را رسم کنید.

۵۲۹ • روی وتر مثلث قائم الزاویه ای یا در امتداد آن نقطه ای را طوری پیدا کنید که خط واصل تصاویر آن روی اضلاع زاویه قائمه بر وتر عمود باشد.

۵۳۰ • پاره خط های OA ، OB و OC دو خط مستقیم α و β را در نقاط A ، B ، C و A_1 ، B_1 ، C_1 طوری قطع می کنند که $AB:BC = m$ و $OA_1:OB_1:OC_1 = 1:1:1$ باشد. رابطه بین نسبت های $OB:OB_1 = x$ و $OC:OC_1 = y$ را پیدا کنید.

۵۳۱ • اضلاع متقابل AB و DC ، AD و BC از چهارضلعی $ABCD$ در نقاط E و F همدیگر را قطع می کنند. ثابت کنید پاره خط های حاصله از این طریق در تساوی $\frac{AE \cdot CE}{BE \cdot DE} = \frac{AF \cdot CF}{BF \cdot DF}$ صدق می کنند.

۵۳۲ • پاره خط مار از مرکز ثقل مثلثی اضلاع آنها را به پاره خط های مساوی تقسیم می کند. رابطه بین نسبت قطعات حاصله بر روی یک ضلع و نسبت قطعات حاصل بر روی ضلع دیگر را بیابید.

۵۳۳ • امتداد های اضلاع متقابل یک چهارضلعی همدیگر را دو دو در یک نقطه قطع می کنند. ثابت کنید میانگاه خط واصل این نقاط بر روی خطی قرار دارد که از میانگاه های اقطار چهارضلعی عبور می کند.

۵۳۴ • روی صفحه ای یک دایره و یک نقطه مفروض اند. ثابت کنید مجموع توانهای چهارم فواصل این نقطه از رئوس دایره محاط در دایره مقداری ثابت است.

بخش ۷ • مقادیر حداقل و حداکثر

مسائل مربوط به یافتن مقادیر حداقل و حداکثر را معمولاً می توان طبق طرح زیر با موفقیت حل کرد:

۱ • کمیتی را که یافتن مقدار بهینه آن مطرح است (یعنی کمیتی که کوچکترین یا بزرگترین مقدار آن باید پیدا شود) مشخص کرده و آن را با حرف y (یا حروفات S, P, r, R و غیره بر اساس طرح مسئله) نشان می دهیم.

۲ • یکی از کمیت های مجهول (یک ضلع، یک زاویه غیره) را متغیر مستقل در نظر گرفته و آن را با x

نشان می‌دهیم. کرانه‌های حقیقی تغییرات x (طبق شرایط مسئله) را تشکیل می‌دهیم.

۳ • طبق شرایط مشخص مسئله مقدار y را بر حسب x و کمیت‌های مجهول بیان می‌کنیم. (این حالت، مرحله هندسی حل مسئله بشمار می‌رود).

۴ • بزرگترین یا کوچکترین مقدار تابع $y = f(x)$ (طبق مطلوبات مسئله) را که در مرحله قبل بدست آمده است در داخل فاصله‌ای از مقادیر تغییرات حقیقی x (که در بند ۲ بدست آمده است) محاسبه می‌کنیم.

۵ • نتیجه بند ۴ را در مورد مسئله هندسی مفروض تفسیر می‌کنیم.


در طی سه مرحله اول مدل تحلیلی یا ریاضی مسئله تشکیل می‌شود. در اینجا حل موفقیت آمیز مسئله به انتخاب منطقی متغیر مستقل بستگی دارد. بیان تحلیلی y بر حسب x با روش نسبتاً ساده حائز اهمیت است. در طی مرحله چهارم مدل ریاضی تشکیل شده بوسیله آنالیز ریاضی و گاهی نیز با روشهای مقدماتی بررسی می‌شود. طرح کلی حل مسئله یافتن بزرگترین یا کوچکترین مقدار تابع $y = f(x)$ را که در بازه X دیفرانسیل پذیر است، با استفاده از حساب دیفرانسیل و انتگرال بازگویی می‌کنیم:

$$(1) f'(x) \text{ را پیدا می‌کنیم.}$$

(2) نقاط بحرانی و ایستا را در مورد تابع $f(x)$ بدست می‌آوریم. یعنی نقاطی را پیدا می‌کنیم که به ازاء آن $f'(x) = 0$ بوده و یا $f'(x)$ موجود نیست.

(3) جدولی از مقادیر $y = f(x)$ تهیه می‌کنیم؛ این جدول بایستی مقادیری از تابع را شامل شود که به بند (2) مربوط شده و نیز نقاط انتهایی بازه X را در برگیرد. اگر بازه X دارای نقطه انتهایی نباشد در آنصورت حدود تابع $f(x)$ به ازاء نقاط انتهایی بایستی در جدول آورده شود. خوانندگان بخاطر داشته باشند که در حل این مسائل حالاتی نیز پیش می‌آید که در آنها صرفاً از روش هندسی استفاده می‌شود (به مثال ۵ زیر مراجعه کنید)

مثال ۱ • روی دایره‌ای به شعاع R نقاط A و B مفروض اند. فاصله بین آنها برابر α است. غیر از این دو، نقطه دلخواه C نیز روی این دایره در نظر گرفته شده است. بزرگترین مقدار ممکنه برای عبارت $AC^2 + BC^2$ را بیابید (شکل ۹۳).



شکل ۹۳

حل ۱ • عبارت $AC^2 + BC^2$ کمیتی است که بایستی بهینه آن را بیابیم.

تساوی $AC^2 + BC^2 = y$ را در نظر می‌گیریم.

۲ • متغیر مستقلی را بصورت $x = \angle CAB$ اختیار می‌کنیم.

حدود حقیقی این متغیر عبارت از $\pi - \gamma < x < 0$ است که در آن $\gamma = \angle ACB$ می‌باشد (این زاویه

از انتخاب نقطه C مستقل است زیرا همیشه برابر نصف کمان AB کوچک است. بخاطر ماهیت مسئله بدیهی است که نقطه C بایستی روی کمان بزرگ AB انتخاب شود.

۳ • کمیت y یعنی $AC^2 + BC^2$ را بر حسب x ، a و R بیان می‌کنیم.

طبق قانون کسینوسها $BC = 2R \sin x$ و $AC = 2R \sin(\pi - x - \gamma) = 2R \sin(x + \gamma)$ است. بدلیل $AB = 2R \sin \gamma$ رابطه $a = 2R \sin \gamma$ را داریم که از آن نیز $\sin \gamma = \frac{a}{2R}$ استنتاج می‌شود. در نتیجه رابطه زیر حاصل می‌شود که در آن $\sin \gamma = \frac{a}{2R}$ است:

$$y = AC^2 + BC^2 = (2R \sin x)^2 + (2R \sin(x + \gamma))^2 = 4R^2 (\sin^2 x + \sin^2(x + \gamma))$$

(مدل ریاضی مسئله تشکیل شده است).

۴ • تابع $y = 4R^2 (\sin^2 x + \sin^2(x + \gamma))$ را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. بایستی بزرگترین مقدار آن را درباره $(0$ و $\pi - \gamma)$ بیابیم. در عبارت تابع تبدیلاتی را انجام می‌دهیم. چنین داریم:

$$y = 4R^2 \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{1 - \cos(2x + 2\gamma)}{2} \right) = 2R^2 [2 - (\cos 2x + \cos(2x + 2\gamma))] = 4R^2 (1 - \cos(2x + \gamma) \cos \gamma).$$

بزرگترین مقدار عبارت حاصله را می‌توان بدون استفاده از مشتق بدست آورد. بدیهی است که تابع بزرگترین مقدار را وقتی اختیار می‌کند که $\cos(2x + \gamma)$ کوچکترین مقدار خود را اختیار کند. یعنی وقتی که $\cos(2x + \gamma) = -1$ باشد. این تساوی به ازاء $2x + \gamma = \pi$ یعنی به ازاء $x = \frac{\pi - \gamma}{2}$ حادث می‌شود. توجه دارید که نقطه $\frac{\pi - \gamma}{2}$ به بازه $(0$ و $\pi - \gamma)$ تعلق دارد. حال بزرگترین مقدار ممکنه برای تابع y را محاسبه می‌کنیم:

$$y = 4R^2 (1 - (-1) \cos \gamma) = 4R^2 (1 + \cos \gamma) = 4R^2 (1 + \sqrt{1 - \sin^2 \gamma}) = 4R^2 \left(1 + \sqrt{1 - \frac{a^2}{4R^2}} \right) = 2R (2R + \sqrt{4R^2 - a^2})$$

(در اینجا آخرین مرحله مسئله در چهار چوب تشکیل مدل ریاضی انجام گرفته است).

۵ • با مراجعه به اصل مسئله نتیجه زیر را بیان می‌کنیم:

بزرگترین مقدار ممکنه برای عبارت $AC^2 + BC^2$ با $2R(2R + \sqrt{4R^2 - a^2})$ برابر است؛ این مقدار وقتی حاصل می‌شود که $\angle CAB = \frac{\pi - \gamma}{2}$ یعنی مثلث ABC متساوی الساقین باشد ($AC = CB$).
مثال ۲ • از نقطه ثابت M در درون یک زاویه خط مستقیمی را طوری رسم کنید که مثلث حاصله دارای کوچکترین مساحت ممکنه باشد (شکل ۹۴).

حل ۱ • کمیت مورد بهینه عبارت از S ، مساحت مثلث AOB است.

۲ • خطوطی بصورت $DM \parallel OB$ و $MK \parallel OA$ را رسم می‌کنیم. اگر $KB = x$ منظور شود کرانه‌های حقیقی x عبارت از $0 < x < +\infty$ خواهد بود.

۳ • چون M نقطه ثابتی است پاره خط های DM و KM نیز ثابت بوده و $DM = a$ ، $KM = b$ را منظور می‌کنیم. مقدار S را بر حسب x ، a و b بیان می‌کنیم.

مثلث های MKB و AOB را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. آنها متشابه بوده و از اینرو $\frac{MK}{AO} = \frac{KB}{OB}$ یعنی $\frac{b}{AO} = \frac{x}{a+x}$ را داریم. از اینرو $AO = \frac{b(a+x)}{x}$ بدست می‌آید.

باز هم $\gamma = \frac{1}{2} AO \cdot OB \cdot \sin \alpha$ را داریم که در آن $\alpha = \angle AOB$ است. بنابراین

$$S = \frac{1}{2} \frac{b(a+x)}{x} (a-x) \sin \alpha = \frac{b \sin \alpha}{2} \cdot \frac{(a+x)^2}{x}$$

(مدل ریاضی مسئله) بدست می‌آید.

۴ • تابع $S = k \frac{(a+x)^2}{x}$ ، $0 < x < +\infty$ را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم که در آن $k = \frac{b \sin \alpha}{2}$ است. کوچکترین مقدار آن را بدست می‌آوریم.

$$S' = k \frac{2(a+x)x - (a+x)^2}{x^2} = k \frac{(a+x)(x-a)}{x^2} \quad (1)$$

(۲) مشتق تابع در نقطه $x=0$ وجود ندارد و در نقاط $x=a$ و $x=-a$ صفر می‌شود. از بین این سه نقطه فقط نقطه $x=a$ به بازه $(0, +\infty)$ تعلق دارد:

(۳) حدود یک طرفه تابع را در نقاط انتهایی بازه بدست می‌آوریم:


$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{k(a+x)^2}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{k(a+x)^2}{x} = +\infty$$

جدول مقادیر تابع به شرح زیر خواهد بود.

x	0	$+\infty$	a
y	$+\infty$	$+\infty$	$4ka$

بنابراین کوچکترین مقدار تابع در نقطه $x=a$ حاصل می‌شود.

۵ • به اصل مسئله هندسی برمی‌گردیم. اگر $x = KB = a$ باشد آنگاه بدلیل $OK = a$ و میانخط بودن MK در مثلث AOB ، نقطه M میانگاه AB خواهد بود. بدین ترتیب برای تشکیل مثلثی با حداقل مساحت ممکنه خط مستقیم را بایستی طوری از نقطه M عبور دهیم که قطعه محصور از این خط در داخل زاویه با نقطه M نصف شود.



شکل ۹۴

مثال ۳ • روی اضلاع مساوی AB و BC از مثلث متساوی الساقین ABC نقاط D و E را با شرط

$DE \parallel AC$ اختیار می‌کنیم. روی خط DE مربعی را طوری رسم می‌کنیم که مربع و نقطه B در دو طرف خط DE قرار بگیرند. اگر $AC = b$ و ارتفاع BH از مثلث ABC برابر h باشد بزرگترین مقدار ممکنه برای مساحت سطح اشتراک مثلث و مربع را بیابید.

حل ۱۰. کمیت مورد بهینه عبارت از مساحت سطح اشتراک مثلث و مربع است که با S نشان می‌دهیم.

۲. ضلع مربع را با x یعنی $DE = x$ نشان می‌دهیم و کرانه‌های حقیقی x را پیدا می‌کنیم. بدیهی است که از میان همهٔ مربعاتی که کاملاً در داخل مثلث قرار دارند مربعی بیشترین مساحت را داراست که در داخل مثلث محاط شده است. یعنی مربعی که همهٔ رئوس آن روی اضلاع مثلث قرار دارند (شکل ۹۵). اگر مقدار x از طول ضلع مربع محاطی بیشتر باشد آنگاه مربع و مثلث به شکل ۹۶ درمی‌آیند. در این حالت سطح مشترک مثلث، مربع با مستطیل محاطی $DEPT$ نشان داده می‌شود. از اینرو x از طول ضلع مربع محاطی تا ضلع AC تغییر می‌کند. ضلع مربع محاطی را پیدا می‌کنیم. از نشابه مثلث‌های ABC و BDE (به شکل ۹۵ مراجعه کنید) درمی‌یابیم که:

$$\frac{x}{b} = \frac{h-x}{h} \quad x = \frac{bh}{b+h}$$

بنابراین $b > x \geq \frac{bh}{b+h}$ حاصل می‌شود.

۳. مساحت S مربوط به مستطیل محاطی $DEPT$ را بر حسب a ، x و h بیان می‌کنیم. از تشابه

مثلث‌های ADT و ABH به $\frac{DT}{BH} = \frac{AT}{AH}$ یعنی $\frac{DT}{\frac{b}{2}} = \frac{AT}{\frac{x}{2}}$ وصول می‌یابیم که از آن

$$\text{نیز } DT = \frac{h(h-x)}{b} \text{ و در نتیجه } S = \frac{hx}{b} \text{ بدست می‌آید.}$$

۴. تابع $S = \frac{h}{b}(hx - x^2)$ را در بازهٔ نیم باز $(\frac{bh}{b+h}, h)$ مورد ملاحظه قرار داده و بزرگترین مقدار آن را بدست می‌آوریم:

$$(1) \quad S' = \frac{h}{b}(b - 2x) \quad (2) \quad S' = 0 \quad ; \quad x = \frac{b}{2} \text{ به ازاء}$$

حال تعلق نقطه $\frac{b}{2}$ را به بازهٔ نیم باز $(\frac{bh}{b+h}, b)$ یعنی برقراری نامساوی $\frac{bh}{b+h} < \frac{b}{2}$ را بررسی می‌کنیم. این رابطه با شرط $h < b + 2h < b$ یعنی با شرط $h < b$ متقاعد می‌شود. اگر $h \geq b$ باشد آنگاه در درون بازهٔ نیم باز $(\frac{bh}{b+h}, b)$ نقطه ایستا وجود نخواهد داشت.

(3) از بین مقادیر تابع، جدولی را برای یافتن بزرگترین مقدار آن تهیه می‌کنیم. قبل از همه توجه داریم که: $\lim_{x \rightarrow b-0} S(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} \frac{h}{b}(bx - x^2) = 0$: همچنین از آنجا که یک ضلع مربع محاطی

است، $S\left(\frac{bh}{b+h}\right) = \left(\frac{bh}{b+h}\right)^2$ را داریم.


سرانجام چنین حاصل می‌شود: $S\left(\frac{b}{2}\right) = \frac{h}{b} \left(b \cdot \frac{b}{2} - \left(\frac{b}{2}\right)^2\right) = \frac{hb}{4}$. اگر $h < b$ باشد آنگاه جدول مورد نظر دارای شکل زیر خواهد بود:

x	$\frac{bh}{b+h}$	$\frac{b}{2}$	b
S	$\left(\frac{bh}{b+h}\right)^2$	$\frac{bh}{4}$	0


حال $\frac{bh}{4} > \left(\frac{bh}{b+h}\right)^2$ را ثابت می‌کنیم. این رابطه را به نامساوی $(b+h)^2 > 4bh$ یعنی $(b-h)^2 > 0$ تحویل می‌دهیم که یک نامساوی بدیهی است. بدین ترتیب اگر $h < b$ باشد آنگاه بزرگترین مقدار تابع S عبارت از $\frac{bh}{4}$ بوده و در نقطه $x = \frac{b}{2}$ به این مقدار می‌رسد. اگر $h \geq b$ باشد آنگاه جدول مورد نظر دارای شکل زیر خواهد بود:

x	$\frac{bh}{b+h}$	b
S	$\left(\frac{bh}{b+h}\right)^2$	0

در این حالت بزرگترین مقدار تابع S برابر $\left(\frac{bh}{b+h}\right)^2$ بوده و در نقطه $x = \frac{bh}{b+h}$ به این مقدار می‌رسد. ۵. با مراجعه به اصل مسئله به نتیجه گیری زیر وصول می‌یابیم. اگر ارتفاع مثلث از قاعده آن کوتاهتر باشد آنگاه سطح مشترک مثلث و مربع رسم شده بر روی میانخط مثلث بزرگترین سطح را خواهد داشت. و اگر ارتفاع مثلث از قاعده کوتاهتر باشد آنگاه مساحت مربع محاط در مثلث بزرگترین مقدار را خواهد داشت.



شکل ۹۶



شکل ۹۵

مثال ۴. در یک دایره ای به شعاع R همهٔ دوزنقه های محاطی مورد نظر هستند. طول ضلع جانبی

دوزنقه ای را پیدا کنید که دارای بیشترین مساحت باشد، با این شرط که طول یکی از قاعده های آن برابر $R\sqrt{3}$ باشد.

حل ۱ • کمیت مورد بهینه را که مساحت دوزنقه است با S نشان می دهیم.

۲ • زاویه مجاور به قاعده معلوم را با x نشان می دهیم. حداقل مقدار ممکنه برای این زاویه عبارت از 60° بوده و در اینصورت دوزنقه به یک مثلث منظم محاطی تبدیل می شود که طول ضلع آن برابر $R\sqrt{3}$ خواهد بود (شکل ۹۷). از طرف دیگر چون کمان مقابل به زاویه مجاور به قاعده دوزنقه از 240° کمتر است (شکل ۹۸) از اینرو x نیز بایستی کمتر از 120° باشد. بدین ترتیب کرانه های حقیقی متغیر مستقل کمکی عبارت از $60^\circ \leq x < 120^\circ$ خواهد بود.

۳ • مساحت S دوزنقه $ABCD$ را بر حسب x و R بیان می کنیم. چنین داریم:

$$AD = R\sqrt{3}, \quad BD = 2R \sin x, \quad \angle ABD = \frac{1}{2} \cup AD = 60^\circ \quad \angle BDA = 120^\circ - x$$

$$BH = BD \sin(120^\circ - x) = 2R \sin x \times \sin(120^\circ - x)$$

BH نیز ارتفاع دوزنقه است. چنین حاصل می شود:

$$HD = \frac{AD+BC}{2} = BD \cos(120^\circ - x) = 2R \sin x \cos(120^\circ - x)$$

$$S = HD \cdot BH = 2R \sin x \cos(120^\circ - x) \cdot 2R \sin x \sin(120^\circ - x) = 2R^2 \sin^2 x \sin(240^\circ - 2x)$$

۴ • بزرگترین مقدار تابع $S = 2R^2 \sin^2 x \times \sin(240^\circ - 2x)$ را در بازه نیم باز $[60^\circ, 120^\circ)$ بدست می آوریم.

$$(1) \quad S' = 2R^2 (2 \sin x \cos x \sin(240^\circ - 2x) - 2 \sin^2 x \times \cos(240^\circ - 2x)) = 4R^2 \sin x (\sin(240^\circ - 2x) \cos x - \sin x \times \cos(240^\circ - 2x)) = 4R^2 \sin x \sin(240^\circ - 2x - x) = 4R^2 \sin x \times \sin(240^\circ - 3x).$$

(2) در بازه نیم باز $[60^\circ, 120^\circ)$ مقدار S' فقط در نقطه $x = 80^\circ$ صفر می شود.

(3)

x	60°	80°	120°
S	$\frac{3R^2 \sqrt{3}}{4}$	$2R^2 \sin^3 80^\circ$	0

در این جدول $S(120^\circ)$ به عنوان $\lim_{x \rightarrow 120^\circ} S$ مفهوم می شود.


مقادیر $\frac{3R^2\sqrt{3}}{4}$ و $2R^2\sin^3 80^\circ$ را مقایسه می‌کنیم. با فرض $\frac{3R^2\sqrt{3}}{4} > 2R^2\sin^3 80^\circ$ به

$$\sin 80^\circ > \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ یعنی } \sin^3 80^\circ > \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$$


یا $\sin 80^\circ > \sin 60^\circ$ استنتاج می‌شود. نامساوی اخیر و در نتیجه فرض ما درست می‌باشد. از اینرو تابع $f(x)$ در $x = 80^\circ$ به بزرگترین مقدار خود می‌رسد.

۵. بدین ترتیب ذوزنقه ای دارای بیشترین مساحت می‌شود که زاویه مجاور به قاعده آن 80° باشد. پیدا کردن ضلع جانبی چنین ذوزنقه ای مطلوب شده است.

از مثلث ABD (شکل ۹۸) به $AB = 2R \sin(120^\circ - x)$ می‌رسیم. به ازاء $x = 80^\circ$ تساوی $AB = 2R \sin 40^\circ$ حاصل می‌شود.



شکل ۹۸



شکل ۹۷

مثال ۵. ثابت کنید که در بین همه مثلث‌ها که قاعده و زاویه مقابل به قاعده در آنها یکسان است مثلثی دارای بلندترین نیمساز زاویه مقابل به قاعده است که متساوی الساقین باشد.

حل. روش اول.

۱. طول نیمساز BD را باید بهینه کنیم (شکل ۹۹).

۲. طبق فرض AC و $\angle ABC$ مقادیر ثابتی هستند. تساوی‌های $AC = b$ و $\angle ABC = \beta$ را در

نظر می‌گیریم و متغیر مستقل $x = \angle ADB$ را معرفی می‌کنیم. کرانه‌های حقیقی متغیر x را بدست می‌آوریم. از یک طرف، زاویه x برای مثلث BDC زاویه خارجی بوده و از هر یک از زوایای داخلی

مثلث BDA که غیرمجاور به این زاویه هستند بزرگتر است. یعنی $x > \frac{\beta}{2}$ است. از طرف دیگر از مثلث ABD به $x < \pi - \frac{\beta}{2}$ و در نتیجه به $\frac{\beta}{2} < x < \pi - \frac{\beta}{2}$ وصول می‌یابیم.

۳. BD را بر حسب x ، b ، و β بیان می‌کنیم.


توجه داریم که $\angle BAD = \pi - x - \frac{\beta}{2}$ و $\angle BCD = x - \frac{\beta}{2}$ است.

طبق قانون سینوسها از مثلث ABC به $\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}$ یعنی $\frac{b}{\sin \beta} = \frac{AB}{\sin(x - \frac{\beta}{2})}$ می‌رسیم

که از آن نیز $AB = \frac{b \sin(x - \frac{\beta}{2})}{\sin \beta}$ بدست می‌آید. بطریق مشابه طبق قانون سینوسها از مثلث ABD

نیز $\frac{AB}{\sin D} = \frac{BD}{\sin A}$ یعنی $\frac{AB}{\sin x} = \frac{y}{\sin\left(\pi - x - \frac{\beta}{2}\right)}$ حاصل می‌شود که از آن نیز تساوی زیر استنتاج می‌شود:

$$y = \frac{AB \sin\left(x + \frac{\beta}{2}\right)}{\sin x} = \frac{b \sin\left(x - \frac{\beta}{2}\right) \sin\left(x + \frac{\beta}{2}\right)}{\sin x \sin \beta} = \frac{b}{2 \sin \beta} \cdot \frac{\cos \beta - \cos 2x}{\sin x}.$$



۴ • بزرگترین مقدار تابع $y = \frac{b}{2 \sin \beta} \cdot \frac{\cos \beta - \cos 2x}{\sin x}$ را در بازه $\left(\frac{\beta}{2}, \pi - \frac{\beta}{2}\right)$ بدست می‌آوریم.

(1)

$$\begin{aligned} y' &= \frac{b}{2 \sin \beta} \cdot \frac{2 \sin 2x \sin x - \cos x (\cos \beta - \cos 2x)}{\sin^2 x} = \frac{b}{2 \sin \beta} \times \\ &\frac{(\cos 2x \cos x + \sin 2x \sin x) + \sin 2x \sin x - \cos \beta \cos x}{\sin^2 x} = \frac{b}{2 \sin \beta} \times \\ &\frac{\cos x + 2 \sin^2 x \cos x - \cos \beta \cos x}{\sin^2 x} = \frac{b}{2 \sin \beta} \cdot \frac{\cos x (1 - \cos \beta + 2 \sin^2 x)}{\sin^2 x} = \\ &\frac{b \cos x \left(\sin^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 x\right)}{\sin \beta \sin^2 x}. \end{aligned}$$

(2) اگر $\cos x = 0$ باشد یعنی به ازاء $x = \frac{\pi}{2}$ (معادله $\cos x = 0$ در بازه $\left(\frac{\beta}{2}, \pi - \frac{\beta}{2}\right)$ جواب دیگری ندارد)، $y' = 0$ است؛ اگر $\sin x = 0$ باشد y' موجود نخواهد بود و در بازه $\left(\frac{\beta}{2}, \pi - \frac{\beta}{2}\right)$ این معادله فاقد جواب است.

(3) جهت تهیه جدولی برای یافتن بزرگترین مقدار ابتدا همه حدود یکطرفه تابع تحت بررسی را به ازاء $x \rightarrow \frac{\beta}{2} + 0$ و $x \rightarrow \pi - \frac{\beta}{2} - 0$ پیدا می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\beta}{2} + 0} \frac{b (\cos \beta - \cos 2x)}{2 \sin \beta \sin x} &= \frac{b (\cos \beta - \cos \beta)}{2 \sin \beta \sin \frac{\beta}{2}} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow \pi - \frac{\beta}{2} - 0} \frac{b (\cos \beta - \cos 2x)}{2 \sin \beta \sin x} &= \frac{b (\cos \beta - \cos (2\pi - \beta))}{2 \sin \beta \sin \left(\pi - \frac{\beta}{2}\right)} = 0. \end{aligned}$$

حال بدیهی بنظر می‌رسد که بزرگترین مقدار تابع $y(x)$ به ازاء $x = \frac{\pi}{2}$ حاصل می‌شود. این مقدار برابر


عبارت زیر است:

$$\frac{b}{2 \sin \beta} \cdot \frac{\cos \beta + 1}{1} = \frac{b \cdot 2 \cos^2 \frac{\beta}{2}}{4 \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2}} = \frac{b}{2} \cot \frac{\beta}{2}.$$

۵ • اگر $x = \frac{\pi}{2}$ باشد آنگاه $\angle ADB = 90^\circ$ خواهد بود. این امر بدین معنی است که در مثلث ABC نیمساز BD ارتفاع آن نیز بوده و از اینرو مثلث ABC متساوی الساقین است. بدین ترتیب از بین همه مثلث هایی با زاویه مقابل به قاعده و قاعده یکسان مثلثی دارای بزرگترین نیمساز زاویه مقابل به قاعده است که متساوی الساقین باشد.

روش دوم • در اینجا روش هندسی برای حل مسئله ارائه می دهیم که بطور چشمگیری از راه قبلی خلاصه تر و ظریف تر است.

بر مثلث ABC با نیمساز زاویه BD دایره ای را محیط می کنیم (شکل ۱۰۰). رئوس همه مثلث های باقیمانده با قاعده و زاویه مقابل به قاعده یکسان روی کمان ABC قرار دارد. مثلث متساوی الساقین AB_1C را اختیار کرده و نیمساز B_1D_1 را رسم می کنیم. ثابت می کنیم که $BD < B_1D$ است. نیمسازهای BD و B_1D_1 را امتداد می دهیم تا دایره را قطع کند. هر دو آنها دایره را در یک نقطه مانند M قطع می کنند که میانگاه کمان AC است. بدلیل اینکه B_1M قطر دایره است، $BM < B_1M$ را داریم. از مثلث DD_1M نتیجه می شود که $DM > D_1M$ است. از این نامساوی ها $DM < B_1M - D_1M$ و در نتیجه $BM - BD < B_1D_1$ استنتاج می شود.



شکل ۱۰۰

مسائل

۵۳۵ • ثابت کنید که در مثلث قائم الزاویه $1 - \sqrt{2} \leq \frac{r}{R}$ است. در این رابطه r شعاع دایره محاطی و R شعاع دایره محیطی مثلث است.

۵۳۶ • ثابت کنید در یک مثلث متساوی الساقین نسبت شعاعهای دایره های محاطی و محیطی از $\frac{1}{2}$ تجاوز نمی کند.

۵۳۷ • ثابت کنید در بین مثلث هایی که در آنها زاویه های مقابل به قاعده ها مساوی بوده و مجموع

اضلاع جانبی آنها مقدار ثابتی است، مثلثی دارای کوتاهترین قاعده است که متساوی الساقین باشد.
 ۵۳۸ • ثابت کنید در بین مثلث هایی که در آنها قاعده ها و زاویه های مقابل به قاعده ها مساوی هستند مثلثی دارای (a) بیشترین مساحت، (b) بیشترین محیط، است که متساوی الساقین باشد.

۵۳۹ • ثابت کنید در بین مثلث های متساوی الساقین محاط در یک دایره مثلثی دارای (a) بیشترین مساحت، (b) بیشترین محیط است که متساوی الاضلاع باشد.

۵۴۰ • نقطه A واقع بین دو خط موازی l_1 و l_2 بترتیب به فاصله های a و b از آنها قرار دارد. این نقطه رأس مثلث قائم الزاویه ABC است. نقطه B روی خط مستقیم l_2 و نقطه C روی خط مستقیم l_1 قرار دارد. ثابت کنید از بین همه چنین مثلث هایی مثلثی با اضلاع زاویه قائمه با طول های $a\sqrt{2}$ و $b\sqrt{2}$ کمترین مساحت را دارد.

۵۴۱ • مستطیلی را در داخل مثلثی محاط کرده ایم. ثابت کنید مساحت مستطیل از نصف مساحت مثلث بیشتر نیست.

۵۴۲ • در داخل مثلث معینی متوازی الاضلاع هایی را طوری محاط کرده ایم که با مثلث در یک زاویه مشترک هستند. ثابت کنید متوازی الاضلاعی دارای بیشترین مساحت است که رأس آن ضلع مقابل به زاویه مشترک را در مثلث نصف کند.

۵۴۳ • مساحت مثلث ABC برابر S، بوده و $\angle B = \beta$ است. حداقل مقدار کمیت های زیر را بیابید: (a) مجموع اضلاع AB و BC؛ (b) ضلع AC؛ (c) محیط مثلث.

۵۴۴ • از بین همه مثلث های متساوی الساقین که در آنها طول میانه های وارد بر ضلع جانبی مقدار یکسان است مثلثی را بیابید که دارای بیشترین مساحت باشد. اندازه زاویه مقابل به قاعده چنین مثلثی چقدر خواهد بود؟

۵۴۵ • در مثلث ABC با اضلاع a، b و c، اضلاع AB و AC را از رئوس B و C آنقدر امتداد می دهیم تا به این اضلاع به طول های AD و AE با شرط $BD + CE = AC$ تبدیل شوند. AD و AE را طوری پیدا کنید که پاره خط DE کوتاهترین طول را داشته باشد.

۵۴۶ • روی ضلع AC از مثلث ABC نقطه دلخواهی را اختیار کرده و از آن عمودهایی را بر اضلاع AB و BC رسم می کنیم. اگر $AB > BC$ باشد مقادیر مینیمم و ماگزیمم حاصل جمع طول این عمودها را بیابید.

۵۴۷ • در یک مثلث قائم الزاویه مستطیلی را محاط کنید که یک رأس آن با رأس قائمه مثلث مشترک بوده و قطر آن حداقل باشد.

۵۴۸ • مجسمه ای به طول 4 m روی ستونی به ارتفاع 5.6 m قرار گرفته است. یک ناظر در چه فاصله ای از ستون باید قرار گیرد تا مجسمه را با بزرگترین زاویه ممکن رؤیت کند؛ با این فرض که فاصله سطح زمین از سطح چشم ناظر معادل 1.6 m باشد؟

۵۴۹ • طول اضلاع جانبی و طول یکی از قاعده های دوزنقه ای برابر 15 cm است. برای به حداکثر رسیدن مساحت این دوزنقه قاعده دیگر آن چقدر باید باشد؟

۵۵۰ • دوزنقه قائم الزاویه ای با قاعده های a و b و ارتفاع h مفروض است. مستطیلی با بیشترین مساحت ممکنه از این دوزنقه جدا می‌کنیم. اگر $(a) b=60 \text{ cm}$ و $a=80 \text{ cm}$ و $h=100 \text{ cm}$ ، (b) $a=24 \text{ cm}$ و $b=8 \text{ cm}$ و $h=12 \text{ cm}$ باشد، مساحت این سطح را محاسبه کنید.

۵۵۱ • طول ضلع مربع $ABCD$ معادل 8 cm است. روی اضلاع AB و BC نقاط P و E را بترتیب با شرط $BP=BE=3 \text{ cm}$ اختیار می‌کنیم. روی اضلاع CD و AD نیز نقاط M و K را طوری اختیار می‌کنیم که دوزنقه $PEMK$ دارای بیشترین مساحت ممکنه باشد. بیشترین مقدار ممکنه برای مساحت دوزنقه چقدر است؟

۵۵۲ • در پنج ضلعی $ABCDE$ رئوس A, B, C, D, E قائمه بوده و $AE=b, AB=a, BC=c, DE=m$ است. اگر $(a) a=7 \text{ cm}, b=9 \text{ cm}, c=3 \text{ cm}, m=5 \text{ cm}$ و $(b) a=7 \text{ cm}, b=9 \text{ cm}, c=3 \text{ cm}, m=4 \text{ cm}$ باشد آنگاه در پنج ضلعی مفروض مستطیلی را محاط کنید که بیشترین مساحت را داشته باشد.

۵۵۳ • روی دایره ای دو نقطه A و B مفروض است. روی دایره نقطه C را طوری پیدا کنید که: (a) حاصلضرب $AC \cdot BC$ دارای بیشترین مقدار ممکنه باشد؛ (b) حاصلجمع $AC + BC$ به بیشترین مقدار ممکنه برسد.

۵۵۴ • (a) از بین همه قطعات هایی با محیط P قطاعی را بیابید که دارای بیشترین مساحت ممکنه باشد؛

(b) از بین همه قطعات هایی با مساحت S قطاعی را بیابید که دارای کمترین محیط ممکنه باشد.

۵۵۵ • مقطع عرضی تونلی از یک مستطیل و یک نیمدایره بر بالای آن تشکیل شده است. اگر محیط این مقطع برابر P باشد برای به حداکثر رسیدن مساحت مقطع، شعاع نیمدایره چقدر باید باشد؟

۵۵۶ • فاصله دو وتر AB در دایره ای به شعاع R از مرکز O برابر h است. در قسمت کوچکتری از دایره که توسط وتر AB جدا شده است مستطیلی را با حداکثر مساحت ممکنه محاط کنید.

۵۵۷ • در دایره ای به شعاع R دوزنقه ای محاط شده است. یکی از قاعده های این دوزنقه با قطر دایره مساوی است. حداکثر مساحت ممکنه برای چنین دوزنقه ای را پیدا کنید.

۵۵۸ • (a) ثابت کنید از بین همه مثلث هایی که در آنها زاویه حاده مقابل به قاعده و نیز خود قاعده مساوی است، مثلثی دارای بلندترین میانه وارد بر قاعده است که متساوی الساقین باشد.

(b) ثابت کنید که از بین همه مثلث هایی که در آنها زاویه منفرجه مقابل به قاعده و خود قاعده مساوی است مثلثی دارای کوتاهترین میانه وارد بر قاعده است که متساوی الساقین باشد.

۵۵۹ • خط مستقیم l را از تارک B مثلث ABC رسم می‌کنیم. از نقاط A و C عمودهایی بر این خط رسم می‌کنیم. ثابت کنید مجموع طول های این عمودها در صورتی به حداقل ممکنه می‌رسد که خط l

بر میانه BM مثلث ABC عمود باشد.

۵۶۰ ● (a) از بین همهٔ مثلث‌های متساوی‌الساقین با مساحت S مثلثی را بیابید که شعاع دایره محاطی به حداقل برسد. شعاع این دایره را محاسبه کنید. (b) بردایره‌ای به شعاع r مثلثی را با حداقل مساحت ممکنه محیط کنید. این مساحت را محاسبه کنید.

۵۶۱ ● طول ضلع مربع $ABCD$ برابر 6 cm است. روی اضلاع AD و AB نقاط K و P را طوری انتخاب می‌کنیم که $AK=3\text{ cm}$ و $AP=2\text{ cm}$ باشد. دوزنقه‌ای با قاعدهٔ KP را در این مربع محاط کنید. حداقل مساحت ممکنه برای این دوزنقه چقدر است؟

۵۶۲ ● وتر AB در دایره‌ای برابر شعاع آن است. وتر CD را موازی وتر AB طوری رسم می‌کنیم که دوزنقه $ABCD$ حداکثر مساحت ممکنه را دارا شود. اندازهٔ زاویه‌ای کمان کوچک مقابل به وتر CD را بیابید.

فصل دوم

هندسه فضایی

بخش ۸ • برش های چند وجهی ها

برش چند وجهی بوسیله صفحه، در اکثر مسائل هندسه فضایی بکار گرفته می شود. در بخش حاضر برخی از روشهای رسم برش ها را مورد بحث قرار خواهیم داد. برش هایی را مورد ملاحظه قرار می دهیم که بوسیله صفحات مار بزرگ نقطه و یک خط معین، و سه نقطه معین بوجود می آیند. همچنین برش هایی را مورد بررسی قرار می دهیم که دارای شرط توازی با یک صفحه معین، یک خط معین یا دو خط معین است. مثال هایی از رسم برش هایی که بر یک خط یا یک صفحه معین عمود است در بخش ۹ ارائه شده است. اشکال ۱۰۱ تا ۱۰۶ برش هایی از چهار وجهی و متوازی السطوح را نشان می دهند. در شکل ۱۰۱ برش از بریال AB و نقطه M واقع بریال CD رسم شده است؛ در شکل ۱۰۲ برش از رأس P و نقاط M و N واقع بریال های AB و BC عبور کرده است؛ در شکل ۱۰۳ برش از رأس C و نقاط M و N واقع بر وجه ACD و ACB گذشته است. در هر یک از این حالات رسم برش بر قضیه فرعی و ساده زیر از هندسه فضایی مبتنی است:

اگر دو صفحه در دو نقطه مشترک باشند آنگاه خط مستقیم مار بر این دو نقطه فصل مشترک صفحات مزبور خواهد بود.


به عنوان مثال در شکل ۱۰۳ نقاط $P=(CM) \cap [AD]$ و $Q=(CN) \cap [AB]$ به صفحه برش (مقطع) و وجه ADB متعلق بوده و از این رو پاره خط PQ یک ضلع برش محسوب می شود. شکل ۱۰۴ برشی از چهار وجهی را بوسیله صفحه ای نشان می دهد که از نقطه M واقع بریال AB به موازات وجه ACD عبور کرده است. رسم برش در این جا بر این نکته استوار است: اگر دو صفحه موازی را صفحه سومی قطع کند در آن صورت فصل مشترک های این صفحه با دو صفحه موازی، موازی خواهد بود. حال صفحه برش را با α نشان می دهیم. صفحه ABD صفحات موازی α و ACD را قطع کرده است. فصل مشترک صفحات ABD و ACD خط مستقیم AD بوده و این امر بدین معنی است که فصل مشترک صفحات

ABD و α با خط AD موازی است. از نقطه M خطی به موازات AD رأس کرده و به رأس P در نقطه تلاقی این خط و یال BD وصول می‌یابیم. پاره خط MP یک ضلع برش محسوب می‌شود. بطریق مشابه خط MN را بصورت $[AC] \parallel [MN]$ رسم می‌کنیم. پاره خط MP ضلع سوم برش بوده و $[DC] \parallel [PN]$ است. برش حاصل مثلث MNP است که متجانس مثلث ACD محسوب می‌شود. نسبت تجانس آنها عبارت از $|BM|/|BA|$ است. شکل ۱۰۵ برشی از متوازی السطوح را نشان می‌دهد که از عبور صفحه‌ای از نقطه M واقع بر یال CC_1 به موازات صفحه وجه $ABCD$ حاصل شده است. رسم این برش بر روش بکاررفته در مورد قبلی مبتنی است.


در اینجا $[MN] \parallel [BC]$ ، $[QM] \parallel [AB]$ ، $[PQ] \parallel [DA]$ ، $[NP] \parallel [CA]$ ، $[MN] \parallel [AC]$ است.

در همان حال، $[MN] \parallel [QP]$ است زیرا این پاره خط‌ها روی فصل مشترک‌های صفحات موازی AA_1B_1B و DD_1C_1C با صفحه برش قرار دارند. بطریق مشابه $[QM] \parallel [PN]$ است. برش حاصل متوازی الاضلاعی است که با وجه $ABCD$ برابر است. شکل ۱۰۶ برشی از متوازی السطوح را نشان می‌دهد که از صفحه ماز بر یال AA_1 و نقطه M واقع بر یال CD تشکیل شده است.


در اینجا $[AA_1] \parallel [MM_1]$ ، $[AM] \parallel [A_1M_1]$ است زیرا صفحات وجوهی که شامل این اضلاع برش هستند متوازی می‌باشند. برش حاصل نیز عبارت از متوازی الاضلاع AA_1M_1M است.



شکل ۱۰۴



شکل ۱۰۵



شکل ۱۰۶

مثال ۱ • طول یال مکعبی برابر a است (شکل ۱۰۷a). مساحت برشی از مکعب را پیدا کنید که از قطر AD_1 متعلق به وجه $AA_1D_1D_1$ و میانگاه یال BB_1 عبور می‌کند.

حل • صفحه برش را با α نشان می‌دهیم. پاره خط‌های AD_1 و AM هم به صفحه α و همه به دو وجه از مکعب تعلق دارند. از اینرو اضلاع برش محسوب می‌شوند. ضلع برش را در وجه BB_1C_1C رسم می‌کنیم.

صفحات AA_1D_1D و BB_1C_1C موازی بوده و بنابراین فصل مشترک صفحات α و BB_1C_1C با پاره خط AD_1 موازی خواهند بود. خطوط BC_1 و AD_1 موازی بوده و فصل مشترک نیز با BC_1 موازی خواهد بود. حال خط مستقیم M را از نقطه M در صفحه BB_1C_1C به موازات خط BC_1 رسم می‌کنیم. محل تلاقی آن با یال B_1C_1 رأس N را بوجود می‌آورد (شکل ۱۰۷b) را نگاه کنید). برش حاصل عبارت از دوزنقه $AMND_1$ است که در آن $[MN] \parallel [AD_1]$ است. حال اضلاع آن را پیدا می‌کنیم.

رابطه $|AD_1| = a\sqrt{2}$ را داریم. پاره خط MN ، میانخط مثلث BB_1C_1 بوده و از اینرو چنین داریم.

$$|MN| = \frac{1}{2} |BC_1| = \frac{2}{\sqrt{2}}$$


در مثلث‌های قائم‌الزاویه ABM و D_1C_1N ($|BM| = |NC_1| = a/2$) $|AB| = |C_1D_1| = a$ به $|AM| = |D_1N| = a\sqrt{5}/2$ وصول می‌یابیم.

از اینرو دوزنقه $AMND_1$ متساوی‌الساقین محسوب می‌شود. ارتفاع آن را بدست می‌آوریم (۱۰۷c). عمودهای PQ و MN را بر قاعده AD_1 رسم کرده و رابطه‌های زیر را بدست می‌آوریم.

$$|PQ| = |MN| = a/\sqrt{2}$$


$$|D_1Q| = |PA| = \frac{1}{2} (|DA| - |QP|) = a/2 \sqrt{2}.$$

در مثلث قائم‌الزاویه D_1QN ($|D_1Q| = a/2\sqrt{2}$ ، $|D_1N| = a\sqrt{5}/2$) به $|NQ| = a/2\sqrt{2}$ وصول می‌یابیم. مساحت برش بصورت $S = \frac{1}{2} (|MN| + |D_1A|) |NQ| = \frac{9}{8} a^2$ درمی‌آید. جواب مسئله عبارت از $9a^2/8$ خواهد بود.




شکل ۱۰۷

در شکل ۱۰۸ برشی از یک چهاروجهی دیده می‌شود. این برش بوسیله صفحه‌ای بوجود آمده است که از نقاط M ، N ، P و Q واقع بر یال‌های چندوجهی عبور می‌کند. نقاط M و N طوری انتخاب شده‌اند که خطوط MN و AC ناموازی هستند. پاره خط‌های MN و NP اضلاع برش هستند (شکل ۱۰۸a). نقطه P ، نقطه مشترک صفحات MNP و ABC است. نقطه مشترک دوم عبارت از نقطه تلاقی خط‌های MN و AC یعنی عبارت از $S = (MN) \cap (AC)$ است (شکل ۱۰۸b). خط SP فصل مشترک صفحات MNP و ABC است. نقطه تقاطع این خط و یال AB رأس Q برش یعنی $Q = (SP) \cap [AB]$ را بوجود می‌آورد. برش حاصل عبارت از چهارضلعی $MNPQ$ است.



شکل ۱۰۸

مثال ۲ • از میانگانه های یال های AB, AA_1, AD_1 (شکل ۱۰۹a) صفحه ای را عبور می دهیم. شکل برش حاصل را تعیین کنید. اگر طول یال مکعب برابر a باشد مساحت برش را محاسبه کنید.



شکل ۱۰۹

حل • صفحه برش را با a نشان می دهیم. پاره خط های MN و NP هم به صفحه α و هم به وجوهی از مکعب تعلق دارند. از اینرو اضلاع برش محسوب می شوند (شکل ۱۰۹a). نقاط S_1 و S_2 محل تلاقی پاره خط NP واقع در صفحه α و خط های AD_1 و DD_1 را رسم می کنیم (شکل ۱۰۹b). خط مستقیم S_1M فصل مشترک صفحات α و $ABCD$ است. نقاط تقاطع S_1M را با یال BC (نقطه S_3) در شکل (۱۰۹c) و با خط CD (نقطه S_4) پیدا می کنیم. نقاط S_2 و S_4 ، نقاط مشترک صفحات α و CC_1D_1D است. خط S_1S_4 فصل مشترک این صفحات است. حال نقاط تلاقی خطوط S_2S_4 با یال های CC_1 و C_1D_1 (نقاط S_5 و S_6) را پیدا می کنیم. برش مطروحه عبارت از شش ضلعی $S_1S_2S_3S_4S_5S_6$ است. توجه داشته باشید که اضلاع مقابل برش موازی هستند، زیرا آنها روی فصل مشترک های صفحه α با صفحات دو بدو موازی وجوه قرار دارند. حال ثابت می کنیم که رئوس $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$ برش میانگانه های یال ها هستند. پاره خط NP میان خط مثلث AA_1D_1 بوده و از اینرو $(NP) \parallel (AD_1)$ است (شکل ۱۱۰). بطریق مشابه $(MN) \parallel (BA_1)$ بوده و بدلیل $(CD_1) \parallel (BA_1)$ به $(CD_1) \parallel (MN)$ وصول می یابیم. بدین ترتیب صفحه α برش با صفحه AD_1C موازی خواهد بود. از اینرو نتیجه می شود که فصل مشترک های

این صفحات با یال های مکعب نیز موازی هستند؛ یعنی $[S_5S_6] \parallel [CD_1]$ ، $[S_3S_4] \parallel [AC]$ ، $[MS_3] \parallel [AC]$ است. به همین طریق ثابت می شود که $(MN) \parallel (BA_1)$ ، $(NP) \parallel (AD_1) \parallel (BC_1)$ ، $\alpha \parallel (BA_1C_1)$ است که از آن نیز $[C_1A_1] \parallel [BC_1]$ ، $[S_6P] \parallel [BC_1]$ ، $[S_3S_5]$ استنتاج می شود. حال $|BM| = |MA|$ را مورد ملاحظه قرار داده و قضیه تالس را سه بار مورد استفاده قرار دهید.



در نتیجه $|S_5C_1| = |S_5C_1| = |S_3C_1| = |S_3C_1| = |BS_3| = |S_6D_1|$ ، $|C_1S_6| = |S_6D_1|$ بدست می آید. این امر بدین معنی است که نقاط S_5 ، S_6 ، S_3 میانگام های یال ها هستند. از آنچه ثابت شد چنین برمی آید طول هر ضلع برش برابر $a/\sqrt{2}$ است. حال ثابت می کنیم که هریک از زوایای برش 120° است. با ملاحظه مثلث S_1MN به آسانی دریافت می شود که متساوی الاضلاع است. تساوی مثلث S_1AN و PA_1N (بر اساس تساوی یک ساق و یک زاویه حاده) موجب $|S_1A| = |PA_1| = a/2$ می شود. آنگاه داریم:

$$|S_1N| = \sqrt{|S_1A|^2 + |AN|^2} = a/\sqrt{2}$$


$$|S_1M| = \sqrt{|S_1A|^2 + |AM|^2} = a/\sqrt{2}$$

بمنظور کردن $|MN| = a/\sqrt{2}$ متوجه می شویم که مثلث S_1MN نیز متساوی الاضلاع بوده و در نتیجه $\angle S_1MN = \angle S_1NM = 60^\circ$ خواهد بود.

از این نکته نتیجه می شود که $\angle S_8MN = \angle MNP = 120^\circ$ است. بطریق مشابه با بررسی مثلث های S_6S_2P ، $S_3S_4S_5$ درمی یابیم که دیگر زوایای برش نیز برابر 120° هستند. بدین ترتیب نتیجه می گیریم که برش مطروحه، یک شش ضلعی منتظم است که طول هریک از اضلاع آن برابر $a/\sqrt{2}$ است. مساحت این برش برابر $a^2(3\sqrt{3}/4)$ خواهد بود.



شکل ۱۱۱



شکل ۱۱۰

شکل ۱۱۱ برشی از یک چهار وجهی را نشان می‌دهد. این برش با صفحه‌ای به موازات یال AC تشکیل شده است که از نقاط M واقع بر یال CD و N واقع بر وجه ABD عبور می‌کند. رسم این برش بر قضیه زیر استوار است:

اگر صفحه‌ای از یک خط مستقیم موازی صفحه دیگر عبور کرده و آن صفحه را قطع کند آنگاه فصل مشترک صفحات با خط مزبور موازی خواهد بود. صفحه برش را با α نشان می‌دهیم. صفحه ACD در نقطه M با صفحه α مشترک بوده و دارای خط AC است که با صفحه α موازی است. در نتیجه فصل مشترک این صفحات از نقطه M به موازات خط AC عبور می‌کند. ضلع MS_1 برش را براساس این نکته (شکل ۱۱۱b) یعنی براساس $[MS_1] \parallel [AC]$ رسم می‌کنیم.


با رسم خط S_1N ضلع دوم برش یعنی S_1S_2 را بدست می‌آوریم. در شکل ۱۱۱ نقطه N طوری قرار دارد که نقطه S_2 به یال AB متعلق است. صفحه ABC نیز محتوی خط AC به موازات صفحه برش است. بنابراین ضلع S_2S_3 برش موازی یال AC است (شکل ۱۱۱c). پاره خط S_3M ضلع چهارم برش است.

برش $S_3S_2S_1S_3$ یک ذوزنقه است که در آن

$([MS_1] \parallel [AC]) \parallel ([S_2S_3])$ است. براساس

موقعیت نقطه N نسبت به پاره خط BS_1 برش

می‌تواند یک مثلث نیز باشد (شکل ۱۱۲).



شکل ۱۱۲

مثال ۳ • برشی را در منشور مثلثی با عبور دادن صفحه‌ای از نقاط A_1 و C_1 (شکل ۱۱۳a) به موازات خط

BC_1 رسم می‌کنیم. یال AB بوسیله این صفحه به چه نسبتی تقسیم می‌شود.

حل • صفحه برش را با α نشان می‌دهیم. فصل مشترک صفحات α و BB_1C_1C از نقطه C_1 به موازات

خط BC_1 عبور می‌کند (شکل ۱۱۳b). نقطه تلاقی آن را با خط BB_1 با S_1 نشان می‌دهیم. نقطه S_1 ، بین

صفحات α و AA_1B_1B مشترک است. نقطه مشترک دیگر A_1 است که در فرض مسئله ارائه شده



است. با رسم خط A_1S_1 رأس S_2 برش حاصل می‌شود. برش مطروحه مثلث $A_1C_1S_2$ است. حال نسبت

$$\left| \frac{AS_2}{S_2B} \right| \text{ را تعیین می‌کنیم.}$$

از تشابه مثلث‌های A_1AS_2 و S_1BS_2 به $S_1BS_2 \sim A_1AS_2$ داریم $|AS_2|/|S_2B| = |AA_1|/|BS_1|$ وصول می‌یابیم.

چون S_1BC_1C یک متوازی الاضلاع است $([BC_1] \parallel [S_1C])$ ، $([BS_1] \parallel [C_1C])$ از اینرو داریم:

$|BS_1| = |C_1C|$ ، با منظور کردن $|C_1C| = |AA_1|$ به $|AS_2|/|S_2B| = 1/1$ دست می‌یابیم.



شکل ۱۱۳

(a)

مثال ۴ • نقطه M روی یال AB از یک چهار وجهی طوری قرار گرفته است که رابطه زیر را داریم:
 $|AM|/|AB| = \lambda$, $0 < \lambda < 1$ (شکل ۱۱۴a). از نقطه M به موازات یال های AD و BC صفحه ای عبور می دهیم. برش حاصل از عبور این صفحه را در چهار وجهی رسم کنید.

اگر $|AD|/|BC| = m$ باشد به ازاء چه مقدار λ برش حاصل یک لوزی خواهد بود؟

حل • صفحه برش را با α نشان می دهیم. فصل مشترک این صفحه و صفحه ABD با خط AD موازی است $(AD) \parallel \alpha$. خط MN را بصورت $[MN] \parallel [AD]$ رسم می کنیم (شکل ۱۱۴b). فصل مشترک های صفحات BCA و BCD با صفحه α موازی خط BC $(BC) \parallel \alpha$ هستند. خطوطی را بصورت $[MQ] \parallel [BC]$ و $[NP] \parallel [BC]$ رسم می کنیم. ضلع چهارم برش با یال AD موازی است.


برش مطروحه عبارت از متوازی الاضلاع $MNPQ$ $([MN] \parallel [AD] \parallel [PQ], [NP] \parallel [BC] \parallel [MQ])$

است. طول اضلاع متوازی الاضلاع $MNPQ$ را بر حسب طول یال های AD و BC بیان می کنیم.
 تشابه مثلث های AMO و ABC به $|MQ|/|BC| = |AM|/|AB| = \lambda$ منجر می شود که از آن نیز $|MQ| = \lambda |BC|$ بدست می آید.


حال درمی یابیم که $|BM| = |AB| - |AM| = (1 - \lambda) |AB|$ بوده و از تشابه مثلث های BAD و BMN نیز به

$|MN| = (1 - \lambda) |AD|$ یعنی $|MN|/|AD| = |BM|/|BA| = 1 - \lambda$ وصول می یابیم.

با جاگذاری عبارات حاصله در معادله $|MN| = |MQ|$ تساوی $|MN| = |MQ|$ $(1 - \lambda) |AD| = \lambda |BC|$ حاصل می شود. از این تساوی رابطه $\lambda = \frac{|AD|}{|BC| + |AD|} = \frac{m}{m + 1}$ بدست می آید. بنابراین برش مطروحه به ازاء $\lambda = m/(m + 1)$ لوزی خواهد بود.




شکل ۱۱۴




توجه • اگر یال های متقابل BC و AD از یک چهار وجهی متعامد باشند آنگاه اضلاع MN و MQ برش که موازی آنها هستند متعامد خواهند بود. در این حالت برش یک مستطیل بوده و به ازاء $\lambda = m/(m+1)$ مربع خواهد بود. بخصوص اگر چهار وجهی $ABCD$ منتظم باشد آنگاه برش مرسوم از میانگاه یال AB به موازات یال های BC و AD یک مربع خواهد بود. برای پیدا کردن برش چند وجهی در مثال های بالا در صفحات وجوه (یا فقط در خود وجوه) چند وجهی ترسیماتی را انجام دادیم. در برخی از مسائل برای یافتن برش ها لازم است که در خارج صفحات وجوه ترسیماتی را انجام دهیم. به عنوان مثال برشی از چهار وجهی $ABCD$ را مورد ملاحظه قرار می دهیم. این برش با صفحه MNP بوجود آمده است. همانطوریکه در شکل ۱۱۵a دیده می شود در این صفحه، M ، N ، P روی یال AD ، وجه BCD و وجه ABC از چهار وجهی با شرط $(ABC) \# (MN)$ قرار دارد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در اینجا برای هر یک از وجوه چند وجهی و صفحه برش MNP فقط یک نقطه مشترک شناخته شده است. برای رسم فصل مشترک های هر وجهی با صفحه MNP لازم است که یک نقطه مشترک دیگر بین آنها نیز یافته شود. صفحه ABC را مورد ملاحظه قرار می دهیم. نقطه F ، نقطه مشترک صفحات MNP و ABC است. نقطه مشترک دوم بین آنها عبارت از نقطه تقاطع خط MN و صفحه ABC است $((MN) \# (ABC))$. این نقطه را چگونه می توان رسم کرد؟ (شکل ۱۱۵b)؛ به عنوان مقایسه به شکل ۱۰۸b مراجعه کنید). جواب در شکل ۱۱۵c ارائه شده است. صفحه ای را از نقاط M و N و رأس D چند وجهی عبور داده و S_1 فصل مشترک آن را با ABC رسم می کنیم. S_1 نقطه مشترک خطوط MN و AS_1 دقیقاً نقطه تلاقی خط MN و صفحه ABC محسوب می شود. خط PS_1 فصل مشترک صفحات MNP و ABC است. رأس S_2 و S_3 (شکل ۱۱۶) به عنوان نقطه تلاقی خط PS_1 با یال های BC و AB یافته می شوند و تلاقی خط S_2S_3 و یال CD رأس S_4 را بوجود می آورد. برش مطروحه عبارت از چهار ضلعی $S_1S_2S_3S_4$ خواهد بود. شکل ۱۱۷a-c نشان می دهد که برش چند وجهی را چگونه با سه نقطه رسم کنیم: M در وجه ABC ، N در وجه BCD و P در وجه ACD $((MN) \# (ACD))$. برای یافتن نقطه تلاقی خط MN و صفحه ACD یک صفحه کمکی را از آن خط و رأس B چند وجهی عبور می دهیم (شکل ۱۱۷b). خط S_1S_2 فصل مشترک صفحه مزبور و صفحه ACD است.

نقطه $S_3 = (MN) \cap (S_1 S_2)$ نقطه تلاقی خط MN و صفحه ACD است. سایر عملیات (شکل ۱۱۷c) همچون حالت قبل انجام می‌شوند.

در دو مثال اخیر برای رسم نقطه تلاقی خط MN و صفحه وجه چند وجهی (وجه ABC در شکل ۱۱۵c، وجه ACD در شکل ۱۱۷c)، رسم صفحه کمکی از آن خط و یکی از رئوس چند وجهی (MDN) در شکل ۱۱۵c، (MBN) در شکل ۱۱۷b ضروری است. در هرم و بویژه در چند وجهی غالباً مناسب بنظر می‌رسد که صفحه کمکی را از خط مفروض و یک رأس عبور دهیم.



شکل ۱۱۵



شکل ۱۱۶

مثال ۵. برشی از متوازی السطوحی را رسم کنید که بوسیله صفحه ای ایجاد می‌شود که آن صفحه از میانگاه‌های M و N یال‌های AD و BB_1 و نقطه P ، محل تلاقی اقطار وجه $A_1 B_1 C_1 D_1$ عبور می‌کند (شکل ۱۱۸a).

این صفحه یال AB را به چه نسبتی تقسیم می‌کند. حل. رسم این برش در شکل (شکل ۱۱۸ — d) نشان داده شده است. صفحه برش را با α بصورت $\alpha = (MDN)$ نشان می‌دهیم. ابتدا نقطه تلاقی خط NP و صفحه $AA_1 D_1 D$ را بدست می‌آوریم. این خط روی صفحه $BB_1 D_1 D$ قرار دارد که صفحه $AA_1 D_1 D$ را روی خط DD_1 قطع می‌کند. نقطه S_1 محل تلاقی خطوط NP و DD_1 (شکل ۱۱۸b) نقطه مطلوب است. بطریق مشابه، S_2 ، نقطه تلاقی خط

NP و صفحه $ABCD$ یعنی $S_2 = (NP) \cap (DB)$ یافته می‌شود. صفحه α صفحه AA_1D_1D را در امتداد خط S_1M و صفحه $ABCD$ را در امتداد S_2M قطع می‌کند. حال دورأس برش را در اختیار داریم:

$$S_4 = (S_2M) \cap [AB] \text{ و } S_3 = (S_1M) \cap [D_1A_1] \quad (\text{شکل } ۱۱۸c).$$

نقطه $S_5 = (S_3P) \cap [B_1C_1]$ آخرین رأس برش است. توجه دارید که خطوط S_5N و S_2M خط BC را در همان نقطه $\alpha = (BC) \cap S_6$ قطع می‌کنند.

پنج ضلعی $MS_3S_5NS_4$ برش مطلوب است (شکل ۱۱۸d). اضلاع S_3S_5 و S_3S_4 و MS_4 و نیز اضلاع MS_3 و S_5N برش موازی هستند زیرا آنها روی وجوه موازی قرار دارند. حال نسبت $|AS_4|/|S_4B|$ را بدست می‌آوریم.

از تشابه مثلث های MAS_4 و S_6BS_4 (شکل ۱۱۸c) به $|AM|/|BS_6| = |AS_4|/|BS_4|$ دست می‌یابیم.


تساوی مثلث های BS_6N و B_1S_5N (نقطه N میانگاه یال BB_1 است) موجب $|BS_6| = |B_1S_5|$ می‌شود. از این گذشته نقطه P مرکز تقارن متوازی الاضلاع $A_1B_1C_1D_1$ است و در نتیجه $|B_1S_5| = |D_1S_3|$ خواهد بود. بدین ترتیب به $|BS_6| = |D_1S_3|$ وصول می‌یابیم.

با منظور کردن $|DM| = |AM|$ نیز $|AM| = |DM|/|D_1S_3|$ حاصل می‌شود. از تشابه مثلث های DS_1M و $D_1S_1S_3$ به $|DS_1|/|D_1S_1| = |DM|/|D_1S_3|$ وصول می‌یابیم.

(شکل ۱۱۸b) بر حسب تساوی یک ضلع و زوایای مجاور به آن موجب $|B_1N| = |D_1S_1|$ تشابه مثلث های S_1D_1P و NB_1P می‌شود.

با در نظر گرفتن $|D_1D| = \frac{1}{2} |B_1B| = \frac{1}{2} |B_1N|$ رابطه $|B_1N| = \frac{1}{2} |D_1D|$ و در نتیجه $|DS_1| = \frac{3}{2} |DD_1|$ بدست می‌آید. آنگاه بترتیب $|DS_1|/|D_1S_1| = 3/1$

، $|AS_4|/|BS_4| = |DM|/|D_1S_3| = 3/1$ را خواهیم داشت. بنابراین یال AB از طرف رأس A به نسبت 3:1 تقسیم می‌شود.



شکل ۱۱۸

مثال ۶ • نقاط M و N روی یال های AA_1 و CC_1 از متوازی السطوحی طوری قرار دارد که $|AM|/|AA_1| = m$ است (شکل ۱۱۹ a). برشی از متوازی السطوحی را رسم کنید که با صفحه مار بر نقاط M و N به موازات قطر BD قاعده حاصل می شود. این صفحه یال BB_1 را به چه نسبتی قطع می کند؟

حل • قبلاً مثال هایی را در مورد رسم برشی به موازات خط معینی مورد ملاحظه قرار داده ایم (اشکال ۱۱۱ - ۱۱۳). مثال حاضر از این جهت با مثال های قبلی متفاوت است که هیچیک از نقاط M و N برش، در روی صفحه $ABCD$ محتوی خط BD به موازات برش، قرار ندارند. اضلاع برش که از رئوس M و N ناشی می شوند با خط BD موازی نیستند زیرا این خط وجوه محتوی اضلاع مزبور را قطع می کند.

صفحه برش را با α نشان می دهیم. خط BD در صفحه BB_1D_1D (شکل ۱۱۹ b) قرار دارد. در نتیجه صفحات α و BB_1D_1D در امتداد خط موازی با BD همدیگر را قطع می کنند. نقطه تلاقی خط MN در صفحه α را با صفحه BB_1D_1D رسم می کنیم. صفحه AA_1C_1C محتوی خط MN صفحه BB_1D_1D را در امتداد خط OO_1 قطع می کند که موازی یال های جانبی متوازی السطوح است. E ، نقطه مشترک خط MN و OO_1 دقیقاً عبارت از نقطه اشتراک خط MN و صفحه BB_1D_1D است. حال خطی به موازات خط BD از نقطه E در صفحه BB_1D_1D رسم کرده و نقاط تلاقی P و Q را بترتیب با یال های BB_1 و DD_1 پیدا می کنیم (شکل ۱۱۹ c).


خط PQ فصل مشترک صفحات α و BB_1D_1D بوده و در نتیجه نقاط P و Q رئوس برش خواهند بود. این برش عبارت از متوازی الاضلاع BB_1D_1D است که در آن $[PN] \parallel [MQ]$ و $[QN] \parallel [MP]$ می باشد. حال نسبت $|BP|/|PB_1|$ را بدست می آوریم.

بدلیل اینکه $BOEP$ متوازی الاضلاع است و OE میانخط دوزنقه $AMNC$ است رابطه $|BP| = |OE|$ را داریم و از آن نیز چنین داریم: $|OE| = \frac{1}{2} (|AM| + |CN|)$

با منظور کردن $|AA_1| = |CC_1| = |BB_1|$ و $|CN| = n$ ، $|AM| = m$ ، $|BP| = |OE| = \frac{m+n}{2} |BB_1|$ ، $|BP|/|PB_1| = \frac{m+n}{2-m-n}$ نتیجه می شود که:


بنابراین یال BB_1 از طرف رأس B به نسبت $\frac{m+n}{2-m-n}$ تقسیم می شود.

توجه • در مثال ۶ هر صفحه دیگری مثل صفحه $ABCD$ را می توانیم بجای صفحه BB_1D_1D اختیار کنیم. رسم های متناظر به آن در شکل ۱۲۰ نشان داده شده است



شکل ۱۱۹

$$(S_1 = (MN) \cap (AC), (S_2 S_3) \parallel (BD)).$$



شکل ۱۲۰

مثال ۷ • روی قطر AB_1 از وجه ABB_1A_1 منشور مثلث القاعده (شکل ۱۲۱a) نقطه M طوری قرار گرفته است که $|AM|/|MB_1| = 5/4$ را داریم. برشی از منشور را رسم کنید که با صفحه ماربر نقطه M به موازات اقطار A_1C و از وجه دیگر بوجود آمده است. یال CC_1 با این صفحه به چه نسبتی تقسیم می شود؟

حل • در مثال ۴ مسئله ای را مورد ملاحظه قرار دادیم که رسم برشی را توضیح می داد که از نقطه معینی به موازات دو خط معین دیگر رسم شده بود. مسئله حاضر با مسئله ۴ در این نکته تفاوت دارد که هیچیک از خطوط A_1C و BC_1 موازی برش روی صفحه وجه ABB_1A_1 که محتوی نقطه M برش است قرار ندارند. هر دوی این خطوط صفحه ABB_1A_1 را قطع می کنند. بنابراین همچون مثال ۴ بلافاصله نمی توانیم به رسم برش از نقطه M اقدام کنیم. در چنین مواردی غالباً مناسب بنظر می رسد که با رسم برش کمکی به موازات خطوط مفروض اقدام شود. صفحه ای از خط مستقیم A_1C به موازات خط BC_1 رسم می کنیم (شکل ۱۲۱b)، $(C_1B) \parallel (CS_1)$ ، به مسئله ۳ نگاه کنید، شکل ۱۱۳). مثلث A_1S_2C برشی از منشور است که بوسیله صفحه مزبور بوجود آمده است. صفحه برش مطلوب را با α نشان می دهیم. این صفحه موازی فصل مشترک های A_1C و CS_1 از صفحه A_1CS_1 بوده و بنابراین $(A_1CS_1) \parallel \alpha$ خواهد بود. از اینرو نتیجه می شود که اضلاع برش مطلوب با اضلاع برش A_1S_2C که بر روی یک وجه یا وجوه موازی قرار دارند موازی است. حال می توان برش مطلوب را رسم کرد. خط مستقیمی را از نقطه M به موازات خط A_1S_2 رسم کرده و نقاط تلاقی آن با یال های یعنی نقاط S_3 و S_4 را پیدا می کنیم (شکل ۱۲۱c). سپس اضلاع $[S_2C] \parallel [S_4S_5]$ و $[BC_1] \parallel [S_3S_6]$ (بدلیل $[BC_1] \parallel [CS_1]$) و $[CA_1] \parallel [S_6S_7]$ را رسم می کنیم.

پنج ضلعی $S_3S_4S_5S_6S_7$ برش مطلوب است. (توجه دارید که $[S_3S_7] \parallel [S_4S_5]$ است). حال نسبت $|CS_6|/|S_6C_1|$ را محاسبه می کنیم. وجه AA_1B_1B را مورد ملاحظه قرار می دهیم.

از تشابه مثلث های AS_4M و B_1S_3M رابطه $|B_1S_3M|/|AS_4M| = |AM|/|B_1M| = 5/4$ را داریم.

عبارت $|AB|/|S_2S_4| = x$ را منظور می کنیم. همچنین با در نظر گرفتن $|AS_2| = \frac{1}{2}|AB|$ ،

$$|AS_4| = \left(\frac{1}{2} + x\right)|AB| \quad \text{به} \quad |A_1B_1| = |AB| \quad \text{و} \quad |A_1S_3| = |S_2S_4|$$

که از آن نیز $x = 1/3$ بدست می آید. معادله $(\frac{1}{2} + x) / (1 - x) = 5/4$ وصول می یابیم. $|B_1S_3| = (1 - x) |AB|$ بدست می آید.


این امر به معنی $|S_2S_4| = \frac{1}{3} |AB|$ است که از آن رابطه زیر استنتاج می شود.

$$|S_4B| = |S_2B| - |S_2S_4| = \frac{1}{6} |AB|$$


بدلیل $|S_2C| \parallel |S_4S_5|$ رابطه $|S_2S_4| / |S_4B| = |CS_5| / |S_5B| = 2$ را داریم و با توجه به

$|BC_1| \parallel |S_5S_6|$ رابطه $|S_5S_6| / |S_6C_1| = |CS_5| / |S_5B| = 2$ استنتاج می شود. بنابراین یال


CC_1 از طرف رأس C به نسبت $2/1$ تقسیم می شود.



(a)



(b)



(c)

شکل ۱۲۱

مثال ۸. نقاط M و N روی اقطار AB_1 و BC_1 از وجه مکعب $ABCDA_1B_1C_1D_1$ طوری قرار گرفته اند که پاره خط MN موازی وجه $ABCD$ است.

نسبت های $|AM| / |AB_1|$ و $|BN| / |BC_1|$ را با شرط $|MN| / |AB| = \sqrt{5}/3$ بدست آورید.

حل. طبق فرض $(MN) \parallel (ABCD)$ را در نظر بگیرید. خط مستقیم S_1S_2 از نقطه M واقع بر وجه

AA_1B_1B (شکل ۱۲۲) به موازات AB رسم می کنیم. صفحه ای را که خطوط MN و S_1S_2 تعریف

می کنند با صفحه $ABCD$ موازی است. برشی از مکعب که توسط مربع $S_1S_2S_3S_4$ ایجاد شده است با

وجه $ABCD$ برابر است. عبارات $|AB| = a$ ، $|AM| / |AB_1| = x$ را در نظر می گیریم. از

تشابه مثلث های AB_1B و MB_1S_2 تساوی $|B_1S_2| / |B_1B| = |MS_2| / |AB| = |MB_1| / |AB_1|$

بدست می آید. با منظور کردن $|AB_1| = (1 - x) |AB|$ به روابط زیر وصول می یابیم:

$$|MS_2| = (1 - x) |AB| = (1 - x) a, \quad |B_1S_2| = (1 - x) |BB_1|,$$

$$|BS_2| = |BB_1| - |B_1S_2| = x |BB_1|$$

تشابه مثلث های BS_2N و BB_1C_1 رابطه

$$|S_2N| / |B_1C_1| = |BN| / |BC_1| = |BS_2| / |BB_1| = x$$

را موجب شده و از اینرو $|S_2N| = xa$ و $|AM| / |AB_1| = |BN| / |BC_1|$ استنتاج


می شود.

در مثلث قائم الزاویه MS_2N روابط $|MS_2| = (1-x)a$ ، $|S_2M| = xa$ ، $|MN| = \frac{\sqrt{5}}{3}a$ را داریم. در نتیجه طبق قضیه فیثاغورس رابطه زیر حاصل می‌شود.


$$\frac{5}{9}a^2 = (1-x)^2a^2 + x^2a^2, \quad 9x^2 - 9x + 2 = 0$$

ریشه‌های این معادله عبارت از $x_1 = 2/3$ و $x_2 = 1/3$ است. بدین ترتیب برای خط MN دو موقعیت وجود دارد که در شرط مسئله صدق می‌کند. شکل ۱۲۲ موقعیت اول و شکل ۱۲۳ موقعیت دوم را نشان می‌دهد. جواب مسئله بصورت زیر خواهد بود.

$$|AM|/|AB_1| = |BN|/|BC_1| = 2/3 \quad \text{یا} \quad |AM|/|AB_1| = |BN|/|BC_1| = 1/3.$$



شکل ۱۲۳



شکل ۱۲۲

توجه • در حل مسائلی که از خط MN به موازی $ABCD$ صفحه‌ای رسم می‌شود حکم زیر برقرار است:
 قضیه • از یک خط مستقیم که موازی صفحه معینی است موازی آن صفحه عبور داد و این صفحه تکین است.


اثبات: برای اثبات قضیه از نقطه‌ای واقع بر روی خط مفروض خط دیگری را به موازات صفحه مفروض تعریف می‌کنند. منحصر بفرود بودن این صفحه از این نکته استنتاج می‌شود که از یک نقطه فقط یک صفحه می‌توان به موازات صفحه معینی رسم کرد.

مثال ۹ • نقاط M و N میانگاه‌های یال‌های AD و BB_1 از یک متوازی‌السطوح هستند (شکل a ۱۲۴). در این متوازی‌السطوح $|MN| = a$ بوده و اقطار وجه $A_1B_1C_1D_1$ در نقطه P همدیگر را قطع می‌کنند. خط موازی بر نقطه P به موازات خط MN صفحه AA_1D_1D را در نقطه Q قطع می‌کند. طول پاره خط PQ را محاسبه کنید.


حل • برای حل این مسئله برشی از متوازی‌السطوح را که بوسیله صفحه MNP ایجاد می‌شود می‌توان مورد استفاده قرار داد. یعنی فصل مشترک صفحات MNP و AA_1D_1D را رسم کرده و نقطه Q را روی آن پیدا می‌کنیم (ترسیمات در شکل b ۱۲۴ نشان داده شده است). در مورد این مسئله از دو قضیه ساده زیر استفاده می‌کنیم:

- (۱) قطعاتی از دو خط موازی واقع بین دو صفحه موازی دارای طول‌های متفاوت هستند.
- (۲) اگر دو خط متقاطع در نقطه O با دو صفحه به ترتیب در نقاط A و B ، A_1 و B_1 محدود شده باشند آنگاه


خواهد بود. برهان این قضایا را می توان بر اساس اشکال ۱۲۵ و ۱۲۶ به آسانی انجام داد. حال به حل مسئله می پردازیم. نقطه R را نقطه تلاقی پاره خط PQ و صفحه BB_1C_1C در نظر می گیریم. برطبق قضیه اول طول پاره خط های موازی QR و MN واقع بین صفحات موازی AA_1D_1D و BB_1C_1C مساوی است. یعنی $|QR| = |MN| = a$ است. پاره خط های QR و D_1B_1 واقع در بین همان دو صفحه در نقطه P با شرط $|D_1P|/|PB_1| = 1$ همدیگر را قطع می کنند. آنگاه طبق قضیه دوم $|QP|/|PR| = 1$ یعنی $|QP| = |PR| = a/2$ را خواهیم داشت و جواب مسئله عبارت از $a/2$ خواهد بود.




شکل ۱۲۵




شکل ۱۲۴



شکل ۱۲۶



توجه • حال علاوه بر قضایای (1) و (2) قضیه دیگری را ذیلاً صورتبندی می کنیم: اگر خطوط a و b بوسیله سه صفحه موازی بترتیب در نقاط A_1, A_2, A_3 و B_1, B_2, B_3 قطع شوند آنگاه $|A_1A_2|/|A_2A_3| = |B_1B_2|/|B_2B_3|$ خواهد بود.



شکل ۱۲۷


این قضیه را بر اساس شکل ۱۲۷ می توان اثبات کرد. خطوط a و b می توانند موازی، متقاطع یا مورب باشند. با استفاده از این گزاره می توان بلافاصله در مثال ۸ ادعا کرد که $|BN|/|BC_1| = |AM|/|AB_1|$ است (شکل ۱۲۲).

بخش ۹ • استفاده از ضوابط همخطی و همصفحگی بردارها در حل مسائل

ضوابط همخطی و همصفحگی بردارها اساس کاربرد جبر برداری را در حل مسائل هندسه فضایی

تشکیل می‌دهد. این ضوابط بیان گزاره‌های گوناگون مربوط به وضعیت نقاط، خطوط و صفحات را در فضا بصورت تساوی‌های برداری ممکن می‌سازد.

۱° در مورد سه نقطه متمایز A, B, C که روی یک خط مستقیم قرار دارند لازم و کافی است که بردارهای \vec{AB} و \vec{AC} همخط باشند. یعنی بایستی عددی مانند λ وجود داشته باشد که در $\vec{AC} = \lambda \vec{AB}$ صدق کند. برهان این حکم مستقیماً از تعریف بردارهای همخط و ناشی شدن بردارهای \vec{AB} و \vec{AC} از نقطه A استنتاج می‌شود (شکل ۱۲۸).



شکل ۱۲۸

مثال ۱° در یک متوازی‌السطوح (شکل ۱۲۹) از M میانگاه یال BC خطی را طوری رسم می‌کنیم که خطوط AC_1 و DD_1 را بترتیب در نقاط N و P قطع کنند. نسبت $|MN|/|NP|$ را بدست آورید.

حل • جهت اختصار سه بردار نا هم‌صفحه $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA}_1$ را بترتیب با $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ نشان داده و بردارهای دیگر را برحسب این بردارها حل می‌کنیم. نقطه N روی خط AC_1 قرار دارد. بنابراین بردار \vec{NA} با بردار ناصفر \vec{AC}_1 همخط بوده و $\vec{NA} = x \vec{AC}_1$ را خواهیم داشت.

در مورد بردار \vec{AC}_1 تساوی $\vec{AC}_1 = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ را داریم که به معنی $\vec{NA} = x(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$ است. بردار \vec{NM} عبارت از مجموع بردارهای $\vec{NA}, \vec{AB}, \vec{BM}$ است: $\vec{NM} = \vec{NA} + \vec{AB} + \vec{BM}$ با جاگذاری معادل بردار \vec{NA} در این تساوی و با یادآوری:

$$\vec{AB} = \mathbf{a}, \quad \vec{BM} = \frac{1}{2} \vec{BC} = \frac{1}{2} \vec{AD} = \frac{1}{2} \mathbf{b}$$

چنین حاصل می‌شود:

$$\vec{NM} = (1 + x) \mathbf{a} + \left(\frac{1}{2} + x\right) \mathbf{b} + x \mathbf{c}$$

بردارهای \vec{DD}_1 و \vec{DP} همخط بوده و $\vec{DD}_1 = \mathbf{c}$ است. بنابراین $\vec{DP} = y \mathbf{c}$ خواهد بود.

از $\vec{NP} = \vec{NA} + \vec{AD} + \vec{DP}$ چنین استنتاج می‌شود:

$$\vec{NP} = x \mathbf{a} + (1 + x) \mathbf{b} + (x + y) \mathbf{c}$$

طبق حکم ۱° که فوقاً صورت‌بندی شده است برای نقاط P, N, M که روی یک خط قرار دارند لازم و

کافی است که تساوی برداری زیر برقرار باشد:

$$\vec{NM} = \lambda \vec{NP}$$

با جاگذاری معادل بردارهای \vec{NM} و \vec{NP} در این رابطه چنین حاصل می‌شود:


$$(1+x)\mathbf{a} + \left(\frac{1}{2}+x\right)\mathbf{b} + x\mathbf{c} = \lambda x\mathbf{a} + \lambda(1+x)\mathbf{b} + \lambda(x+y)\mathbf{c}$$

با توجه به منفرد بودن تجزیه بردار، این تساوی برداری با دستگاه مشتمل بر سه معادله اسکالر زیر هم ارز

$$\begin{cases} 1+x = \lambda x, \\ \frac{1}{2}+x = \lambda(1+x) \\ x = \lambda(x+y) \end{cases} \quad \text{است:}$$


با حل این دستگاه $\lambda = -1/2$, $x = -2/3$, $y = 2$ بدست می‌آید.

بدین ترتیب $\vec{NM} = -\frac{1}{2}\vec{NP}$ را داریم که از آن نیز $|\vec{NM}| = \frac{1}{2}|\vec{NP}|$ بدست می‌آید بنابراین جواب مسئله عبارت از 1 : 2 خواهد بود.



شکل ۱۲۹

۲۰ • فرض کنید که A_1 و A_2 نقاط متمایزی از خط a و B_1 و B_2 نیز نقاط متمایزی از خط b باشد. برای توازی خطوط a و b لازم و کافی است که بردارهای $\vec{A_1A_2}$ و $\vec{B_1B_2}$ همخط باشند. یعنی بایستی عددی مانند λ موجود باشد که در $\vec{B_1B_2} = \lambda\vec{A_1A_2}$ صدق کند. برهان این حکم از تعریف بردارهای همخط و قرار گرفتن پاره خط A_1A_2 روی خط a و پاره خط B_1B_2 روی خط b مستقیماً استنتاج می‌شود



شکل ۱۳۰

(شکل ۱۳۰).

مثال ۲ • در متوازی السطوح $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ خطوط AC و DC_1 اقطار وجوه آن هستند. ثابت کنید که زوج نقطه‌ای بصورت $M \in (AC)$ و $N \in (DC_1)$ وجود دارد که در $(BD_1) \parallel (MN)$ صدق کرده و این زوج منحصر بفرد است. نسبت $|MN|/|BD_1|$ را بیابید.

حل • فرض کنید که M نقطه‌ای روی خط AC و N نقطه‌ای روی خط C_1D است (شکل ۱۳۱). طبق حکم ۲۰ برای توازی خطوط MN و BD_1 لازم و کافی است که عددی مانند λ وجود داشته باشد که در $\vec{MN} = \lambda\vec{BD_1}$ (۱) صدق کند.

بردارهای \vec{MN} و $\vec{BD_1}$ را در امتداد بردارهای \vec{CD} , \vec{CB} , $\vec{CC_1}$ تجزیه می‌کنیم. این بردارها را بترتیب

با \mathbf{a} ، \mathbf{b} و \mathbf{c} نشان می‌دهیم. تساوی $\vec{BD}_1 = \vec{BC} + \vec{CC}_1 + \vec{C_1D_1}$ را داریم.

در اینجا $\vec{BD}_1 = \mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}$ بوده و از اینرو $\vec{BC} = -\vec{CB} = -\mathbf{b}$ ، $\vec{C_1D_1} = \vec{CD} = \mathbf{a}$ را

داریم. بردار \vec{MN} را بصورت مجموع $\vec{MN} = \vec{MC} + \vec{CC_1} + \vec{C_1N}$ نشان می‌دهیم. در اینجا بردار

\vec{MC} با بردار \vec{CA} همخط بوده و بنابراین $\vec{MC} = x\vec{CA}$ خواهد بود. ولی $\vec{CA} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ را داریم

که به معنی $\vec{MC} = x\mathbf{a} + x\mathbf{b}$ است. بردار $\vec{C_1N}$ با بردار $\vec{C_1D}$ همخط بوده و $\vec{C_1D} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$ است.

در نتیجه $\vec{C_1N} = y\vec{C_1D} = y\mathbf{a} - y\mathbf{c}$ خواهد بود. از اینرو تساوی زیر حاصل می‌شود:

$$(3) \quad \vec{MN} = (x + y)\mathbf{a} + x\mathbf{b} + (1 - y)\mathbf{c}$$

با جاگذاری تجزیه‌های برداری (2) و (3) در رابطه (1) چنین حاصل می‌شود:

$$(x + y)\mathbf{a} + x\mathbf{b} + (1 - y)\mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b} + \lambda\mathbf{c}$$

این تساوی برداری با دستگاه زیر هم ارز است:

$$\begin{cases} x + y = \lambda \\ x = -\lambda \\ 1 - y = \lambda \end{cases}$$

با حل این دستگاه $\lambda = 1/3$ ، $x = -1/3$ ، $y = 2/3$ بدست می‌آید. این امر بدین معنی است

که نقاط M و N در موقعیتی قرار دارند که برحسب آن $(BD_1) \parallel (MN)$ بوده و این موقعیت منحصر بفرد


است. براساس مقادیر x و y چنین حاصل می‌شود:

$$\vec{CM} = -x\vec{CA} = \frac{1}{3}\vec{CA}, \quad \vec{C_1N} = \frac{2}{3}\vec{C_1D}$$

در این حالت $\vec{MN} = \vec{BD}_1/3$ بوده و از اینرو

$$|MN| = |BD_1|/3$$

بنابراین جواب مسئله عبارت از $1/3$ خواهد بود.



شکل ۱۳۱

در دو مثال قبل از یک تساوی برداری که مفهوم مسئله را توضیح می‌دهد به دستگاه معادلات اسکالر هم ارز

با آن وصول یافتیم و آن دستگاه را حل کردیم. بایستی تاکید کرد که یک تساوی برداری درست

هم ارز با یک مجموعه از معادلات است. حتی اگر یافتن یک مجهول (λ در مثال مورد ملاحظه)

مطلوب باشد نباید جستجوی خود را فقط به آن یک مجهول محدود کنیم. باید وجود جواب برای دستگاه


حاصله را بررسی کنیم. ممکن است برای مجهول مزبور مقداری یافته شود ولی دستگاه در نتیجه خود

مسئله فاقد جواب باشد.

3° در مورد نقاط تمایز A ، B ، C و D که روی یک خط مستقیم قرار دارند لازم و کافی است که

بردارهای \vec{AD} ، \vec{AC} ، \vec{AB} همصفحه باشند. یعنی بایستی اعدادی مانند α و β وجود داشته باشند
 بطوریکه: $\vec{AD} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$

برهان این قضیه از تعریف همصفحه بودن بردارها و از ناشی شدن بردارهای \vec{AB} ، \vec{AC} و \vec{AD} (و در نتیجه بردارهای $\beta\vec{AC}$ و $\alpha\vec{AB}$) از نقطه A استنتاج می شود (شکل ۱۳۲).



شکل ۱۳۲

مثال ۳. از انتهای سه یال یک متوازی السطوح که از یک رأس مشترک ناشی می شوند صفحه ای را عبور می دهیم. این صفحه قطر متوازی السطوح را که از همان رأس ناشی می شود به چه نسبتی قطع می کند؟

حل. رأس مفروض در مسئله را با A نشان داده و رئوس دیگر متوازی السطوح را همچون شکل نامگذاری می کنیم (شکل ۱۳۳). M را نقطه ای روی خط AC_1 در نظر می گیریم. برای اینکه نقاط A_1 ، D ، B و M روی یک صفحه قرار بگیرند لازم و کافی است که بردارهای $\vec{A_1D}$ ، $\vec{A_1B}$ و $\vec{A_1M}$ همصفحه باشند، یعنی بایستی اعدادی مانند α و β وجود داشته باشند بطوریکه: $\vec{A_1M} = \alpha\vec{A_1B} + \beta\vec{A_1D}$ (4)

عبارات $\vec{AB} = \mathbf{a}$ ، $\vec{AD} = \mathbf{b}$ ، $\vec{AA_1} = \mathbf{c}$ را در نظر گرفته و بردارهای (4) را برحسب این سه بردار تجزیه می کنیم. چنین داریم: $\vec{A_1B} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$ ، $\vec{A_1D} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$

همچنین $\vec{A_1M} = \vec{A_1A} + \vec{AM}$ را داریم. در اینجا $\vec{A_1A} = -\mathbf{c}$ بوده و بردار \vec{AM} با بردار $\vec{AC_1}$ همخط است، یعنی: $\vec{AM} = x\vec{AC_1} = x(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$


این امر به معنی $\vec{A_1M} = x\mathbf{a} + x\mathbf{b} + (x-1)\mathbf{c}$ است. با جاگذاری تجزیه برداری حاصله در (4) به تساوی $x\mathbf{a} + x\mathbf{b} + (x-1)\mathbf{c} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} - (\alpha + \beta)\mathbf{c}$ دست می یابیم که از آن نیز دستگاه زیر حاصل می شود:

$$\begin{cases} x = \alpha, \\ x = \beta, \\ x - 1 = -\alpha - \beta \end{cases}$$

با حل این دستگاه $x = 1/3$ ، $\alpha = 1/3$ ، $\beta = 1/3$ بدست می آید. بدین ترتیب $\vec{AM} = \vec{AC_1}/3$

را داریم؛ یعنی صفحه BDA_1 یک سوم قطر AC_1 را از طرف رأس A قطع می کند. از اینر و نتیجه می شود که

$$|AM|/|MC_1| = 1/2$$



شکل ۱۳۳

بوده و جواب مسئله عبارت از $1/2$ خواهد بود.

معادله (4) همچنین موجب $\vec{A_1M} = \frac{1}{3}(\vec{A_1B} + \vec{A_1D})$ شده و این امر حکایت از آن دارد که M ، نقطه تلاقی میانه های مثلث BA_1D است. به عبارت دیگر قطر AC مثلث BA_1D را در نقطه تلاقی میانه های آن قطع می کند.

4° a و b را خطوط مستقیم متمایزی در نظر بگیرید. با شرط $A_1 \neq A_2$ ، A_1 و A_2 نقاطی از خط a هستند. با شرط $B_1 \neq B_2$ نیز B_1 و B_2 نقاطی از خط b محسوب می شوند. برای متقاطع بودن خطوط a و b لازم و کافی است که بردارهای $\vec{A_1B_1}$ ، $\vec{A_1A_2}$ ، $\vec{B_1B_2}$ هم صفحه باشند؛ یعنی بایستی اعدادی مانند α و β وجود داشته باشند بطوریکه:

$$\vec{A_1B_1} = \alpha \vec{A_1A_2} + \beta \vec{B_1B_2}$$

اثبات • ضرورت: اگر خطوط a و b متقاطع باشند آنگاه نقاط A_1 ، A_2 ، B_1 و B_2 روی یک صفحه واقع بوده و در نتیجه بردارهای $\vec{A_1B_1}$ ، $\vec{A_1A_2}$ و $\vec{B_1B_2}$ هم صفحه خواهند بود.

کفایت • تساوی $\vec{A_1B_1} = \alpha \vec{A_1A_2} + \beta \vec{B_1B_2}$ را در نظر بگیرید. بردار $\vec{A_1M} = \alpha \vec{A_1A_2}$ را از طرف نقطه A_1 جدا می کنیم. نقطه M سر این بردار به خط a تعلق دارد. حال بردار $\vec{B_1N} = -\beta \vec{B_1B_2}$ را از طرف نقطه B_1 جدا می کنیم. نقطه N سر این بردار به خط b متعلق است.

از تساوی برداری $\vec{MN} = \vec{MA_1} + \vec{A_1B_1} + \vec{B_1N}$ بایان طرف راست آن بر حسب بردارهای $\vec{A_1A_2}$ و $\vec{B_1B_2}$ چنین حاصل می شود: $\vec{MN} = -\alpha \vec{A_1A_2} + \alpha \vec{A_1A_2} + \beta \vec{B_1B_2} - \beta \vec{B_1B_2} = 0$. از تعریف بردار صفر نتیجه می شود که نقاط M و N بر هم منطبق هستند؛ یعنی خطوط a و b متقاطع می باشند.

مثال 4: نقاط M و N میانگه یال هایی از یک چهاروجهی (شکل ۱۳۴) بوده و نقاط P و Q روی یال های AD و BC طوری قرار گرفته اند که پاره خط های MN و PQ متقاطع بوده داریم:

$$|AP|/|AD| = 2/3$$

نسبت $|BQ|/|BC|$ را پیدا کنید.

حل • برای متقاطع بودن خطوط MN و PQ لازم و کافی است که اعدادی مانند α و β وجود داشته باشند بطوریکه: (5) $\vec{MP} = \alpha \vec{MN} + \beta \vec{PQ}$

بردارهای \vec{MN} ، \vec{PQ} و \vec{MP} را بر حسب بردارهای $\vec{AC} = \mathbf{b}$ ، $\vec{AB} = \mathbf{a}$ و $\vec{AD} = \mathbf{c}$ تجزیه می کنیم. چنین داریم: $\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{AD} + \vec{DN}$.

بدلیل $\vec{DC} = \vec{AC} - \vec{AD} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$ و $\vec{DN} = \frac{1}{2} \vec{DC}$ ، $\vec{MA} = -\frac{1}{2} \mathbf{a}$ می شود: $\vec{MN} = -\frac{1}{2} \mathbf{a} + \frac{1}{2} \mathbf{b} + \frac{1}{2} \mathbf{c}$. با منظور کردن عبارت $|BQ|/|BC| = x$ به تساوی زیر وصول می یابیم: $\vec{BQ} = x \vec{BC} = x(\mathbf{b} - \mathbf{a})$ و $\vec{PQ} = \vec{PA} + \vec{AB} + \vec{BQ}$ با در نظر گرفتن $\vec{PA} = \frac{2}{3} \vec{DA} = -\frac{2}{3} \mathbf{c}$ نیز به رابطه $\vec{PQ} = (1-x)\mathbf{a} + x\mathbf{b} - \frac{2}{3}\mathbf{c}$ و سرانجام به

دست می‌یابیم. با جاگذاری تجزیه‌های برداری حاصله در (5) چنین حاصل می‌شود:


$$-\frac{1}{2} \mathbf{a} + \frac{2}{3} \mathbf{c} = \left(\beta (1-x) - \frac{\alpha}{2} \right) \mathbf{a} + \left(\frac{\alpha}{2} + \beta x \right) \mathbf{b} + \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{2}{3} \beta \right) \mathbf{c}$$

از این تساوی دستگاه زیر بدست می‌آید:

$$\begin{cases} -\frac{1}{2} = \beta (1-x) - \frac{\alpha}{2} \\ 0 = \frac{\alpha}{2} + \beta x, \\ \frac{2}{3} = \frac{\alpha}{2} - \frac{2}{3} \beta. \end{cases}$$

این دستگاه موجبات $\beta = -1/2$, $x = 2/3$, $\alpha = 2/3$ را فراهم می‌سازد. در نتیجه رابطه زیر را خواهیم داشت: $|BO| / |BC| = 2/3$. یعنی جواب مسئله عبارت از $2/3$ خواهد بود.

به همان طریقی که در مثال‌های فوق انجام دادیم شرایط توازی یک خط و یک صفحه، دو صفحه و غیره را می‌توانیم به شکل تساوی‌های برداری بیان کنیم.



شکل ۱۳۴

بخش ۱۰ • زاویه بین خطوط مستقیم در فضا

در هندسه فضایی برای تعریف هر دو خط مستقیم از مفهوم زاویه بین آنها استفاده می‌شود. زاویه بین دو خط متقاطع عبارت از اندازه و کوچکترین زاویه تشکیل شده با آن دو خط است. اگر همهٔ چهار زاویه تشکیل شده با دو خط متقاطع برابر باشند آنگاه زاویه بین آنها برابر 90° (یا $\pi/2$ رادیان) خواهد بود. اگر دو خط مستقیم موازی باشند آنگاه زاویه بین آنها برابر 0° در نظر گرفته می‌شود. زاویه بین دو خط متناظر عبارت از زاویه بین دو متقاطع است که متناظراً به موازات آنها رسم شده‌اند. در این تعریف نقطه تقاطع دو خط که به موازات دو خط متناظر رسم می‌شوند بطور دلخواه اختیار می‌شوند.

قضیه • اگر خطوط متقاطع a و b بترتیب موازی خطوط متقاطع a_1 و b_1 باشند آنگاه زاویه بین خطوط a و b برابر زاویه بین خطوط a_1 و b_1 خواهد بود.

برهان • برای اثبات قضیه روی هر زوج از خطوط موازی نیم خط‌های متشابه‌الجهت اختیار کرده و از این نکته استفاده می‌کنیم که زوایای محذب با اضلاع متشابه‌الجهت مساوی هستند (شکل ۱۳۵): $\angle POM \cong \angle P_1O_1M_1$. در نتیجه $\angle OP \parallel \angle O_1P_1$, $\angle OM \parallel \angle O_1M_1$ و غیره را خواهیم

حل • عبارات $\vec{BC} = \mathbf{a}$ و $\vec{BD} = \mathbf{c}$ را در نظر گرفته، چنین داریم:

$$|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = a, \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = a^2/2$$

\vec{MN} را بر حسب \mathbf{a} ، \mathbf{b} و \mathbf{c} بیان می‌کنیم.

بدلیل $\vec{MN} = \vec{MB} + \vec{BC} + \vec{CN}$ و $\vec{MB} = -\frac{1}{2}\mathbf{b}$ و $\vec{CN} = \frac{1}{2}\vec{CD}$ ، نتیجه

$$\vec{MN} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c})$$

می‌شود که:

(1) چنین حاصل می‌شود:

$$|\vec{MN}|^2 = \frac{1}{4}(\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c})^2 = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + c^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) = \frac{a^2}{2}$$

از اینرو $|MN| = a/\sqrt{2}$ را داریم.

(2) عبارت $\vec{MN} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = \frac{a^2}{2}$ را محاسبه کرده و با منظور کردن:

$$|\vec{MN}| = a/\sqrt{2}, \quad |\vec{BC}| = a$$

چنین حاصل می‌شود:

$$\cos(\widehat{MN, BC}) = \frac{|\vec{MN} \cdot \vec{BC}|}{|\vec{MN}| \cdot |\vec{BC}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

این امر به معنی $(\widehat{MN, BC}) = \pi/4$ است.


(3) بترتیب چنین حاصل می‌شود:

$$\vec{MN} \cdot \vec{BA} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{2} - a^2 + \frac{a^2}{2}\right) = 0,$$

$$\vec{MN} \cdot \vec{CD} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) = \frac{1}{2}((\mathbf{c} + \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) - \mathbf{b}(\mathbf{c} - \mathbf{a}))$$


$$= \frac{1}{2}(c^2 - a^2 - \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}) = \frac{1}{2}\left(a^2 - a^2 - \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2}\right) = 0.$$

از اینرو نتیجه می‌شود که $(MN) \perp (AB)$ ، $(MN) \perp (CD)$ است.



شکل ۱۳۹

مثال ۲ • در چهاروجهی $ABCD$ تساوی‌های $|AB| = |BC|$ و $|AD| = |DC|$ را داریم. ثابت کنید پال‌های BD و AC متعامدند.





شکل ۱۳۵

داشت. از تعریف زاویه بین خطوط مستقیم و از قضیه بالا نتیجه می‌شود که: اگر خطوط a و b به ترتیب با خطوط a_1 و b_1 موازی باشند آنگاه زاویه بین خطوط a و b برابر زاویه بین خطوط a_1 و b_1 خواهد بود.

مثال ۱ • زاویه بین خطوط مستقیمی را پیدا کنید که محتوی اقطار AB_1 و BC_1 از وجوه یک مکعب هستند (شکل ۱۳۶a).

حل • اقطار مفروض روی خطوط متناظر قرار دارند. قطر AD_1 از وجه ADD_1A_1 موازی قطر BC_1 بوده و از اینرو زاویه بین خطوط AD_1 و AB_1 با زاویه بین خطوط BC_1 و AB_1 برابر است. مثلث AB_1D_1 را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. هر ضلع آن قطری از وجه مکعب است. طول اقطار برابر بوده و از اینرو مثلث AB_1D_1 متساوی الاضلاع می‌باشد. پس $\angle B_1AD_1 = 60^\circ$ است.

زاویه بین نیم خط‌های AD_1 و AB_1 بدست آمده و معلوم شده است که حاده است. بنابراین زاویه بین خطوط AD_1 و AB_1 نیز دارای همان مقدار بوده و جواب مسئله عبارت از 60° خواهد بود.



شکل ۱۳۶

مثال ۲ • در منشور مثلثی منتظم (شکل ۱۳۷) $|AA_1| = \frac{1}{\sqrt{5}} |AB|$ را داریم. زاویه بین خطوط AB_1 و BC_1 را بدست آورید.

حل • قطر AB_1 و B_1C_1 را بصورت موازی جابجا کرده و تصویر A را با A_2 نشان می‌دهیم (۱۳۷b). زاویه بین خطوط AB_1 و BC_1 برابر زاویه بین خطوط BC_1 و BC_1A_2 است. چنین داریم:

$$|AA_2| = |B_1C_1| = |BC|, \quad [AA_2] \parallel [B_1C_1] \parallel [BC]$$

در نتیجه چهار ضلعی $ABCA_2$ یک متوازی الاضلاع و بدلیل $|BC| = |AB|$ یک لوزی خواهد بود. نقطه O مرکز لوزی بوده و در نتیجه BO ارتفاع مثلث ABC خواهد بود. با در نظر گرفتن

$$|AB| = a \quad |BO| = a\sqrt{3}/2 \quad |BA_2| = a\sqrt{3} \quad \text{را داریم.}$$

با منظور کردن $|BB_1| = a/\sqrt{5}$ درمی‌یابیم که در مثلث‌های BB_1A و BB_1C_1 ,

پاره خط A_2C_1 تصویر پاره خط AB_1 در جابجایی موازی بوده و از اینرو $|A_2C_1| = |AB_1| = \sqrt{6/5} a$ است. حال با استفاده از قانون کسینوسها در مثلث

$$\cos \angle BC_1A_2 = \frac{|BC_1|^2 + |C_1A_2|^2 - |BA_2|^2}{2|BC_1||C_1A_2|} = -\frac{1}{4}$$

به رابطه زیر دست می یابیم:


از این رابطه $\angle BC_1A_2 = \arccos(-1/4)$ بدست می آید. زاویه بین نیم خط های C_1B و C_1A_2 بصورت منفرجه $(\pi/2 < \arccos(-1/4) < \pi)$ درآمده و بنابراین زاویه بین خطوط C_1B و C_1A_2 مکمل زاویه مزبور خواهد بود:

$$\widehat{(C_1B, C_1A_2)} = \pi - \arccos(-1/4)$$

با استفاده از اتحاد $\arccos x + \arccos(-x) = \pi$, ($|x| \leq 1$) وصول می یابیم:


$$\widehat{(C_1B, C_1A_2)} = \arccos(1/4)$$

و در نتیجه جواب مسئله عبارت از $\arccos(1/4)$ خواهد بود.



(a)

شکل ۱۳۷



(b)

در دو مثال قبل جستجوی زاویه بین خطوط به یافتن زاویه بین نیم خط هایی با رأس های مشترک و موازی خطوط مفروض تحویل یافت. اگر α زاویه بین خطوط مستقیم باشد آنگاه زاویه بین نیم خط ها مساوی α یا $\pi - \alpha$ خواهد بود. این نکته را مخصوصاً در مسائلی که در آنها یافتن پارامترهای دیگری از چند وجهی براساس زاویه بین خطوط مطرح است بایستی مورد ملاحظه قرار داد.

مثال ۳. در منشور مثلثی منتظم (شکل ۱۳۷a) زاویه بین خطوط AB_1 و BC_1 برابر $\arccos(1/4)$ بوده و طول ضلع قاعده برابر a است. طول یال جانبی منشور را بدست آورید.

حل. طول یال جانبی را با b نشان می دهیم. همان ترسیمات بکاررفته در حل مثال ۲ را تکرار کرده و دو حالت زیر را مورد ملاحظه قرار می دهیم:

$$(1) \angle BC_1A_2 = \arccos(1/4) \quad (\text{شکل } 138)$$


$$(2) \angle BC_1A_2 = \pi - \arccos(1/4) \quad (\text{شکل } 137b)$$

چنین داریم:

$$|BA_2| = a\sqrt{3}, \quad |C_1A_2| = |AB_1| = |BC_1| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

در مثلث BC_1A_2 در حالت اول $\left(1 - \frac{1}{4}\right) (a^2 + b^2) = 3a^2$ را و بطریق مشابه در حالت دوم $\left(1 + \frac{1}{4}\right) (a^2 + b^2) = 3a^2$ را داریم. از اینجا درمی یابیم که بترتیب $b_1 = a$ و $b_2 = a/\sqrt{5}$ است.

بدین ترتیب مسئله دارای دو جواب خواهد بود. حالت دوم مسئله به اطلاعات مثال ۲ متناظر است. بنابراین جواب مسئله عبارت از $a/\sqrt{5}$ است.



شکل ۱۳۸

بخش ۱۱ • استفاده از حاصلضرب اسکالر (درونی) بردارها در حل مسائل

حاصلضرب اسکالر درونی بردارها را می توان برای یافتن زوایای بین خطوط مستقیم، طول پاره خط ها، فاصله بین یک نقطه و یک خط، و غیره مورد استفاده قرار داد.

فرمول $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}})$ که حاصلضرب اسکالر دو بردار \mathbf{a} و \mathbf{b} را تعریف می کند تساوی

$\cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$ را موجب می شود. این فرمول را برای یافتن زاویه بین خطوط مستقیم بکار می گیریم. A_1 و A_2 را نقاطی از خط a با شرط $A_1 \neq A_2$ و نقاط B_1 و B_2 را نقاطی از خط b با شرط $B_1 \neq B_2$ در نظر می گیریم. اندازه φ ، زاویه بین بردارهای $\vec{A_1A_2}$ و $\vec{B_1B_2}$ بین 0 و π قرار داشته و طبق فرمول زیر تعریف می شود:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{A_1A_2} \cdot \vec{B_1B_2}}{|\vec{A_1A_2}| |\vec{B_1B_2}|}$$

اندازه α ، زاویه بین خطوط a و b بین 0 و $\pi/2$ قرار دارد. اگر $0 \leq \varphi \leq \pi/2$ باشد آنگاه $\alpha = \varphi$ و $\cos \alpha = \cos \varphi = |\cos \varphi|$ خواهد بود.

حال اگر $\pi/2 < \varphi \leq \pi$ باشد آنگاه $\alpha = \pi - \varphi$ و $\cos \alpha = -\cos \varphi = |\cos \varphi|$ خواهد بود. از این رو داریم: $\cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \frac{|\vec{A_1A_2} \cdot \vec{B_1B_2}|}{|\vec{A_1A_2}| |\vec{B_1B_2}|}$. از این فرمول نتیجه می شود که:

برای تعامد دو خط a و b لازم و کافی است که $\vec{A_1A_2} \cdot \vec{B_1B_2} = 0$ باشد.

مثال ۱ • در یک چهاروجهی منتظم نقاط M و N میانگانه های یال های AB و CD (شکل ۱۳۹) بوده و $|AB| = a$ است. مطلوبست محاسبه:

(۱) طول پاره خط MN ؛ (۲) زاویه بین خطوط MN و BC ؛ (۳) ثابت کنید خط MN بریال های AB و CD عمود است.

حل • سه بردار ناصفحه $\vec{BC} = a$ ، $\vec{BD} = c$ ، $\vec{BA} = b$ را اختیار می‌کنیم (شکل ۱۴۰).
چنین داریم: $\vec{DC} = a - c$ ، $\vec{DA} = b - c$.

طبق فرض $|a| = |b|$ و $|a - c| = |b - c|$ را داریم. از اینرو نتیجه می‌شود که:

$$(a - c)^2 = (b - c)^2, a^2 - 2a \cdot c + c^2 = b^2 - 2b \cdot c + c^2$$


با منظور کردن $a^2 = b^2$ به $a \cdot c = b \cdot c$ یعنی

$$(a - b) \cdot c = 0 \text{ وصول می‌یابیم.}$$

بدلیل $\vec{a} - \vec{b} = \vec{AC}$ ، $\vec{c} = \vec{BD}$ تساوی

$$\vec{AC} \cdot \vec{BD} = 0 \text{ را داریم یعنی } (AC) \perp (BD)$$

است.



شکل ۱۴۰

قضیه فرعی • در یک هرم مثلثی منتظم، بویژه در یک چهاروجهی منتظم یال‌های متقابل بر هم عمود هستند.

در مثال ۱ ثابت کردیم که خط مستقیم مارژر میانگانه‌های یال‌های متناظر یک چهاروجهی منتظم بر آن یال‌ها عمود است.


حکم زیر نیز درست است:

برای هر دو خط متناظر یک خط مستقیمی وجود دارد که هر دو ی آنها را قطع کرده و بر آنها عمود است. این خط منحصر بفرد می‌باشد. پاره‌خطی که دو انتهای آن بر روی دو خط متناظر قرار داشته و بر آنها عمود است عمود مشترک آنها نامیده می‌شود. در بین همه پاره‌خط‌هایی که دو انتهای آنها بر روی دو خط متناظر قرار دارند عمود مشترک دارای کوتاهترین طول است. بنابراین فاصله بین خطوط متناظر با طول عمود مشترک آنها برابر خواهد بود.

مثال ۳ • طول یال یک مکعب برابر a است. فاصله بین خطوط مستقیمی را پیدا کنید که شامل اقطار متناظر از دو وجه مجاور مکعب هستند.

حل • به عنوان مثال اقطار AC و A_1B از وجه مکعب را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم (شکل ۱۴۱). M را نقطه‌ای بر روی خط AC و N را نقطه‌ای بر روی خط A_1B در نظر می‌گیریم. شرط تعامد پاره خط MN بر خطوط AC و A_1B با روابط زیر هم ارز است:

$$(1) \vec{MN} \cdot \vec{AC} = 0, \vec{MN} \cdot \vec{BA_1} = 0$$



شکل ۱۴۱

بردارهای \vec{AC} ، $\vec{BA_1}$ و \vec{MN} را بر حسب \vec{a} ، \vec{b} ، \vec{c} و $\vec{AD} = \vec{AA_1} = \vec{c}$ بیان می‌کنیم. چنین داریم: $\vec{BA_1} = \vec{c} - \vec{a}$ و $\vec{AC} = \vec{a} + \vec{b}$. همچنین بدلیل اینکه نقطه M روی خط AC و نقطه N روی خط A_1B قرار دارد از اینرو $\vec{AM} = x\vec{AC}$ و $\vec{BN} = y\vec{BA_1}$ استنتاج می‌شود. با منظور کردن این نکته درمی‌یابیم که:

$$\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{AB} + \vec{BN} = -x\vec{AC} + \vec{a} + y\vec{BA_1} = (1-x-y)\vec{a} - x\vec{b} + y\vec{c}$$

تجزیه‌های برداری را در معادلات (1) جایگذاری می‌کنیم و معادلات را تبدیل می‌کنیم:

$$\begin{cases} ((1-x-y)\vec{a} - x\vec{b} + y\vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 0 \\ ((1-x-y)\vec{a} - x\vec{b} + y\vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1-x-y)a^2 - xa^2 = 0, & \begin{cases} 1-2x-y = 0 \\ -1+x+2y = 0 \end{cases} \\ ya^2 - (1-x-y)a^2 = 0, & \end{cases}$$

از اینرو $x = y = 1/3$ بدست می‌آید. این امر بدین معنی است که نقاط M و N روی پاره‌خط‌های AC و BA_1 قرار دارند و $|AM| = |AC|/3$ ، $|BN| = |BA_1|/3$ است.

حال چنین داریم: $\vec{MN} = \frac{1}{3}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$. بنابراین تساوی زیر استنتاج می‌شود:

$$|MN| = \sqrt{\frac{1}{9}(a^2 + a^2 + a^2)} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

مسائل

۵۶۳ • ثابت کنید: (a) در یک چهاروجهی هر رأس را به نقطه تلاقی میانه‌های وجه مقابل وصل می‌کنیم. این خطوط در نقطه‌ای (آنرا O می‌نامیم) همدیگر را قطع می‌کنند و این نقطه از طرف رأس هر یک از آنها را به نسبت $3/1$ تقسیم می‌کند.

(b) پاره‌خط‌هایی که میانگاه‌های یال‌های متناظر یک چهاروجهی را بهم وصل می‌کنند در همان نقطه O که میانگاه آنهاست همدیگر را قطع می‌کنند.

۵۶۴ • طول هر یک از یال‌های چهاروجهی $ABCD$ برابر a است. نقاط M ، N ، P بترتیب روی یال‌های DA ، DC و BC طوری قرار دارند که $|DM| = |CN| = a/3$ و $|CP| = a/5$ است.

برشی از چهاروجهی را رسم کنید که بوسیله صفحه MNP ایجاد می‌شود.

با در نظر گرفتن $Q = (MNP) \cap (AB)$ طول پاره‌خط BQ را محاسبه کنید.

۵۶۵ • متوازی‌الاضلاع $ABCD$ نقش قاعده هرم $SABCD$ را ایفاء می‌کند. برشی از هرم را رسم کنید که از رأس A و از نقاط M و P ، میانگاه‌های یال‌های SB و SD عبور می‌کند. این برش یال SC را به چه نسبتی تقسیم می‌کند.

۵۶۶ • طول یال مکعب $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ برابر a است. نقاط M و Q را بترتیب روی یال های AD و $B_1 C_1$ و نقاط P و N را روی یال CD طوری اختیار می کنیم که $|AM| = |C_1 Q| = |CP| = |DN| = a/3$ باشد. برشی از مکعب را رسم کنید که با رسم صفحه ای از خط MP به موازات خط NQ بدست می آید. مساحت این برش را محاسبه کنید.

۵۶۷ • طول یال های AC و BD از چهاروجهی $ABCD$ بترتیب برابر a ، b و زاویه بین خطوط AC و BD برابر φ است. بیشترین مساحت ممکنه برای برشی از چهاروجهی را پیدا کنید که توسط صفحه ای به موازات خطوط AC و BD ایجاد می شود.

۵۶۸ • خط a ، صفحه γ ، مفروض اند. نقاط A_1 و A_2 روی خط a ($A_1 \neq A_2$) قرار دارند. نقاط M ، N و P که روی این خط واقع نیستند به صفحه γ تعلق دارند. ثابت کنید برای اینکه خط a و صفحه γ موازی باشند لازم و کافی است که بردارهای $\vec{A_1 A_2}$ ، \vec{MN} و \vec{MP} هم صفحه باشند، یعنی بایستی اعدادی مانند α و β وجود داشته باشند که: $\vec{A_1 A_2} = \alpha \vec{MN} + \beta \vec{MP}$

۵۶۹ • نقاط M ، N و P بترتیب میانگانه یال های AB ، CD و BC از چهاروجهی $ABCD$ هستند. صفحه ای از نقطه P به موازات خطوط DM و AN رسم می کنیم. این صفحه یال AD را به چه نسبتی قطع می کند؟

۵۷۰ • در متوازی السطوح قائم الزاویه $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ عمودهای $A_1 P$ و BQ را از رئوس A_1 و B به قطر AC_1 وارد می کنیم. اگر $|AB| = a$ ، $|AD| = b$ ، $|AA_1| = c$ باشد طول پاره خط PQ را محاسبه کنید.

۵۷۱ • طول هر یک از یال های منشور منظم $ABCA_1 B_1 C_1$ برابر a است. نقاط M و N را بترتیب روی اقطار AB_1 و BC_1 از وجوه منشور طوری اختیار می کنیم که $|MN| = \frac{a}{\sqrt{3}}$ ، $(MN) \perp (AB)$ باشد. نقاط M و N به چه نسبتی پاره خط های AB_1 و BC_1 را تقسیم می کنند؟


بخش ۱۲ • خطوط و صفحات متعامد

یک خط مستقیم و یک صفحه در صورتی متعامد خوانده می شوند که خط مزبور بر هر خطی از صفحه عمود باشد. بیان فوق تعریف تعامد یک خط و یک صفحه محسوب می شود.

مثال ۱ • قاعده هرمی عبارت از مثلث متساوی الاضلاع ABC (شکل ۱۴۲) بوده و طول یال های جانبی SA ، SB ، SC از آن با هم برابرند. ثابت کنید که هرم $SABC$ منظم است.

حل • اگر پاره خط SO را ارتفاع هرم در نظر بگیریم آنگاه طبق تعریف تعامد یک خط و یک صفحه مثلث های SOA ، SOB و SOC قائم الزاویه خواهند بود. عبارات $|SA| = |SB| = |SC| = l$ و $|SO| = h$ را در نظر می گیریم.

از مثلث های قائم الزاویه SOA ، SOB ، و SOC درمی یابیم که $|BO| = |CO| = \sqrt{l^2 - h^2}$ است.



این امر بدین معنی است که نقطه O مرکز دایره محیطی مثلث قائم الزاویه ABC بوده و بنابراین مرکز همان مثلث نیز هست.

بدین ترتیب رأس S هرم مفروض را می توان روی مرکز قاعده مثلث متساوی الاضلاع ABC تصویر کرد. از اینرو هرم مفروض منتظم می باشد.

شکل ۱۴۲

بطریق کاملاً مشابه می توان ثابت کرد هرمی که قاعده آن چند ضلعی منتظم بوده و طول یال های آن نیز برابر است یک هرم منتظم می باشد. بویژه چهار وجهی منتظم یعنی چهار وجهی ای که یال های آن برابر است یک هرم منتظم محسوب می شود. هر یک از وجوه چهار وجهی منتظم نقش قاعده را برای آن ایفاء می کنند.

ضابطه تعامد یک خط و یک صفحه به شرح زیر است:

اگر خط مستقیمی بر هر یک از دو خط متقاطع واقع بر یک صفحه عمود باشد آنگاه خط و صفحه مفروض متعامد خوانده می شوند.

مثال ۲. ثابت کنید قطر AC از قاعده منشور چهار گوش منتظم (شکل ۱۴۳) بر صفحه BB_1D_1D عمود است.

اثبات • کافی است که ثابت کنیم خط AC بر هر دو خط متقاطع واقع بر صفحه BB_1D_1D عمود است. از مربع بودن $ABCD$ نتیجه می شود که $(BD) \perp (AC)$ است.


ثابت خواهیم کرد که $(BB_1) \perp (AC)$ است.

منشور مفروض منتظم است و بنابراین $(BB_1) \perp (ABCD)$ خواهد بود. طبق تعریف تعامد یک خط بر یک صفحه این امر موجب $(BB_1) \perp (AC)$ می شود.

بدین ترتیب درمی یابیم که خط AC بر خطوط متقاطع BD و BB_1 از صفحه BB_1D_1D عمود است. طبق ضابطه تعامد یک خط بر یک صفحه

این امر بر $(BB_1D_1D) \perp (AC)$ دلالت

می کند.




شکل ۱۴۳

قضیه • برای اینکه خط مستقیم واقع بر یک صفحه بر یک خط شیب دار عمود باشد لازم و کافی است که خط مفروض بر تصویر خط شیب دار روی صفحه مزبور عمود باشد.

قضیه: اگر خطی در یک صفحه بر تصویر یک خط شیب دار روی آن صفحه عمود باشد آنگاه خط مزبور بر خود خط شیب دار عمود خواهد بود.

مثال ۳ • ثابت کنید قطر BD_1 از مکعب شکل ۱۴۴ بر قطر AC از وجه $ABCD$ عمود است.

اثبات • خط BD تصویر خط شیب دار BD_1 روی صفحه $ABCD$ است زیرا $(D_1D) \perp (ABCD)$




شکل ۱۴۴

می باشد. وجه $ABCD$ یک مربع بوده و این امر به معنی $(BD) \perp (AC)$ است.

بر اساس شرط کفایت قضیه بالا رابطه اخیر موجب $(BD_1) \perp (AC)$ می شود.

قضیه فرعی • قطریک مکعب که از یک رأس آن ناشی می شود بر صفحه مار از انتهای سه یال ناشی از همان رأس عمود است.



شکل ۱۴۵

اثبات • برای اثبات مثلاً قطر BD_1 را در نظر می گیریم (شکل ۱۴۵).

ثابت کرده ایم که $(BD_1) \perp (AC)$ است.

بطریق کاملاً مشابه می توان ثابت کرد که $(BD_1) \perp (AB_1C)$ است. از اینرو نتیجه می شود که $(BD_1) \perp (ABC)$ است. از ویژگی های تقارن مکعب روشن می شود که این امر در مورد هر یک از اقطار مکعب صادق است.

قضیه • اگر خط مستقیم واقع بر یک صفحه بر یک خط شیب دار (مورب) عمود باشد آنگاه آن خط بر تصویر خط شیب دار بر روی صفحه نیز عمود خواهد بود.


مثال ۴ • در چهار وجهی $ABCD$ یال AB بر یال CD و یال AC بر یال BD عمود است. ثابت کنید که پای ارتفاع DO از چهار وجهی نقطه تلاقی ارتفاعات (یا امتداد ارتفاعات) مثلث ABC است.

اثبات • ابتدا حالتی را مورد ملاحظه قرار می دهیم که در آن هیچیک از یال های BD و CD به صفحه ABC عمود نیستند، یعنی حالتی را در نظر می گیریم که هر یک از این یال ها روی خط مورب (شیب دار) نسبت به صفحه ABC قرار دارند. بدلیل $(DO) \perp (ABC)$ (شکل ۱۴۶) خط BO تصویر بر خط BD بر صفحه ABC محسوب می شود. طبق فرض خط AC که روی صفحه ABC قرار دارد بر خط مورب BD عمود است. طبق شرط لازم مطروحه در قضایای فوق این امر بر $(AC) \perp (BO)$ دلالت دارد.


بطریق کاملاً مشابه می‌توان ثابت کرد که $(CO) \perp (AB)$ است. بدین ترتیب نقطه O مرکز تلاقی ارتفاعات (یا امتداد ارتفاعات) مثلث ABC خواهد بود. حال حالتی را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم که یکی از یال‌ها مثل BD بر صفحه ABC عمود است (شکل ۱۴۷).

در این حالت نقطه O بر نقطه B منطبق بوده و خط CD نسبت به صفحه ABC مورب می‌باشد و تصویر آن بر روی صفحه عبارت از خط (BC) است.

طبق شرط لازم مطروحه در قضایای فوق رابطه $(AB) \perp (CD)$ موجب $(AB) \perp (BC)$ می‌شود. این امر بدین معنی است که مثلث ABC یک مثلث قائم‌الزاویه بوده و نقطه B محل تلاقی ارتفاعات آن است.



شکل ۱۴۷




شکل ۱۴۶

حال مسئله‌ای را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم که می‌توان آن را با کمک ضابطه تعامد دو صفحه به شرح زیر به آسانی حل کرد.

اگر صفحه‌ای از خط عمود بر یک صفحه دیگر بگذرد آنگاه بر صفحه مزبور عمود خواهد بود.

مثال ۵ • ثابت کنید صفحات AD_1C و BB_1D_1D از منشور چهارگوش منتظم $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ متعامد هستند.



شکل ۱۴۸

اثبات • در مثال ۲ ثابت کردیم که $(AC) \perp (BB_1 D_1 D)$ است (شکل ۱۴۸). طبق ضابطه تعامد صفحات این امر $(AD_1 C) \perp (BB_1 D_1 D)$ را موجب می‌شود.

قضیه • اگر دو صفحه متعامد باشند آنگاه خط مستقیم ماربریکی از آنها که با فصل مشترک دو صفحه زاویه قائمه درست می‌کند بر صفحه دیگر عمود خواهد بود.

مثال ۶ • در منشور چهارگوش منتظم $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ طول عمود مرسوم از رأس B_1 بر صفحه $AD_1 C$ با شرط $|AA_1| = b$ و $|AB| = a$ را بیابید.

حل • در مثال ۵ ثابت کردیم که صفحات $AD_1 C$ و $BB_1 D_1 D$ متعامد هستند. فصل مشترک این صفحات

عبارت از خط DO است (شکل ۱۴۹). اگر B_1M را در صفحه BB_1D_1D بر خط DO عمود رسم کنیم آنگاه طبق قضیه اثبات شده در بالا $(AD_1C) \perp (B_1M)$ خواهد بود.

فرض می‌کنیم که $N = (D_1O) \cap (BB_1)$ است.

در مثلث قائم الزاویه NB_1D_1 ($\angle NB_1D_1 = 90^\circ$) رابطه $|B_1D_1| = a\sqrt{2}$ و در نتیجه $|NB_1| = 2b$

را داریم. در نتیجه چنین استنتاج می‌شود: $|ND_1| = \sqrt{|NB_1|^2 + |B_1D_1|^2} = \sqrt{4b^2 + 2a^2}$

پاره خط B_1M ارتفاع مثلث NB_1D_1 است. آنگاه از یک طرف


در مورد مساحت این مثلث $S = \frac{1}{2} |NB_1| \cdot |B_1D_1|$ و از

طرف دیگر $S = \frac{1}{2} |ND_1| \cdot |B_1M|$ را داریم.

از اینرو $|B_1M| \cdot |ND_1| = |B_1D_1| \cdot |NB_1|$ یعنی رابطه

زیر استنتاج می‌شود:

$$|B_1M| = \frac{|B_1D_1| \cdot |NB_1|}{|ND_1|} = \frac{2ab}{\sqrt{2b^2 + a^2}}$$



شکل ۱۴۹

قضیه • اگر دو صفحه متقاطع α و β بر صفحه γ عمود باشند آنگاه فصل مشترک صفحات α و β نیز بر صفحه γ عمود خواهد بود. اثبات این قضیه را به عهده دانش آموزان واگذار می‌کنیم

بخش ۱۳ • رسم خطوط و صفحات متعامد.

رسم برش های عمود بر یک خط یا یک صفحه

اساس رسم اجسام فضایی در هندسه فضایی بر تصویر کردن موازی روی یک صفحه استوار است.

تصویرهای موازی دارای تعدادی ویژگی های ساده هستند. به عنوان مثال در تصویر موازی، توازی



خطوط و نسبت طول های پاره خط های موازی پابرجا می ماند در حالیکه در مورد زاویه ها چنین نیست.

شکل ۱۵۰ تصویر موازی مکعبی را نشان می دهد. وجه AA_1B_1B با صفحه رسم موازی است و از اینرو

تصویر آن مربعی مساوی خود آن وجه خواهد بود. وجه $ABCD$ با صفحه رسم موازی نیست. تصویر آن

متوازی الاضلاعی است که با خود وجه برابر نیست. بر اساس موقعیت زاویه قائمه ABC و جهت

تصویر کردن، تصویر آن می تواند حاده یا متفرجه باشد.



شکل ۱۵۰

مثال ۱ • طول ضلع قاعده منشور چهارگوش منتظم $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ (شکل ۱۵۱) برابر a است.

تصویر عمود مرسوم DM ، میانگاه یال AA_1 را بر خط BD_1 نشان داده و طول این عمود را بیابید.

حل • مثلث MBD_1 را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. عمود مرسوم از نقطه M بر خط BD_1 ارتفاع این مثلث

است. با در نظر گرفتن عبارت $AA_1 = b$ به $MA_1 = |AM|$ وصول می‌یابیم.

در مثلث‌های قائم‌الزاویه $MA_1 D_1$ و $MA_1 B$ رابطه $|MD_1| = |MB| = \sqrt{a^2 + \frac{b^2}{4}}$ حاصل

می‌شود. این امر بدین معنی است که مثلث MBD_1 متساوی‌الساقین بوده و ارتفاع مرسوم از رأس M میانه

نیز هست، یعنی پای ارتفاع مزبور میانگاه پاره خط BD_1

است. با اتصال نقطه M و N ، میانگاه قطر BD_1 ، ارتفاع

مرسوم از نقطه M به خط BD_1 بدست می‌آید.

حال با یادآوری

$$|BN| = \frac{1}{2} |BD_1| \text{ و } |BD_1| = \sqrt{2a^2 + b^2}$$

مثلث قائم‌الزاویه MNB درمی‌یابیم که:

$$|MN| = \sqrt{|MB|^2 - |BN|^2} = a/\sqrt{2}$$

شکل ۱۵۱

برای رسم عمودی از نقطه معینی بر صفحه معینی در فضا معمول این است که موقعیت پای عمود را نسبت به نقاط صفحه مزبور که در شکل مشخص شده است، تعیین کنیم.

شکل ۱۵۲ا را اختیار می‌کنیم که در آن هرم مثلثی منتظم $SABC$ و ارتفاع SO آن نشان داده شده

است (مثلث ABC قاعده هرم است). طبق تعریف پای ارتفاع هرم منتظم مرکز قاعده هرم نیز هست.

مرکز مثلث متساوی‌الاضلاع ABC بر نقطه تلاقی میانه‌های آن منطبق است. بنابراین میانه‌های AM و

BN را در شکل ۱۵۲ا رسم می‌کنیم. نقطه O محل تلاقی آنها پای ارتفاع هرم است. پای ارتفاع هرم

چهارگوش منتظم ارائه شده در شکل ۱۵۲ب را می‌توان به عنوان نقطه تلاقی اقطار متوازی‌الاضلاعی


بدست آورد که نقش قاعده هرم را بازی می‌کند و عبارت از مربع $ABCD$ است. پای ارتفاع هرم شش

وجهی منتظم ارائه شده در شکل ۱۵۲c را نیز می‌توان بطریق مشابه بدست آورد. اشکال ۱۵۲b و ۱۵۲a


رسم برشی از هرم مثلث القاعده منتظم $SABC$ را نشان می‌دهد که با عبور صفحه‌ای از M ، میانگاه یال

SA تشکیل می‌شود. این صفحه با ارتفاع CN قاعده هرم زاویه قائمه تشکیل می‌دهد. صفحه قاطع را با α نشان می‌دهیم. بدلیل $\alpha \perp (CN)$ رابطه $\alpha \perp (ABC)$ حاصل می‌شود. از اینر و عمود مرسوم از نقطه M بر صفحه ABC به صفحه α متعلق خواهد بود. عمود مرسوم با ارتفاع هرم که از رأس S رسم می‌شود موازی است. بر اساس تجزیه و تحلیل انجام گرفته ترسیمات زیر را انجام می‌دهیم: ارتفاع SO هرم و خطوط $SO \parallel MS_1$ را رسم می‌کنیم (شکل ۱۵۳a). ضلع برش که بر وجه ABC واقع است بر خط CN عمود بوده و از اینر و موازی یال AB می‌باشد. از نقطه S_1 خطی بر اساس $[PQ] \parallel [AB]$ رسم می‌کنیم (شکل ۱۵۳b). از موازی بودن PQ و AB نتیجه می‌شود که ضلع برش که بر وجه ASB واقع است با یال AB نیز موازی است. خط MR را بر اساس $[MR] \parallel [AB]$ رسم می‌کنیم. برش حاصل عبارت از دوزنقه $PMRQ$ است.

ذیلاً مثال دیگری را در رسم برشی متعامد بر یک خط مستقیم ارائه می‌کنیم.




شکل ۱۵۲



شکل ۱۵۳

مثال ۲ • برشی از یک مکعب را رسم کنید که از M ، میانگاه یال AA_1 طوری عبور کند که با قطر B_1D مکعب زاویه قائمه بسازد (شکل ۱۵۴a). این برش قطر مکعب را به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟
 حل • همچون مثال ۱ بالا به آسانی ثابت می‌شود که عمود مرسوم از نقطه M بر خط B_1D از O ، میانگاه پاره خط B_1D عبور می‌کند. عمود مرسوم از N ، میانگاه یال A_1D_1 بر خط B_1D نیز از نقطه O می‌گذرد

(شکل ۱۵۴b). این امر بدین معنی است که صفحه برش ماز بر نقاط M, N و O قطر B_1D را نصف می‌کند. حال به رسم برش می‌پردازیم. برای انجام این کار ثابت می‌کنیم که صفحه برش از S ، میانگانه AB می‌گذرد. خط مستقیم SO همچون خط MO بر خط B_1D عمود است. بدین ترتیب صفحه MOS همچون صفحه MON بر خط B_1D عمود خواهد بود. آنگاه این صفحات بر هم منطبق بوده و $S \in (MON)$ خواهد بود. حال مثال ۱ بخش ۸ را می‌توان مورد استفاده قرار داد. ثابت کردیم که برشی از مکعب که با صفحه MNS بوجود می‌آید یک شش ضلعی منتظم (شکل ۱۵۴c) است که رئوس آن میانگانه‌های AB است از مکعب است که قطر B_1D را قطع نمی‌کنند. جواب مسئله عبارت از ۱:۱ است.



شکل ۱۵۴


حال مثالی از رسم برش عمود بر یک صفحه معین را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

مثال ۳ • طول هریال هرم چهارگوش منتظم $SABCD$ برابر a است. برشی از این هرم را رسم کنید که از قطر BD قاعده طوری عبور کند که با وجه SCD زاویه قائمه درست کند (شکل ۱۵۵a). مساحت این برش را محاسبه کنید.

حل • از نقطه ای از خط BD عمودی بر صفحه CSD رسم می‌کنیم. عمود به صفحه برش متعلق بوده و به همراه خط BD بطور کامل آن را تعریف می‌کند. مناسب بنظر می‌رسد که ترسیم برش را از نقطه O مرکز قاعده $ABCD$ انجام دهیم. در حقیقت صفحه SOM که در آن M میانگانه CD است (شکل ۱۵۵a) بر صفحه CSD عمود است $((CD) \perp (SOM))$ ، $((CD) \subset (CSD))$. بدین ترتیب ارتفاع مثلث SOM که از رأس O رسم می‌شود بر صفحه CSD عمود خواهد بود. حال تعیین می‌کنیم پای N ارتفاع، ضلع SM را با چه نسبتی تقسیم می‌کند.

در مثلث قائم الزاویه SOM ($\angle SOM = 90^\circ$) روابط $|OM| = a/2$ و $|SM| = a\sqrt{3}/2$ را داریم. طبق خاصیت مثلث قائم الزاویه تساوی $|OM|^2 = |MN| \cdot |SM|$ در دسترس قرار می‌گیرد که از آن نیز $|MN| = \frac{\sqrt{3}}{6} a$ استنتاج می‌شود. این امر به معنی $|MN| = \frac{1}{3} |SM|$ و مرکز بودن نقطه

N برای مثلث متساوی الاضلاع CSD است. میانه DK مثلث CSD را رسم می‌کنیم. $N = (DK) \cap (SM)$ را داریم. برشی که بدست می‌آید عبارت از مثلث DKB است. حال مساحت برش را بدست می‌آوریم. ارتفاع h مثلث DKB مرسوم از رأس B دو برابر طول عمود ON است زیرا نقطه O میانگانه پاره خط BD است. در مثلث قائم الزویه SOM $|ON| = \sqrt{|MN| \cdot |SN|} = a/\sqrt{6}$ را داریم. در نتیجه $h = 2a/\sqrt{6}$ بوده و مساحت مثلث DKB عبارت از $|DK| = a^2/2 \sqrt{2}$ خواهد بود.



شکل ۱۵۵

بخش ۱۴ • زاویه بین خط و صفحه

زاویه بین یک خط مورب نسبت به یک صفحه و خود آن صفحه برابر با زاویه بین خط و تصویر قائم آن روی صفحه است.

اگر خطی بر صفحه ای عمود باشد آنگاه زاویه بین آنها برابر 90° خواهد بود؛ اگر خط و صفحه موازی باشند زاویه بین آنها 0° خواهد بود.


مثال ۱ • زاویه بین یال یک چهار وجهی منتظم و صفحه وجهی از آن را پیدا کنید که شامل آن یال نیست.

حل • زاویه بین یال AD و صفحه ABC را بدست می‌آوریم (شکل ۱۵۶). طول یال چهار وجهی را با a نشان می‌دهیم. عمود DO را بر صفحه ABC فرود می‌آوریم. نقطه O مرکز مثلث ABC بوده و از اینرو $|AO| = a\sqrt{3}/3$ را داریم. خط AO تصویر خط AD بر صفحه ABC بوده و از اینرو زاویه بین خط AD و صفحه مزبور برابر $\angle DAO$ است.

روابط $\cos \angle DAO = |AO|/|AD| = \sqrt{3}/3$ ، $\angle DAO = \arccos(1/\sqrt{3})$ را داریم. به آسانی

می‌توان دریافت که هر یال چهار وجهی منتظم زاویه ای به همین اندازه با هر وجهی که شامل یال مزبور نیست درست می‌کند.

بنابراین جواب مسئله عبارت از $\arccos(1/\sqrt{3})$ خواهد بود.



شکل ۱۵۶

مثال ۲ • در منشور مثلث القاعده منتظم $ABC A_1 B_1 C_1$ رابطه $|AA_1| = |AB|$ را داریم. زاویه بین قضا AB_1 و صفحه $AA_1 C_1 C$ را بیابید.


حل • تصویر خط AB_1 را روی صفحه $AA_1 C_1 C$ رسم می‌کنیم. صفحات $A_1 B_1 C_1$ و $AA_1 C_1 C$ متعامد بوده و بنابراین عمود $B_1 M$ وارد بر خط $A_1 C_1$ بر صفحه $AA_1 C_1 C$ نیز عمود خواهد بود. خط AM تصویر قائم خط AB_1 بر روی صفحه $AA_1 C_1 C$ است. زاویه بین خط AB_1 و صفحه $AA_1 C_1 C$ برابر $\angle B_1 A M$ است. با در نظر گرفتن عبارت $|AB| = a$ رابطه $|AA_1| = a$ و نیز رابطه $|AB_1| = a\sqrt{2}$ را خواهیم داشت. ارتفاع $B_1 M$ از مثلث متساوی الاضلاع $A_1 B_1 C_1$ برابر $a\sqrt{3}/2$ است. در مثلث قائم الزاویه $B_1 A M$ چنین داریم:

$$\sin B_1 A M = |B_1 M| / |AB_1| = \sqrt{6}/4$$

$$\angle B_1 A M = \arcsin (\sqrt{6}/4)$$

بنابراین جواب مسئله عبارت از

$$\arcsin (\sqrt{6}/4) \text{ خواهد بود.}$$



شکل ۱۵۷

توجه • اختیار زاویه $B_1 A A_1$ به عنوان زاویه بین خط AB_1 و صفحه $AA_1 C_1 C$ ناصحیح است (شکل ۱۵۹). خط AA_1 تصویر قائم خط AB_1 بر روی صفحه $AA_1 C_1 C$ نیست و زاویه $B_1 A A_1$ که معادل $\frac{\pi}{4}$ است زاویه بین خط و صفحه مزبور محسوب نمی‌شود. روش مختصات را نیز می‌توان برای یافتن زاویه بین صفحه و خط بکار گرفت. دستگاه مختصات کارتزین را در فضا در نظر گرفته فرض کنید که صفحه α با معادله زیر در آن تعریف شده باشد:

$$(1) \quad ax + by + cz + d = 0$$

همچنین دو نقطه $A_1(x_1; y_1; z_1)$ و $A_2(x_2; y_2; z_2)$ را از خط a در نظر بگیرید. زاویه بین خط α و صفحه a را با φ نشان می‌دهیم. دو بردار زیر را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

$$\mathbf{n} = (a; b; c) \quad \text{و} \quad \vec{l} = A_1 A_2 = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1)$$

زاویه φ بوسیله فرمول زیر تعریف می‌شود:

$$\sin \varphi = \frac{|\mathbf{n} \cdot \vec{l}|}{|\mathbf{n}| \cdot |\vec{l}|} \quad (2)$$


در حقیقت بردار $\mathbf{n} = (a; b; c)$ که بر صفحه α عمود است با معادله (1) تعریف شده و بنابراین با در نظر گرفتن تساوی $\psi = \widehat{(\mathbf{n}, \mathbf{l})}$ چنین خواهیم داشت:

اگر $0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$ باشد آنگاه $\varphi = \frac{\pi}{2} - \psi$ خواهد بود (شکل ۱۵۹a):

اگر $\frac{\pi}{2} < \psi \leq \pi$ باشد آنگاه $\varphi = \psi - \frac{\pi}{2}$ خواهد بود (شکل ۱۵۹b).

در هر دو حالت $\sin \varphi = |\cos \psi|$ را داریم. این امر و رابطه $\cos \psi = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}}{|\mathbf{n}| \cdot |\mathbf{l}|}$ موجب فرمول (2) می شود. در مسائل استنتاج معادلات صفحه غالباً از این نکته استفاده می شود که معادله هر صفحه مار بر نقطه $M(x_0; y_0; z_0)$ را می توان به شکل زیر داشت:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0. \quad (3)$$



شکل ۱۵۸

مثال ۳. در منشور چهارگوش منتظم نسبت طول یال جانبی به ضلع قاعده برابر 2 است. زاویه بین قطر BD_1 منشور و صفحه BC_1I را بیابید (شکل ۱۵۹).

حل. دستگاه مختصات را همچون شکل ۱۵۹ در نظر می گیریم. اگر ضلع قاعده منشور را با s نشان دهیم طول یال جانبی آن برابر 2s خواهد بود. آنگاه مختصات نقاط D_1 و D را بدست می آوریم: $D_1(0; 0; 2s)$ و $D(0; 0; 0)$. صفحه BC_1D از نقطه $D(0; 0; 0)$ عبور کرده و بنابراین طبق معادله (3) معادله آن دارای شکل $ax + by + cz = 0$ خواهد بود.

با جاگذاری مختصات نقاط B و C_1 در این معادله دستگاه زیر بدست می آید:

$$\begin{cases} as + bs = 0 \\ bs + 2cs = 0 \end{cases}$$

از این دستگاه درمی یابیم که $a = 2c$, $b = -2c$ است. این امر بدین معنی است که معادله صفحه

$$2cx - 2cy + cz = 0$$

با منظور کردن $c \neq 0$ (در غیر این صورت همه جملات صفر خواهد شد) و حذف آن از معادله به معادله

$$2x - 2y + z = 0$$

بدین ترتیب بردار \mathbf{n} که بر صفحه BC_1D عمود است دارای مختصات $(2; -2; 1)$ است. مختصات

$\vec{l} = \vec{BD}_1$ بردار $(p; q; r)$ را بدست می‌آوریم:

$$p = 0 - s = -s, \quad q = 0 - s = -s, \quad r = 2s - 0 = 2s$$

آنگاه محاسبات زیر را انجام می‌دهیم:


$$\vec{l} \cdot \vec{n} = (-s) \cdot 2 + (-s) \cdot (-2) + 2s \cdot 1 = 2s, \quad |\vec{n}| = \sqrt{4+4+1} = 3,$$

$$|\vec{l}| = \sqrt{s^2 + s^2 + 4s^2} = \sqrt{6} s$$

با در نظر گرفتن φ به عنوان زاویه بین خط BD_1 و صفحه BC_1D طبق فرمول (2) چنین بدست می‌آید:

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{l} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{l}|} = \frac{2s}{3 \cdot \sqrt{6} \cdot s} = \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

بنابراین جواب مسئله عبارت از $\varphi = \arcsin(\sqrt{6}/9)$ خواهد بود.



شکل ۱۵۹

بخش ۱۵ • فاصله بین یک نقطه و یک صفحه. فواصل بین خطوط و صفحات

به تعریف فاصله بین اجسام فضایی می‌پردازیم: کوتاهترین فاصله بین نقاط دو جسم فضایی Φ_1 و Φ_2 ، فاصله بین دو جسم فضایی Φ_1 و Φ_2 نامیده می‌شود.

اگر نقطه ای روی یک صفحه واقع نباشد در آنصورت فاصله نقطه از صفحه مزبور عبارت از طول عمودی خواهد بود که از آن نقطه به صفحه مزبور وارد می‌شود. اگر نقطه متعلق به صفحه باشد آنگاه فاصله بین آنها صفر خواهد بود. مثلاً در همین فصل با مسائلی در مورد یافتن فاصله یک نقطه از یک صفحه مواجه بودیم (مثال ۵ بخش ۱۲). حال برای یافتن آن فاصله روش‌های دیگری را مورد بحث قرار می‌دهیم. اگر V ، حجم هرم Q ، مساحت قاعده آن معلوم باشد آنگاه H ، ارتفاع هرم را می‌توان طبق فرمول زیر محاسبه کرد: $H = 3V/Q$ ، این ارتفاع چیز دیگری بجز فاصله رأس هرم از صفحه قاعده آن نیست.

مثال ۱ • مساحت سطح جانبی و حجم هرم چهارگوش منتظمی بترتیب برابر V و S است. فاصله رأسی از قاعده را از وجه جانبی ای حساب کنید که شامل آن رأس نیست.

حل • یافتن فاصله رأس B از صفحه SCD مطرح است (شکل ۱۶۰). هرم $SBCD$ را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. این هرم و هرم $SABCD$ ، در ارتفاع منشعب از رأس S مشترک بوده و مساحت قاعده هرم اول یعنی مساحت BCD برابر نصف مساحت مربع $ABCD$ است. این امر بدین معنی است که اگر

حجم هرم اول را با V_1 نشان دهیم آنگاه $V_1 = V/2$ خواهد بود. وجه SCD را قاعده هرم $SB_1C_1D_1$ در نظر می‌گیریم. مساحت این وجه برابر $S/4$ است. ارتفاع هرم $SB_1C_1D_1$ وارده از رأس B با فاصله نقطه B از صفحه SCD برابر است. این فاصله را با d نشان می‌دهیم.


آنگاه $V_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} S \cdot d = \frac{1}{12} S \cdot d$ خواهد بود. با بخاطر آوردن $V_1 = \frac{1}{2} V$ درمی‌یابیم که

$d = 6V/S$ است. بدیهی است که نتیجه حاصله

به نوع انتخاب رأس قاعده و انتخاب صفحه وجه

جانبی فاقد آن رأس بستگی ندارد. بنابراین جواب

مسئله عبارت از $6V/S$ خواهد بود.



شکل ۱۶۰

برای یافتن فاصله یک نقطه و یک صفحه از روش مختصات یعنی از روش زیر نیز می‌توان استفاده کرد:

فاصله (ρ) نقطه $M_0(x_0; y_0; z_0)$ از یک صفحه که با معادله $ax + by + cz + d = 0$ تعریف

شده است از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:

$$\rho = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad (1)$$

مثال ۲. در منشور مثلث القاعده منتظم شکل ۱۶۱، $|AA_1| = 3 \text{ cm}$ و $|AB| = 4 \text{ cm}$ را داریم.

فاصله رأس C_1 را از صفحه ADB پیدا کنید. نقطه D میانگانه یال A_1C_1 است.

حل. دستگاه مختصات کارترتیسی واقع در شکل ۱۶۱ را در نظر می‌گیریم. محور x های این دستگاه و

میانه BM از مثلث ABC در صفحه قاعده واقع شده و بر خط AC عموداند. بنابراین محور x ها موازی

خط BM خواهد بود. توجه دارید که قسمت هاشور خورده ADB از صفحه، برشی از منشور به حساب

نمی‌آید. مختصات نقاط A, B, D, C_1 را بدست می‌آوریم:

$$A(0; 0; 0), B(2\sqrt{3}; 2; 0), D(0; 2; 3), C_1(0; 4; 3)$$


با توجه به مختصات معلوم نقاط A, B, D معادله صفحه ADB همچون مثال ۳ بخش ۱۴ بدست می‌آید:

$$\sqrt{3}x - 3y + 2z = 0$$

فاصله (ρ) نقطه $C_1(0; 4; 3)$ از صفحه مزبور را می‌توان بوسیله فرمول (۱) محاسبه کرد:

$$\rho = \frac{|\sqrt{3} \cdot 0 - 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3|}{\sqrt{3 + 9 + 4}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

بنابراین جواب مسئله عبارت از $3/2 \text{ cm}$ خواهد بود.



شکل ۱۶۱

مسائل مربوط به یافتن فواصل یک خط و یک صفحه موازی با آن و صفحات موازی به مسئله یافتن فاصله یک نقطه از یک صفحه تحویل می‌یابد. این نکته از احکام زیر استنتاج شده است:


فاصله بین یک خط و یک صفحه موازی با آن برابر فاصله نقطه دلخواهی از آن خط نسبت به صفحه مفروض است.

فاصله دو صفحه موازی برابر با فاصله نقطه دلخواهی از یک صفحه نسبت به صفحه دیگر است. حکم اول را ثابت می‌کنیم (شکل a ۱۶۲). حکم دوم را نیز می‌توان بطریق مشابه اثبات کرد (شکل b ۱۶۲).

اثبات • روابط $a \parallel \alpha$ ، $a \subset \alpha$ ، اگر $a \subset \alpha$ باشد آنگاه بدیهی است که فاصله بین آنها صفر خواهد بود) را در نظر می‌گیریم. A را نقطه‌ای دلخواه از خط a فرض می‌کنیم.

رأد داریم $AA_1 \perp \alpha$ (شکل a ۱۶۲). مطلوب قضیه این است که ثابت کنیم فاصله بین a و α برابر $|AA_1|$ است. با رسم صفحه β از خط a و نقطه A_1 ، $\beta \perp \alpha$ را داریم، اگر $\alpha \cap \beta = \alpha_1$ فرض شود آنگاه $a \parallel \alpha_1$ خواهد بود. نقاط دلخواه $M \in a$ و $N \in \alpha_1$ را اختیار کرده و عمود MM_1 را در صفحه β بر خط a_1 رسم می‌کنیم. آنگاه بدیهی است که $|MM_1| = |AA_1|$ خواهد بود.

از این گذشته $MM_1 \perp \alpha$ (بدلیل $\beta \perp \alpha$) بوده و از اینرو $|MN| \geq |MM_1|$ را داریم. از این نکته استنتاج می‌شود که $|MN| \geq |AA_1|$ است. بدین ترتیب $|AA_1|$ کوتاهترین خط بین فواصل نقاط خط a و صفحه α خواهد بود. یعنی $|AA_1|$ فاصله این اشکال خواهد بود.



شکل ۱۶۲

مثال ۳ • طول ارتفاع هرم چهارگوش منتظم $SABCD$ ، و طول ضلع قاعده آن برابر a است. فاصله بین خط AB و صفحه SCD را محاسبه کنید.

حل • از رأس S هرم و نقاط M و N ، میانگاه‌های یال‌های AB و CD صفحه‌ای را عبور می‌دهیم (شکل ۱۶۳). این صفحه بر صفحه SCD عمود خواهد بود. عمود MP بر خط SN نیز بر صفحه SCD عمود است. طول این عمود دقیقاً برابر فاصله خط AB از صفحه SCD است. ارتفاع SO هرم و پاره - خط MP ارتفاعات مثلث SMN محسوب می‌شوند.


در این مثلث چنین داریم:

$$|MN| = a, \quad |SO| = a, \quad |SN| = \sqrt{|SO|^2 + |ON|^2} = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} a$$

مساحت مثلث SMN از یک طرف برابر $\frac{1}{2} |SN| \cdot |MP|$ و از طرف دیگر برابر $\frac{1}{2} |MN| \cdot |SO|$ است.

$$|MP| = \frac{|MN| \cdot |SO|}{|SN|} = \frac{2}{\sqrt{5}} a$$


حاصل شده و جواب مسئله عبارت از $2a/\sqrt{5}$ خواهد بود.



شکل ۱۶۳

مثال ۴: در مکعب $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ اگر $|AB| = a$ باشد آنگاه فاصله بین صفحات $AB_1 D_1$ و BDC_1 را محاسبه کنید.

حل: قطر $A_1 C$ (شکل ۱۶۴) مکعب بر صفحات $AB_1 D_1$ و BDC_1 عمود است (نتیجه مثال ۳ بخش ۱۲). از نتیجه مسئله ۳ بخش ۹ دریافت می‌شود که صفحات $AB_1 D_1$ و BDC_1 قطر $A_1 C$ را به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کنند.



شکل ۱۶۴

یعنی اگر M و N نقاط تلاقی قطر $A_1 C$ با صفحات مزبور باشند آنگاه

$$|A_1 M| = |MN| = |NC| = \frac{1}{3} |A_1 C|$$


خواهد بود. طول پاره خط MN با فاصله صفحات $AB_1 D_1$ و BDC_1 برابر است.

بدلیل $|A_1 C| = \sqrt{3} a$ استنتاج می‌شود که $|MN| = \frac{\sqrt{3}}{3} a$ بوده و در نتیجه جواب مسئله عبارت از $a\sqrt{3}/3$ خواهد بود.

مثال ۵: در چهاروجهی $ABCD$ طول یال‌های AB و CD برابر a و طول یال‌های دیگر برابر b است. فاصله بین خطوط AB و CD را محاسبه کنید.


حل: فرض می‌کنیم که M و N میانگانه‌های یال‌های AB و CD باشند (شکل ۱۶۵). در مثلث‌های متساوی الساقین ABC و ABD رابطه $\sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}}$ حاصل می‌شود. مثلث CMD متساوی الساقین بوده و بنابراین $(CD) \perp MN$ خواهد بود. این امر بدین معنی است که MN عمود مشترک خطوط AB و CD است.

از مثلث $C.M.N$ درمی‌یابیم که $\sqrt{b^2 - \frac{a^2}{2}}$ است. یعنی جواب مسئله عبارت از $\sqrt{b^2 - \frac{a^2}{2}}$ خواهد بود.



شکل ۱۶۵


قضیه فرعی • در یک چهاروجهی منتظم که طول یال آن a است هر پاره خط واصل میانگه‌های یال‌های متناظر، عمود مشترک آن یال‌ها بوده و طول این پاره خط برابر $a/\sqrt{2}$ است. برای یافتن فاصله یال خطوط متناظر لازم است که عمود مشترک آنها را رسم کنیم. دو خط متناظر را همیشه می‌توان روی دو صفحه موازی رسم کرد. طرحی از رسم یکی از این صفحات (صفحه ماژبر خط b) در شکل ۱۶۶ نشان داده شده است: B نقطه دلخواهی از خط b است، $a_1 \parallel a$ ، $a_1 \cap b = B$ ، $a_1 \subset \alpha$ ، $b \subset \alpha$ ، $a_1 \perp b$ ، فاصله بین خطوط a و b با فاصله بین هر نقطه خط a از صفحه α برابر است. از خط α نیز می‌توان صفحه β را به موازات صفحه a رسم کرد. فاصله بین صفحات α و β برابر فاصله بین خطوط a و b است.




شکل ۱۶۶

مثال ۶ • در منشور مثلث القاعده منتظم شکل ۱۶۷a تساوی‌های $|AA_1| = 3 \text{ cm}$ ، $|AB| = 4 \text{ cm}$ را داریم. نقطه M میانگه یال AC است. فاصله بین خطوط AB و C_1M را محاسبه کنید.

حل • از نقطه A صفحه A_1C_1C خطی به موازات خط C_1M رسم می‌کنیم. بدیهی است که این خط از D ، میانگه یال A_1C_1 عبور می‌کند (شکل ۱۶۷b). صفحه AD را به موازات خط C_1M از خطوط AB عبور می‌دهیم. فاصله بین خطوط AB و C_1M برابر فاصله نقطه ای از خط C_1M و صفحه ADB است. فاصله نقطه C_1 را از صفحه ADB در مثال ۲ همین بخش بدست آورده ایم و مقدار آن $3/2 \text{ cm}$ است. بنابراین جواب مسئله عبارت از $3/2 \text{ cm}$ خواهد بود.



(a)



(b)

شکل ۱۶۷

بخش ۱۶ • زاویه دوجهی (فرجه). زاویه بین صفحات. نیمساز، کنج سه وجهی

اندازه یک فرجه عبارت از اندازه زاویه مسطحه آن است. زاویه مسطحه عبارت از برشی از یک فرجه است. این برش با صفحه عمود بریال فرجه ایجاد می شود. اضلاع زاویه مسطحه بریال فرجه عمود هستند. برای یافتن اندازه فرجه روش مناسب این است که زاویه مسطحه آن را رسم کرده و مقدار آن را پیدا می کنند.

مثال ۱ • فرجه تشکیل شده بر روی یال یک چهاروجهی منتظم را بیابید.


حل • فرجه واقع بریال AB را پیدا می کنیم (شکل ۱۶۸). فرض می کنیم که DO ارتفاع سه وجهی و BM ارتفاع وجه ABD باشد.

آنگاه MO تصویر DM روی صفحه ABC بوده و در نتیجه $[MO] \perp [AB]$ خواهد بود. این امر بدین معنی است که $\angle DMO$ زاویه مسطحه ای است که رأس آن روی یال AB قرار دارد.

طول یال چهاروجهی را با a نشان می دهیم و آنگاه $|DM| = a\sqrt{3}/2$ را خواهیم داشت. نقطه O مرکز وجه ABC بوده و بنابراین $|MO| = a\sqrt{3}/6$ خواهد بود. از مثلث قائم الزاویه DMO درمی یابیم که $|MO|/|DM| = 1/3$ است.

از اینرو فرجه ای که روی یال AB تشکیل شده برابر $\arccos(1/3)$ است. همه فرجه های تشکیل شده روی یال های یک چهاروجهی منتظم دارای همین مقدار هستند.


یعنی اندازه هر یک از آنها برابر $\arccos(1/3)$ است.



شکل ۱۶۸

مثال ۲ • طول همه یال های هرم چهارگوش منتظم $SABCD$ با هم برابرند. اندازه فرجه بین وجوه SAD و SBC را بیابید.

حل • صفحه SBC از خط BC که موازی صفحه SAD است عبور کرده است $(BC) \parallel (AD)$ ، (شکل ۱۶۹). بنابراین فصل مشترک صفحات SBC و SAD عبارت از خط l است که از نقطه S به موازات خط BC عبور می کند. خط l یال فرجه ای است که بایستی آن را پیدا کنیم. فرض می کنیم که M و N بترتیب میانگامه یال های AD و BC باشند. صفحه SMN بریال l عمود است. در حقیقت $(BC) \perp (MN)$ و $(BC) \perp (SN)$ بوده و از اینرو $(BC) \perp (SMN)$ است. ولی $(BC) \parallel l$ بوده و در نتیجه $l \perp (SMN)$ را خواهیم داشت. از این امر استنتاج می شود که $\angle MSN$ زاویه مسطحه بین وجوه SAD و SBC است. طول یال هرم را با a نشان داده و فرض می کنیم که SO ارتفاع هرم است. عبارت $\angle MSN = \alpha$ را نیز در نظر می گیریم. در مثلث متساوی الساقین MSN روابط $|MN| = a \sin \alpha$



شکل ۱۶۹

داریم $|ON| = a/2$ ، $|MS| = |NS| = a\sqrt{3}/2$ ،
 از اینرو $\sin(\alpha/2) = |ON|/|SN| = 1/\sqrt{3}$ استنتاج
 می‌شود.

حال درمی‌یابیم که $\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2(\alpha/2) = 1/3$
 $\alpha = \arccos(1/3)$ است.

یعنی جواب مسئله عبارت از $\arccos(1/3)$ خواهد بود.

دو صفحه متقاطع چهار فرجه تشکیل می‌دهند. اگر این فرجه‌ها با هم مساوی باشند دو صفحه مزبور متعامد خوانده می‌شوند و اندازه هر یک از این فرجه‌ها $\pi/2$ خواهد بود. اگر دو صفحه متقاطع متعامد نباشند در آن صورت کوچکترین فرجه تشکیل شده به عنوان زاویه بین آنها اختیار می‌شود. با این ترتیب زاویه بین دو صفحه متقاطع بین 0 و $\pi/2$ قرار دارد.

مثال ۳ • در هرم مسدس القاعده منتظم $SABCDEF$ نسبت ارتفاع به طول ضلع قاعده برابر $4 : \sqrt{6}$ است. زاویه بین صفحات SBC و SDE را محاسبه کنید.

حل • خط SM فصل مشترک صفحات SBC و SDE را رسم می‌کنیم (شکل ۱۷۰)، $M = (BC) \cap (ED)$ ،
 برای یافتن فرجه‌ای با وجوه BSM و ESM ابتدا زاویه مسطحه آن را رسم می‌کنیم.
 مرکز قاعده هرم را نقطه O در نظر می‌گیریم. نقطه O میانگانه قطر BE بوده و بدلیل متساوی الاضلاع بودن مثلث BME ، $(MO) \perp (BE)$ را داریم. خط MO تصویر خط SM روی صفحه قاعده بوده
 (SO) برای این صفحه عمود است) و بنابراین $(SM) \perp (BNE)$ خواهد بود.


اگر ON ارتفاع مثلث SOM در نظر گرفته شود آنگاه از $(SM) \perp (ON)$ و $(SM) \perp (BE)$ نتیجه می‌شود $(SM) \perp (BNE)$ است، یعنی زاویه BNE زاویه مسطحه $BSME$ است. حال زاویه BNE را پیدا می‌کنیم. اگر طول ضلع قاعده هرم را با a نشان دهیم آنگاه $|BE| = |BM| = |EM| = 2a$ بوده و در نتیجه $|MO| = a\sqrt{3}$ را خواهیم داشت.

از مثلث قائم الزاویه SOM تساوی $|SM| = \sqrt{|SO|^2 + |OM|^2} = \frac{3\sqrt{6}}{4}a$ استنتاج می‌شود.
 آنگاه $|ON| = \frac{|SO| \cdot |OM|}{|SM|} = \frac{a}{\sqrt{3}}$ بدست می‌آید. از تقارن حول صفحه SOM نتیجه می‌شود

که اگر $\angle BNE = \varphi$ باشد آنگاه $\angle BNO = \varphi/2$ خواهد بود.

از مثلث BON رابطه $\tan(\varphi/2) = |BO|/|ON| = \sqrt{3}$ بدست می‌آید که از آن نیز $\varphi = 2\pi/3$ حاصل می‌شود. این مقدار، برابر فرجه $BSME$ است. بدلیل $\varphi > \pi/2$ زاویه بین صفحات FSD و

BSC برابر $\pi - \varphi = \pi/3$ خواهد بود. پس جواب مسئله معادل $\pi/3$ درمی آید.



شکل ۱۷۰

روش مختصاتی را نیز می توان برای یافتن زاویه بین صفحات مورد استفاده قرار داد. صفحاتی را با معادلات زیر در نظر می گیریم:

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$$

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$

اگر زاویه بین این صفحات را با φ نشان دهیم آنگاه رابطه زیر حاصل می شود که در آن

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|} \quad \text{است: } \mathbf{n}_2 = (a_2; b_2; c_2) \text{ و } \mathbf{n}_1 = (a_1; b_1; c_1)$$

مثال ۴: نقاط E, F, M در مکعب شکل ۱۷۱ بترتیب میانگانه یال های AA_1, AB, CC_1 هستند. زاویه بین صفحات EFD و A_1D_1M را بدست آورید.

حل: دستگاه مختصات کارترتی را همچون شکل ۱۷۱ در نظر می گیریم. با اختصاص a برای طول یال مکعب مختصات نقاطی از مکعب را بدست می آوریم:

$$D(0 \text{ و } 0 \text{ و } 0), E(a \text{ و } 0 \text{ و } a/2), F(a \text{ و } 2 \text{ و } 0), A_1(a \text{ و } 0 \text{ و } a), D_1(0 \text{ و } 0 \text{ و } a), M(0 \text{ و } a \text{ و } a/2)$$

از مختصات معلوم این نقاط معادله صفحه EFD را بدست می آوریم: $x - 2y - 2z = 0$

همچنین معادله صفحه A_1D_1M بصورت $y + 2z - 2a = 0$ می آید:

(قسمت هاشور خورده صفحه A_1D_1M در شکل ۱۷۱ برشی

از مکعب محسوب نمی شود). بردار $\mathbf{n}_1 = (1; -2; -2)$

بر صفحه EFD و بردار $\mathbf{n}_2 = (0; 1; 2)$ بر صفحه A_1D_1M


عمود است. φ ، زاویه بین این صفحات را بدست

می آوریم:

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|} = \frac{|1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 - 2 \cdot 2|}{\sqrt{1+4+4} \cdot \sqrt{1+4}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$


شکل ۱۷۱

$$\varphi = \arccos(2/\sqrt{5})$$



نیمساز یک فرجه عبارت از نیم صفحه ای است که آن را به دو فرجه مساوی تقسیم می کند. نیمساز فرجه از یک طرف به یال فرجه محدود می شود. هر فرجه ای دارای یک نیمساز است. طریق رسم نیمساز فرجه به شرح زیر است: برای فرجه مفروض زاویه مسطحه ای رسم می کنیم (شکل ۱۷۴)، سپس نیمساز این زاویه را نیز رسم می کنیم. نیم صفحه ای که بوسیله یال فرجه و این نیمساز تعریف می شود دقیقاً نیمساز فرجه مفروض بحساب می آید. حال این حکم را ثابت می کنیم.

اثبات: صفحه زاویه aOb (شکل ۱۷۲) بر l ، یال مشترک فرجه های $\alpha l\delta$ و $\delta l\beta$ عمود است. این امر بدین معنی است که زوایای aOc و cOb زوایای مسطحه این فرجه ها هستند. خط c نیمساز زاویه aOb بوده و بنابراین $\alpha l\delta$ و $\delta l\beta$ برابر خواهند بود؛ یعنی δ نیمساز فرجه $\alpha l\beta$ است.




شکل ۱۷۲

به آسانی می توان دریافت که نیمساز هر زاویه مسطحه یک فرجه به نیمساز آن فرجه متعلق است. نیمساز فرجه دارای تعدادی ویژگی مشابه با نیمساز زاویه مسطحه است.

مثال ۵ • ثابت کنید نیمساز یک فرجه عبارت از مجموعه ای از نقاط داخل آن فرجه است که فواصل آنها از صفحات وجوه فرجه متساوی است.

اثبات • مجموعه نقاطی از داخل فرجه را که از صفحات وجوه فرجه به یک فاصله هستند با X و نیمساز فرجه را با δ نشان می دهیم. ثابت می کنیم که هر نقطه مجموعه X به نیمساز تعلق دارد؛ یعنی $X \subset \delta$ است. ابتدا این نکته را مورد توجه قرار می دهیم که یال l فرجه (شکل ۱۷۳a) هم به مجموعه X و هم به نیمساز δ تعلق دارد. بدیهی است که هیچیک از نقاط مجموعه X که به هر دو فرجه متعلق هستند در خارج یال l قرار ندارند. حال نقاط داخلی فرجه را مورد ملاحظه قرار می دهیم. فرض می کنیم که $M \in X$ باشد. صفحه γ را از نقطه M عمود بر یال l رسم می کنیم (شکل ۱۷۳a). زاویه مسطحه aOb برشی برای فرجه محسوب می شود. فرض کنید که MM_1 و MM_2 بر خطوط محتوی نیمخط های a و b عمود باشند.

آنگاه MM_1 و MM_2 بر صفحات وجوه فرجه عمود بوده و از این رو بدلیل $|MM_1| = |MM_2|$ خواهد بود. این امر بدین معنی است که نقطه M زاویه aOb از خطوطی که محتوی آن زاویه است بیک فاصله می باشند. از همدسه مسطحه می دانیم که در این حالت نقطه مزبور به نیمساز زاویه aOb تعلق دارد. پس این نقطه به نیمساز δ تعلق داشته و بدین ترتیب $X \subset \delta$ ثابت می گردد.



شکل ۱۷۳

توجه • همانطوریکه ثابت شد، OM نیمساز زاویه مسطحه aOb بوده و بنابراین نیم خط OM با نیم خط های a و b زوایای حاده تشکیل می دهد. از اینرو نتیجه می شود که پای عموهای MM_1 و MM_2 بترتیب روی نیم خط های a و b قرار دارند. شکل ۱۷۳a این موضوع را نشان می دهد. حال ثابت می کنیم که هر نقطه نیمساز به مجموعه X تعلق دارد؛ یعنی $\delta \subset X$ است. همچنانکه مورد ملاحظه قرار گرفت نقاط l هم به نیمساز و هم به مجموعه X تعلق دارد. فرض می کنیم که نقطه M نقطه ای دلخواه از نیمساز بوده و به l متعلق نباشد. مجدداً صفحه γ را از نقاط عمود عبور داده و بریال l عمود می کنیم. از تقاطع آن با فرجه زاویه مسطحه aOb بدست می آید. (شکل ۱۷۳b). نیمساز فرجه این زاویه مسطحه را در امتداد نیمساز آن قطع می کند. این امر به معنی این است که نقطه M به نیمساز زاویه aOb متعلق بوده و بنابراین از خطوط محتوی اضلاع زاویه بیک فاصله است؛ یعنی $|MM_1| = |MM_2|$ است.

عمودهای MM_1 و MM_2 وارده بر اضلاع زاویه مسطحه بر صفحات وجوه فرجه نیز عمود هستند زیرا صفحه γ بر این صفحات عمود می باشد. نقطه M از صفحات وجوه فرجه نیز به یک فاصله خواهد بود، یعنی $M \in X$ است. از این امر نتیجه می شود که $\delta \subset X$ است. بدین ترتیب $X \subset \delta$ و $\delta \subset X$ ثابت می گردد. یعنی $\delta = X$ بوده و این همان چیزی است که می باید ثابت می کردیم.


کنج سه وجهی ساده ترین نوع کنج چند وجهی است. برای تشریح یک کنج سه وجهی غالباً اندازه های زیر بکار گرفته می شود:

اندازه های سه زاویه مسطحه آن که ASB ، BSC و CSA وجوه آنها هستند (شکل ۱۷۴) و اندازه های سه فرجه تشکیل شده بریال های SA ، SB و SC . این شش اندازه باهم ارتباط دارند. بخاطر داشته باشید که برای اینکه یک کنج سه وجهی بازوای مسطحه α ، β و γ وجود داشته باشد شرط لازم و کافی این است که دورابطه زیر برقرار باشد:

$$\alpha + \beta + \gamma < 360^\circ \quad , \quad |\beta - \gamma| < \alpha < \beta + \gamma$$

(حتی اگر یکی از این شرایط برقرار نشود آنگاه کنج سه وجهی بازوای مسطحه مفروض بوجود

خواهد آمد).



شکل ۱۷۴

مثال ۶ • در کنج سه وجهی $SABC$ ، زوایای مسطحه ASB ، ASC و فرجه تشکیل شده روی یال SA برابر 60° هستند. زاویه BSC را بدست آورید.

حل • نقطه $S \neq M$ را روی یال SA اختیار کرده و خطوطی با شرایط زیر رسم می‌کنیم (شکل ۱۷۵):

$$[MN] \perp [SA] \text{ و } [MP] \perp [SA]$$

عبارت $|SM| = a$ را در نظر می‌گیریم. از مثلث‌های قائم‌الزاویه SMN و SMP درمی‌یابیم که

$$|MN| = |MP| = a\sqrt{3}, \quad |SN| = |SP| = 2a$$


است. زاویه NMP زاویه مسطحه فرجه ای با یال SA بوده و بنابراین $\angle NMP = 60^\circ$ خواهد بود.

حال در مثلث MNP به $|NP| = a\sqrt{3}$ وصول می‌یابیم.

طبق قانون کسینوس‌ها در مثلث SNP رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$\cos \angle NSP = \frac{|SN|^2 + |SP|^2 - |NP|^2}{2|SN| \cdot |SP|} = \frac{5}{8}$$

از این رابطه جواب مسئله بصورت $\angle NSP = \arccos(5/8)$ درمی‌آید.




شکل ۱۷۵

مثال ۷ • ثابت کنید نیمسازهای فرجه‌های یک کنج سه وجهی روی یک خط همدیگر را قطع می‌کنند.

اثبات • دو نیمساز مثل β_1 و β_2 را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم (شکل ۱۷۶). فصل مشترک آنها نیمخطی با رأس S است. این نیم خط را با l نشان می‌دهیم. با شرط $S \neq A$ روی نیم خط l نقطه دلخواهی مثل

A اختیار می‌کنیم. عمودهای AA_1, AA_2 و AA_3 را بر صفحات وجوه کنج وارد می‌سازیم. بدلیل $A \in \beta_1$ رابطه $|AA_2| = |AA_1|$ و نیز بدلیل $A \in \beta_2$ رابطه $|AA_3| = |AA_1|$ را داریم. این امر به معنی $|AA_2| = |AA_3|$ است؛ یعنی نقطه A از صفحات وجوه NSP و MSP بیک فاصله می‌باشد. از اینرو نتیجه می‌شود که نقطه A به نیمساز فرجه ای با یال SP متعلق است. از آنجا که A نقطه دلخواهی از نیم خط l است از اینرو کل این نیم خط به نیمساز تعلق دارد. بدین ترتیب نتیجه می‌شود که سه نیمساز فرجه ها در داخل کنج روی یک نیم خط همدیگر را قطع می‌کنند.




شکل ۱۷۶

از هندسه مسطحه می‌دانیم که نیمسازهای زوایای یک مثلث همدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند. نیمسازهای فرجه های یک کنج سه وجهی نیز ویژگی مشابهی دارند. مثال ۸ • ثابت کنید نیمسازهای فرجه های یک چهار وجهی همدیگر را در یک نقطه واقع در درون آن قطع می‌کنند.

اثبات • l را نیم خطی در نظر می‌گیریم که عبارت از فصل مشترک نیمسازهای کنج سه وجهی با رأس A است. M را نیز نقطه تقاطع این نیم خط و وجه BCD در نظر می‌گیریم (شکل ۱۷۷). دوسرپاره خط AM به دو وجه از فرجه ای با یال BC تعلق دارد و بنابراین نیمساز این فرجه پاره خط AM را قطع می‌کند.

نقطه تلاقی آنها را با O نشان می‌دهیم. نقطه O به نیم خط l متعلق بوده و در نتیجه از صفحات ABC, ABD, ACD و BCD بیک فاصله خواهد بود.

در همان حال فواصل نقطه O تا صفحه ABC و BCD نیز مساوی است، زیرا این نقطه به نیمساز فرجه ای با یال BC متعلق است. بدین ترتیب در



شکل ۱۷۷

می‌یابیم که نقطه O از همه صفحات وجوه چند وجهی بیک فاصله است؛ یعنی به نیمسازهای همه فرجه‌های چند وجهی تعلق دارد.

بخش ۱۷ • محاسبه حجم چند وجهی‌ها و حجم قسمتی از چند وجهی‌ها

مثال ۱ • برش $A_1B_1C_1$ را در هرم مثلث القاعده $SABC$ به موازات قاعده طوری رسم می‌کنیم بطوریکه $|SA_1|/|SA| = k$ باشد. اگر V و V_1 به ترتیب حجم هرم‌های $SABC$ و $SA_1B_1C_1$ باشد آنگاه $V_1 = k^3V$ را ثابت کنید.


حل • تبدیل متجانس مرکز S و با نسبت تجانس k را در نظر می‌گیریم. مثلث $A_1B_1C_1$ (شکل ۱۷۸) تصویر مثلث ABC تحت این تبدیل بشمار می‌رود زیرا

$$|SB_1|/|SB| = |SC_1|/|SC| = |SA_1|/|SA| = k$$

است. در نتیجه $S_{A_1B_1C_1} = k^2 S_{ABC}$ خواهد بود. فرض کنید SO ارتفاع هرم $SABC$ بوده و $O_1 = |SO| \cap (A_1B_1C_1)$ باشد. آنگاه SO_1 ارتفاع هرم $SA_1B_1C_1$ بوده و $|SO_1| = k|SO|$ خواهد بود. از اینرو نتیجه می‌شود که:

$$V_1 = \frac{1}{3} |SO_1| S_{A_1B_1C_1} = k^3 \cdot \frac{1}{3} |SO| \cdot S_{ABC} = k^3V$$


و این همان چیزی است که می‌بایست ثابت می‌کردیم.



شکل ۱۷۸

توجه • (۱) اگر یک هرم دلخواه با قاعده چند ضلعی مورد ملاحظه باشد بدیهی است که همین نتیجه

بالا را بدست خواهیم آورد زیرا این نوع هرم را نیز می‌توان به عنوان اجتماع چندین هرم مثلث القاعده در نظر گرفت (شکل ۱۷۹)



شکل ۱۷۹

(۲) با استفاده از نتیجه حاصله در حل مثال ۱ برای محاسبه حجم هرم ناقص می‌توان به آسانی فرمولی به صورت زیر استنتاج کرد که در آن ارتفاع هرم ناقص و S_1 و S_2 مساحت قاعده‌های هرم ناقص است:

$$V = \frac{1}{3} H (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

در محاسبه حجم منشور علاوه بر فرمول $V = H \cdot Q$ که در آن H ، ارتفاع منشور و Q مساحت قاعده آن است، می‌توان از فرمول $V = l \cdot S$ نیز استفاده کرد. در این فرمول l ، طول یا جانبی و S ، مساحت برش قائم منشور است.

مثال ۲ • حجم منشور مثلث القاعده $ABC A_1 B_1 C_1$ برابر V است. نقاط M و N را بر ترتیب روی یال‌های BB_1 و CC_1 طوری انتخاب می‌کنیم که $|BM|/|BB_1| = m$ ، $|CN|/|CC_1| = n$ باشد. حجم چند وجهی $ABC A_1 MN$ (هرم ناقص) را بیابید.

حل • فرض می‌کنیم که $A_2 B_2 C_2$ برش قائم منشور (شکل ۱۸۰) و $A_2 D$ ، ارتفاع همان برش باشد. با در نظر گرفتن عبارات $|AA_1| = l$ ، $|B_2 C_2| = a$ ، $|A_2 D| = h$ روابط زیر را داریم:

$$|BM| = ml, \quad |CN| = nl, \quad |B_1 M| = (1 - m)l, \quad |C_1 N| = (1 - n)l$$

حجم هرم $A_1 B_1 C_1 NM$ را بدست می‌آوریم. قاعده این هرم عبارت از دوزنقه $B_1 C_1 NM$ است. ارتفاع دوزنقه برابر $|B_2 C_2|$ یعنی برابر a است. مساحت این دوزنقه را بدست می‌آوریم:

$$S_{tr} = \frac{1}{2} (|B_1 M| + |C_1 N|) \cdot a = \frac{2 - m - n}{2} al$$

توجه داریم که پاره خط $A_2 D$ بر صفحه $BB_1 C_1 C$ عمود بوده و از این رو ارتفاع مرسوم از رأس A_1 در هرم $A_1 B_1 C_1 NM$ برابر $|A_2 D| = h$ خواهد بود. بنابراین نتیجه می‌شود که اگر V_1 حجم هرم باشد آنگاه $V_1 = \frac{1}{3} h \cdot S_{tr} = \frac{1}{6} (2 - m - n) lah$ خواهد بود. حال مساحت برش قائم منشور را بدست می‌آوریم:


$$S = \frac{1}{2} ah$$

این امر بدین معنی است که حجم کل منشور را می‌توان با فرمول $V = \frac{1}{2} lah$ بیان کرد. با مقایسه عبارات مربوط به V_1 و V درمی‌یابیم که $V_1 = \frac{1}{3} (2 - m - n) V$ است. آنگاه متوجه می‌شویم که V_2 ، حجم چند وجهی $ABC A_1 MN$ چنین است:

$$V_2 = V - V_1 = \frac{1 + m + n}{3} V$$

برای محاسبه حجم یک چند وجهی اغلب از تبدیل و تکمیل آن چند وجهی به یک هرم یا منشور، و تقسیم چند وجهی به این اشکال فضایی استفاده می‌شود.

مثال ۳ • از رأس A و میانگانه یال‌های BB_1 و $B_1 C_1$ در منشور مثلث القاعده $ABC A_1 B_1 C_1$ برشی رسم



شکل ۱۸۰

می‌کنیم. این برش منشور را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. نسبت حجم‌های آنها را پیدا کنید.
 حل • برش را رسم می‌کنیم. میانگاه یال‌های BB_1 و B_1C_1 را با M و N نشان می‌دهیم (شکل ۱۸۱).
 نقاط $(MN) \cap (CC_1) = S$ و $(SA) \cap (A_1C_1) = P$ را مشخص می‌کنیم. برش حاصل عبارت از چهار ضلعی $AMNP$ خواهد بود. حجم منشور را با V و حجم بخششی از آن را که شامل یال CC_1 است با V_1 نشان می‌دهیم. روش رسم برش طریق بیان V_1 را بر حسب V نشان می‌دهد.
 نقطه $L = (MN) \cap (BC)$ را مشخص می‌کنیم.

برای یافتن V_1 بایستی حجم هرم‌های $SPNC_1$ و $MALB$ را از حجم هرم $SALC$ کم کنیم. و این حجم‌ها را می‌توان به آسانی بر حسب منشور بیان کرد. ارتفاع منشور را با H ، مساحت قاعده را با Q و حجم هرم‌های $SALC$ ، $SPNC_1$ و $MALB$ را به ترتیب با V_2 ، V_3 ، V_4 نشان می‌دهیم. M و N میانگاه یال‌ها بوده و $|BL| = \frac{1}{2}|BC|$ ، $|CL| = \frac{3}{2}|BC|$ را داریم.
 از اینرو نتیجه می‌شود که $S_{ALC} = \frac{3}{2}Q$ است. از این گذشته داریم:

$$|SC| = \frac{3}{2}|CC_1| \quad \text{و} \quad |SC_1| = \frac{1}{2}|CC_1|$$

این امر بدین معنی است که ارتفاع هرم $SALC$ برابر $\frac{3}{2}H$ است.

رابطه $V_2 = \frac{3}{4}HQ$ با $V_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}H \times S_{ALC} = \frac{3}{4}HQ$ یعنی $V_2 = \frac{3}{4}V$ حاصل می‌شود. هرم $SPNC_1$ با نسبت $k = \frac{1}{3}$ ($|SC_1|/|SC| = 1/3$) متجانس هرم $SALC$ است.

از اینجا $V_3 = k^3 V_2 = \frac{1}{36}V$ استنتاج می‌شود. نقطه M میانگاه یال BB_1 بوده و ارتفاع هرم $MALB$ برابر $\frac{1}{2}H$ است. با توجه به $|BL| = \frac{1}{2}|BC|$ نتیجه می‌شود که $S_{ALB} = \frac{1}{2}Q$ است.

از این رابطه نتیجه می‌شود که:


$$V_4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}H \cdot \frac{1}{2}Q = \frac{1}{12}H \cdot Q = \frac{1}{12}V$$

آنگاه $V_1 = V_2 - V_3 - V_4 = \frac{23}{36}V$ حاصل می‌شود.

حجم قطعه‌ای از هرم که شامل یال AA_1 است معادل $V - V_1 = 13/36V$ می‌باشد.

بنابراین نسبت حجم‌های قطعات آن معادل $13/23$

خواهد بود.



شکل ۱۸۱

بخش ۱۸ • مسائلی در مورد ترکیب چند وجهی‌ها

مثال ۱ • طول ضلع قاعده هرم مربع القاعده منتظمی برابر a و ارتفاع هرم نیز برابر h است. مکعبی را در

درون هرم طوری محاط می‌کنیم که چهار رأس آن روی قاعده هرم و چهار رأس دیگر آن روی وجوه جانبی هرم قرار گیرد، و نیز چهار یال از مکعب نیز موازی قطر قاعده هرم باشد. طول یال این مکعب را بدست آورید.

حل • فرض می‌کنیم که چهار یال از مکعب موازی قطر AC از قاعده هرم باشد (شکل ۱۸۲). این یال‌ها را با P_1Q_1, M_1N_1, PQ, MN نشان می‌دهیم. طول یال مطلوب مکعب را با b مشخص می‌کنیم. برشی از هرم را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم که با قاعده بالائی مکعب ایجاد شده است ($A_1B_1C_1D_1$ در شکل ۱۸۲). این چهار ضلعی مربع بوده و یال‌های M_1N_1 و P_1Q_1 مکعب با قطر A_1C_1 موازی است. از اینرو $\angle N_1M_1B_1 = \pi/4$ حاصل می‌شود. از این نکته به $\angle Q_1M_1A_1 = \pi/4$ وصول می‌یابیم؛ یعنی مثلث قائم الزاویه $M_1A_1Q_1$ متساوی الساقین نیز هست. از این گذشته مثلث‌های $M_1B_1N_1$ و $M_1A_1Q_1$ مساوی هستند زیرا وترهای آنها مساوی هستند: $|M_1N_1| = |M_1Q_1| = b$. این امر به معنی $|B_1M_1| = |A_1M_1|$ است. از اینرو $|A_1C_1|/2 = |M_1N_1| = b$ استنتاج می‌شود.

حال این نکته را مورد استفاده قرار می‌دهیم که فاصله بین صفحات $ABCD$ و $A_1B_1C_1D_1$ برابر b است. فرض می‌کنیم که SO ارتفاع هرم بوده و $O_1 = [SO] \cap (A_1B_1C_1D_1)$ باشد. چنین داریم:


$$|OO_1| = b, \quad |SO_1| = h - b, \quad |SO_1|/|SO| = (h - b)/h$$

از اینرو $|A_1C_1|/|AC| = (h - b)/h$ استنتاج می‌شود.

با منظور کردن $|A_1C_1| = 2b$, $|AC| = a\sqrt{2}$ رابطه $2b/a\sqrt{2} = (h - b)/h$ حاصل می‌شود که از آن نیز $b = ha/(a + \sqrt{2}h)$ بدست می‌آید.

پس جواب مسئله عبارت از $ah/(a + \sqrt{2}h)$ خواهد بود.

توجه داشته باشید که در حل این مسئله محاسبات و استدلال‌ها را با این فرض انجام دادیم که موقعیت‌های مفروض برای هرم و مکعب در صورت مسئله امکان‌پذیر است. از حل مسئله استنتاج می‌شود که چنین مکعبی را می‌توان در هرم مفروض محاط کرد. در حقیقت برشی از هرم را به موازات قاعده آن از نقطه A_1 متعلق به یال SA طوری رسم می‌کنیم که $\frac{|SA_1|}{|SA|} = \frac{\sqrt{2}h}{a + \sqrt{2}h}$ باشد.



شکل ۱۸۲

به آسانی می‌توان ثابت کرد میانگانه‌های اضلاع برش و پای عمودهای مرسوم از این نقاط بر صفحه قاعده هرم، رؤس مکعب مفروض در مسئله است.

از حل مسئله فوق استنتاج می‌شود که این نوع مکعب منحصر بفرد است.

مثال ۲ • طول ضلع قاعده منشور مثلث القاعده منتظم $ABCA_1B_1C_1$ برابر a است. دویال چهار وجهی منتظمی روی خطوط مستقیم A_1B و B_1C قرار دارد. طول یال این چهار وجهی را بدست آورید.

حل • بدیهی است خطوط A_1B و B_1C شامل یال های متناظر چند وجهی است. ولی این یال ها در چهار وجهی منتظم متعامد بوده (مثال ۲ بخش ۱۱) و در نتیجه خطوط A_1B و B_1C نیز باید متعامد باشند. این شرط ما را مجاز می دارد تا l ، طول یال جانبی مکعب را بدست آوریم. می دانیم که طول عمود مشترک یال های متناظر یک چهار وجهی منتظم برابر $b/\sqrt{2}$ است که در آن طول b یال چهار وجهی است (نتیجه مثال ۲ بخش ۱۱). این امر بدین معنی است که اگر فاصله بین خطوط A_1B و B_1C برابر d باشد آنگاه $b = d\sqrt{2}$ خواهد بود. حال با توجه به شرط ارائه شده در بالا، l ، طول یال جانبی منشور را بدست می آوریم. قطر B_1C را روی صفحه AA_1B_1B تصویر می کنیم. تصویر آن عبارت از خط B_1M (شکل ۱۸۳a) است که در آن M میانگه یال AB محسوب می شود. رابطه $(A_1B) \perp (B_1C)$ موجب $(A_1B) \perp (B_1M)$ می شود. در این حالت مثلث های قائم الزاویه MB_1B و A_1BA متشابه بوده و بنابراین $|MB_1|/|AA_1| = |MB|/|AB|$ خواهد بود. از این رابطه $l^2 = a^2/2$ ، $l = a/\sqrt{2}$ نتیجه می شود. حال فاصله بین خطوط A_1B و B_1C را تعیین می کنیم. خط B_1D را بصورت $[A_1B] \parallel [B_1D]$ رسم می کنیم (شکل ۱۸۳b). فاصله مطلوب برابر فاصله نقطه B از صفحه DB_1C است، یعنی برابر ارتفاع هرم BDB_1C مرسوم از رأس B است. حال به یافتن حجم هرمی مبادرت می کنیم که وجه DBC قاعده آن است. چنین داریم: $V = a^3/4 \sqrt{6}$.

حال با منظور کردن وجه DB_1C به عنوان قاعده هرم نتیجه می شود که:

$$|DB_1| = |BA_1| = |B_1C| = \sqrt{a^2 + \frac{1}{2}a^2} = a\sqrt{\frac{3}{2}}$$



مثلث DB_1C بدلیل $(A_1B) \parallel (DB_1)$ و $(A_1B) \perp (B_1C)$ ، قائم الزاویه است. این امر به معنی

$$S_{DB_1C} = \frac{1}{2} |DB_1| \cdot |B_1C| = \frac{3a^2}{4}$$

است. با جاگذاری مقادیر V و S_{DB_1C} در فرمول $V = \frac{1}{3}d \cdot S_{DB_1C}$ به $d = a/\sqrt{6}$ وصول می یابیم.

در تجزیه و تحلیل نهایی درمی یابیم که $b = d/\sqrt{2} = a/\sqrt{3}$ است. و در نتیجه جواب مسئله عبارت

از $a/\sqrt{3}$ خواهد بود.



(a)

(b)

بدیهی است که وقتی یال جانبی منشوری دارای طول حاصله در بالا باشد آنگاه با ترتیب ارائه شده در فرض مسئله می‌توان یک چند وجهی منتظمی را با آن ترکیب کرد. در اینصورت اقطار A_1B و B_1C متعامد خواهند بود. با جدا کردن پاره خط‌هایی بطول $b/2 = a/2 \sqrt{3}$ بر روی هر یک از خطوط A_1B و B_1C از طرف پای عمود مشترک آنها چهار نقطه حاصل می‌شود که رئوس چند وجهی منتظم بشمار می‌روند.

مسائل

۵۷۲ • ثابت کنید صفحه متعامد بر هر یک از دو صفحه متقاطع بر فصل مشترک آنها نیز عمود خواهد بود.

۵۷۳ • هم‌ارزی گزاره‌های زیر را ثابت کنید

(a) طول یال‌های جانبی یک هرم مساوی است؛

(b) یال‌های جانبی هرم با صفحه قاعده آن زوایای متساوی درست می‌کنند.

(c) بر قاعده هرمی می‌توان یک دایره محیط کرد؛ ارتفاع هرم از مرکز این دایره می‌گذرد.

۵۷۴ • ثابت کنید صفحات متعامد بر یال‌های یک چهار وجهی که از میانگاه آنها عبور می‌کنند در یک نقطه مشترک اند.

۵۷۵ • طول ضلع قاعده هرم منتظم $SABCD$ برابر a و طول یال جانبی آن برابر l است. برشی از هرم را رسم کنید که بر یال جانبی SC عمود بوده و از میانگاه آن عبور کند.

اگر $l = \sqrt{\frac{5}{2}} a$ (b) ، $l = \sqrt{\frac{3}{2}} a$ (a) باشد آنگاه مساحت برش را محاسبه کنید.

۵۷۶ • از قطر AD_1 وجه AA_1D_1D در مکعب $ABCDA_1B_1C_1D_1$ برشی را عمود بر صفحه BC_1D رسم می‌کنیم. این برش مکعب را به دو قسمت تقسیم می‌کند. نسبت حجم‌های آنها را بیابید.

۵۷۷ • یال جانبی SB از هرم مربع القاعده منتظم $SABCD$ با صفحه قاعده زاویه $\frac{\pi}{4}$ درست می‌کند. زاویه بین این یال و صفحه SCD را بیابید.

۵۷۸ • ثابت کنید ρ ، فاصله نقطه $M_0(x_0; y_0; z_0)$ از صفحه α با معادله $ax + by + cz + d = 0$ را می‌توان از طریق فرمول $\rho = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ محاسبه کرد.

۵۷۹ • مختصات رئوس قاعده هرم منتظم $SABC$ به صورت زیر مفروض اند: $A(5, 1, -1)$ ، $B(5, -2, -1)$ و $C(2, -2, -1)$. رأس S هرم در صفحه مختصاتی Oyz قرار دارد. فاصله بین خطوط AC و SB را بیابید.

۵۸۰ • خط مستقیمی وجوه γ_1 و γ_2 از یک وجه را به ترتیب در نقاط A و B قطع می‌کند. این خط با صفحه وجه γ_1 زاویه $\pi/6$ و با صفحه وجه γ_2 زاویه $\arcsin 0.7$ می‌سازد. اندازه فرجه برابر $\pi/3$ است. زاویه بین خط AB و یال فرجه را بدست آورید.

۵۸۱ • در هرم چهارگوش $SABCD$ که قاعده آن متوازی الاضلاع $ABCD$ است برشی را از یال AB

و میانگاه M بال SC رسم کرده ایم. این برش هرم را به دو قسمت تقسیم کرده است نسبت حجم های آنها را بدست آورید.

۵۸۲ • حجم یک چهاروجهی برابر V است. همه رئوس یک متوازی السطوح روی سطح چهاروجهی قرار دارد. سه وجه متوازی السطوح به سه وجه چهارضلعی متعلق است. بیشترین مساحت ممکنه برای چنین متوازی السطوحی را بدست آورید.

راهنمایی ها و راه حل های مسائل

فصل ۱

$$8\sqrt{10} \text{ cm و } 9\sqrt{5} \text{ cm} \bullet 4 \quad .42 \text{ cm و } 56 \text{ cm} \bullet 3 \quad .2m \text{ و } m, m\sqrt{3} \bullet 2$$

$$.25 \text{ cm و } 20 \text{ cm} \bullet 8 \quad .10 \text{ cm} \bullet 7 \quad \frac{mn(m+n)}{m^2+n^2} \bullet 6 \quad \frac{ab\sqrt{2}}{a+b} \bullet 5$$

$$\bullet 9 \quad \frac{m(m-n)\sqrt{2}}{\sqrt{m^2+n^2}} \text{ و } \frac{m(m+n)\sqrt{2}}{\sqrt{m^2+n^2}} \bullet 9 \quad \bullet 10 \quad \arctan\left(\frac{1}{2}\tan\alpha\right) - \frac{\alpha}{2}$$

$$\bullet 11 \quad \frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{1+2\sqrt{2}}{4}$$

عبارات $AB=c$ و $\angle A=2x$ را در نظر بگیرید. ساق ها و سپس نیمسازهای زوایای مثلث را برحسب c و x بیان کنید.

۱۲. با منظور کردن $\angle ACK = \angle ACB = \alpha$ (ارتفاع CK ، ارتفاع CM ، میانه و $AC < BC$ است)، $CK = h$ و $\angle ACB = x$ پاره خط های AK ، BK ، MK را برحسب h ، α و x بیان کنید. تساوی

$2MK = BK - AK$ را در نظر بگیرید. به مثال ۱۰ بخش ۳ نیز مراجعه کنید.

$$.7.2 \text{ cm} \bullet 18 \quad .9 \frac{1}{3} \text{ cm} \bullet 17 \quad .\sqrt{10} \text{ cm} \bullet 16 \quad .6 \text{ cm} \bullet 15$$

$$\bullet 19 \quad \frac{l}{2 \sin\left(45^\circ + \frac{\alpha}{4}\right) \cos\left(45^\circ - \frac{3\alpha}{4}\right)} \quad \bullet 20 \quad \frac{2 \sin(\alpha - 30^\circ)}{\cos \alpha}$$

$$\bullet 21 \quad \frac{\sqrt{1+8\cos^2\alpha}}{4\cos\alpha} \quad \bullet 22 \quad \arccos \frac{1}{3}, \arccos \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ و } \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\bullet 23 \quad \frac{2\sqrt{3(p^2+q^2+pq)}}{3}$$

۲۴. از نقطه E خطی بصورت $EF \parallel AB$ رسم می کنیم (نقطه F روی AC قرار دارد) و نتایج ضروری را از متوازی الاضلاع $DBEF$ بدست می آوریم.

$$\bullet 26 \quad 1:2 \quad \bullet 25 \quad \frac{a}{2}(\sqrt{5}+1)$$

در مثلث ADC میانخط را رسم کنید.

$$\arctan \frac{1}{13} \bullet ۲۹ \quad \arcsin \frac{\sqrt{21}}{14} \text{ و } \arcsin \frac{\sqrt{21}}{7} \bullet ۲۸ \quad \bullet ۲۷ \quad \frac{a \cos \alpha}{\sin \left(45^\circ + \frac{3\alpha}{2} \right)}$$

$$\bullet ۳۰ \quad \arcsin \frac{72}{97}$$

۳۱ • 85° از نقطه M عمودهای MK ، ML و MN را بترتیب بر اضلاع AB ، AC و BC وارد می‌کنیم. با در نظر گرفتن $\angle BMC = x$ و $AM = k$ خط MN را به عنوان عنصر مرجع به دو طریق برحسب k و x بیان می‌کنیم.

$$\bullet ۳۷ \quad 40^\circ \text{ و } 25^\circ \quad \bullet ۳۸ \quad 8 \text{ cm یا } 2\sqrt{6} \text{ cm، } 4\sqrt{6} \text{ cm و } 6 \text{ cm؛ منفرجه.}$$

$$\bullet ۳۹ \quad 0.75 \quad \bullet ۴۰ \quad \text{قائم الزاویه.} \quad \bullet ۴۱ \quad \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{5}} \quad \bullet ۴۲ \quad \sqrt{b(b+c)}$$


$$\bullet ۴۳ \quad 10 \text{ cm.} \quad \bullet ۴۴ \quad 3\sqrt{5} \text{ cm، } 10 \text{ cm و } 11 \text{ cm.}$$

$$\bullet ۴۵ \quad \arcsin \sqrt{\frac{k}{2(k-1)}} \text{، اگر } k > 2 \text{ باشد؛ در صورت } 1 < k \leq 2 \text{ جواب وجود ندارد.}$$

$$\bullet ۴۶ \quad \frac{\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha}}{\sin \alpha} \quad \bullet ۴۷ \quad 45^\circ$$

۴۴ • حالت‌هایی را با مثلث متساوی الاضلاع، متساوی الساقین و قائم الزاویه در نظر بگیرید. در مورد مثلث اختیاری گزاره مثال ۸ بخش ۲ را مورد استفاده قرار دهید.

۴۵ • دو مثلث را همچون شکل ۱۸۴ کنار هم قرار داده و خطی بصورت $C'D \parallel BC$ رسم کنید. از تشابه مثلث‌های ABC و $AC'D$ استفاده کنید.



شکل ۱۸۴

۴۶ • زاویه‌ها را با x ، $2x$ و $4x$ نشان داده و بوسیله قانون سینوس‌ها، ضلع بزرگتر مثلث را برحسب ضلع کوچکتر بیان کنید.

۴۷ • 90° ، $22^\circ 30'$ و $67^\circ 30'$. ارتفاع، نیمساز و میانه مثلث ABC را بترتیب با CH ، CD و CM نشان دهید. با قراردادن $\angle C = 4x$ از $CH = h$ و $AH + MH = BH - MH$ استفاده کنید. همه عناصر این تساوی را برحسب h و x بیان کنید.

۴۸ • $A + B = 90^\circ$ یا $A - B = 90^\circ$. $AD \perp AB$ و BD را برحسب ارتفاع h و زوایای A و B بیان کنید. دو حالت را مورد ملاحظه قرار دهید: A زاویه حاده یا A یک زاویه منفرجه است.

۵۹. $\frac{2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}}{\sin \alpha}$. از نقطه K خطی بصورت $MP \parallel AC$ رسم کنید (نقطه M روی AB

و نقطه P روی BC قرار داد). عبارت $MK = KP = PC = a$ را منظور کنید. پاره خط KC از مثلث KPC را بر حسب a ، α و β و پاره خط EK از مثلث MEK بیان کنید.

۶۱. مستطیل، $a-b$ ، $\sqrt{2(2m^2+3mn+n^2)}$ و $\sqrt{2n(m+n)}$ • ۶۲

۶۳. $\sqrt{337}$ cm, 21 cm, 10 cm, 17 cm • ۶۴ $\frac{\sqrt{p^2+q^2+2pq \cos \alpha}}{\sin \alpha}$ • ۶۵

۶۵. $2\sqrt{2} \cos \frac{\pi(m-n)}{4(m+n)}$ • ۶۶ $\frac{b \sin \alpha}{a+b \cos \alpha}$ و $\frac{a \sin \alpha}{b+a \cos \alpha}$ • ۶۷

• ۶۷ $\arccos \frac{7}{18}$

۶۸. $\arcsin \frac{4-k^2}{k^2}$ و $-\pi - \arcsin \frac{4-k^2}{k^2}$ در صورت $2 < k < \sqrt{2}$ ؛ اگر $k < \sqrt{2}$ یا $k \geq 2$

باشد جواب وجود نخواهد داشت.

۶۹. اضلاع متوازی الاضلاع را با a و ka ، اقطار آن را با d و ka نشان دهید. با استفاده از فرمولی که اضلاع و اقطار متوازی الاضلاع را بهم مربوط می‌سازد رابطه بین a و d را پیدا کرده و سپس از قانون کسینوس ها دوباره استفاده کنید.

۷۰. با قرار دادن $\angle APB = \alpha$ ، $\angle ADB = \beta$ ثابت کنید که $\tan(\alpha+\beta) = 1$ است.

• ۷۱ $\sqrt{a^2+b^2+2b(\sqrt{a^2-b^2} \sin^2 \alpha \cos \alpha + b \sin^2 \alpha)}$

برای پیدا کردن زاویه منفرجه بین ضلع کوچکتر و قطر کوچکتر از قانون سینوسها استفاده کرده و سپس با استفاده از قانون کسینوسها قطر را پیدا کنید.

• ۷۲ $\arccos \frac{(p^2+q^2)(n^2-m^2)}{2pq(n^2+m^2)}$ و $\pi - \arccos \frac{(p^2+q^2)(n^2-m^2)}{2pq(n^2+m^2)}$


اضلاع متوازی الاضلاع را با px و qx و اقطار آن را با my و ny نشان دهید. از فرمولی که اقطار و اضلاع آن را بهم مربوط می‌سازد استفاده کرده و سپس قانون کسینوس ها را برای بیان یکی از اقطار بر حسب اضلاع مورد کاربرد قرار دهید.

۷۳. اگر $k > 2$ باشد آنگاه $3 \arccos \frac{2+k}{2k}$ و $\pi - 3 \arccos \frac{2+k}{2k}$ خواهد بود؛ اگر $k \leq 2$

باشد جواب وجود نخواهد داشت.

تساوی های $BC = a$ ، $AB = b$ و $AC = d$ را در نظر می‌گیریم (شکل ۱۸۵). نیمساز CK را در مثلث ADC رسم می‌کنیم. AK و CK از مثلث متساوی الساقین ACK را بر حسب α و $\angle ACK = x$ بیان می‌کنیم. از تشابه مثلث های ABC و CKD رابطه $\frac{a}{b} = 2 \cos x$ را استنتاج می‌کنیم. با استفاده از قضیه

مربوط به نیمساز مثلث ACD رابطه $d = 2a \cos x - b$ را استنتاج می‌کنیم. با اضافه کردن شرط مسئله یعنی $\cos x = \frac{k+2}{2k}$ به روابط حاصله، عناصر a ، b و d را از تساوی‌ها حذف کرده و رابطه $d = \frac{2}{k}(a+b)$ را بدست می‌آوریم.



شکل ۱۸۵

$$\frac{bc}{a+b} \text{ و } \frac{ab}{a+b}, \frac{ac}{a+b} \bullet ۸۱ \quad \bullet ۸۰ \text{ cm} \bullet ۱۶ \quad \bullet ۷۹ \text{ cm} \bullet ۱۵ \quad \bullet ۷۸$$


$$\bullet ۸۲ \text{ cm} \bullet ۱۴ \text{ cm}, ۱۲.۵ \text{ cm} \text{ و } ۲۰.۴ \text{ cm} \bullet ۱۶.۹ \text{ cm} \bullet ۸۳ \cot \alpha \bullet ۸۴ \bullet ۱.۵$$

$$\frac{b^2 + ab - c^2}{b} \bullet ۸۶ \quad \arctan \left(\frac{\sin \alpha}{2 + \cos \alpha} \right) \bullet ۸۵$$

۸۷ در مثلث متساوی الاضلاع AOD خط KD بر AC عمود بوده و $KP = 0.5CD$ است. نتیجه مشابهی رامی‌توان در مورد MP بدست آورد.

$$\bullet ۸۸ \quad BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cdot \cos A \text{ و } AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cdot \cos D$$


(شکل ۱۸۶). این تساوی‌ها را تجمیع کرده و AK و MD را بر حسب AB ، CD و زوایای A و D بیان کرده و رابطه $MD + AK = AD - BC$ را بکار بگیرید.



شکل ۱۸۶

۸۹ از نقطه M محل تلاقی اقطار دوزنقه خطی بصورت $EF \parallel AD \parallel BC$ رسم کنید (شکل ۱۸۸).

$$\text{از نسبت های } EM = MF, EM = \frac{BE}{AB} = \frac{EM}{AD} = \frac{CF}{CD} = \frac{MF}{AD} \text{ بدست می آید.}$$



شکل ۱۸۷

$$\bullet ۹۰ \quad \frac{2ab}{a+b} \text{ . به راهنمایی مسئله قبل مراجعه کنید.}$$

۹۱ 40 cm ثابت کنید که AKB و CED زوایای قائمه بوده و میانه دوزنقه روی خط KE قرار دارد (به مسئله ۷۶ مراجعه کنید).

۹۲. پاره خط OK را از مثلث قائم الزاویه OCD بدست آورید.

در مثلث OAB خطوطی بصورت $OP \perp AP$ رسم کرده و زوایای تشکیل شده از این رسم را مورد ملاحظه قرار دهید. ثابت کنید که $OM = EM$ و $CM = AM$ است.

$$\arccos \frac{2\sqrt{5}}{5} \bullet 100 \quad 18 \text{ cm و } 9\sqrt{3} \text{ cm, } 9 \text{ cm} \bullet 97 \quad \frac{4ab}{a+b} \bullet 96$$

$$2 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) \bullet 101$$

۱۰۲. از این نکته ها استفاده کنید که $PKLM$ که L, K, P و M میانگاه اضلاع متوالی چهارضلعی است) و PEF متوازی الاضلاع هستند (E و F میانگاه اقطار چهارضلعی است).

۱۰۳. از ملاحظات بکاررفته در مسئله قبل استفاده کنید.

۱۰۴. خلاف آن را در نظر بگیرید: یکی از زوایای بین اقطار حاده و دیگری منفرجه است. از قضیه ۹ بخش ۱ استفاده کنید.

۱۰۵. قطر را رسم کرده و ثابت کنید میانگاه آن روی پاره خط مفروض قرار دارد.

$$90^\circ \text{ و } 150^\circ \bullet 107 \quad 2a\sqrt{7} \bullet 106$$

۱۰۸. $\arctan \frac{11}{3}$. تانژانت های زوایای BAO ، OAD ، ODA و ODC را محاسبه کرده و بوسیله آنها تانژانت زاویه M را بدست آورید.

۱۰۹. عبارات $AB = 2x$ ، $BC = 3x$ و $BD = 4\sqrt{2}x$ را در نظر بگیرید.

از مثلث ABD ، AD را برحسب x بیان کرده و قانون کسینوس ها را مورد استفاده قرار دهید. ثابت کنید که زاویه BAD منفرجه است. این زاویه را بوسیله قانون سینوسها پیدا کنید.

۱۱۰. عبارات $\angle BAE = \alpha$ ، $\angle KAD = \beta$ ، $\angle EAK = x$ ، $AD = a$ و $AB = ma$ را در نظر

بگیرید. پاره خط های BE و KD و سپس $\tan \alpha$ و $\tan \beta$ را برحسب a و m بیان کرده و $\tan x = \cot(\alpha + \beta)$ را مورد استفاده قرار دهید.

$$2\sqrt{Rr} \bullet 118 \quad \frac{a}{6}(3 \pm \sqrt{3}) \bullet 117 \quad 24 \text{ cm} \bullet 116 \quad 56^\circ \text{ و } 108^\circ, 60^\circ, 36^\circ \bullet 115$$

$$30 \text{ cm} \bullet 121 \quad 14\pi + 12\sqrt{3} \bullet 120 \quad \frac{\sqrt{14Rr - R^2 - r^2}}{2\sqrt{3}} \bullet 119$$


$$\frac{2a \sin \alpha \cos(\beta - \alpha)}{\sin \beta} \bullet 123 \quad \frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha} \bullet 122$$

۱۲۴. تشابه مثلث های ABC و ABD را بکار بگیرید.

۱۲۵. وتر AP را به موازات CD رسم کرده و از $AC = PD$ استفاده کنید.


۱۲۶. با قرارداد $OA = OB = R$ ، $\angle AOM = \alpha$ (شکل ۱۸۸) و با استفاده از قانون کسینوس ها، AM

از مثلث OAM و BM از مثلث BOM را بیان کنید.




شکل ۱۸۸

۱۲۷ • $\frac{20}{3}$ cm و $\frac{15}{4}$ cm. ثابت کنید که $\angle BAC = 90^\circ$ است. مماس مشترک داخلی را رسم کنید.
 ۱۲۸ • $\frac{R}{4} (8 - 3\sqrt{3} - \sqrt{7})$ و $\frac{R}{4} (3\sqrt{3} - \sqrt{7} - 2)$. با قرار دادن $O_1B = x$ ، قانون کسینوسها را در مورد O_2B در مثلث O_2O_1B بکار بگیرید (شکل ۱۸۹).



شکل ۱۸۹

۱۲۹ • $2\sqrt{b^2 - ((b-a)\cos\alpha - a)^2}$. عبارت $O_2K = x$ را در نظر بگیرید (شکل ۱۹۰). خط O_2P را موازی AB رسم کرده و در مثلث O_2O_1P که در آن $\angle O_2O_1P = \alpha$ است x را بر حسب a و b بیان کنید.



شکل ۱۹۰

۱۳۷ • 36 cm و 48 cm $\frac{2a(\sqrt{a^2+h^2}-a)^2}{h^2}$ • ۱۳۶ 108° و 36° • ۱۳۵

$\arccos \sqrt{\frac{2}{3}}$ • ۱۴۰ $3\sqrt{5}$ cm • ۱۳۹ 12π cm • ۱۳۸

$\frac{\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos\gamma}}{2\sin\gamma}$ • ۱۴۱

$b \tan^2 \frac{\alpha}{2}$ • ۱۴۲

۱۴۳. اگر $2 \leq k$ باشد آنگاه جواب عبارت است از

$$\arccos \frac{1 - \sqrt{1 - 2k}}{2}, \arccos \frac{1 - \sqrt{1 - 2k}}{2} \text{ و } \pi - 2 \arccos \frac{1 - \sqrt{1 - 2k}}{2} \text{ خواهد بود.}$$

۱۴۴. با استفاده از فرمول‌های $r = \frac{a+b-c}{2}$ و $h = \frac{ab}{c}$ کسر $\frac{r}{h}$ را به شکل $\frac{\sin A + \cos A - 1}{\sin 2A}$ تبدیل کنید. سپس از $\sin 2A \equiv \sqrt{(\sin A + \cos A)^2 - 1}$ استفاده کنید.

۱۴۵. ثابت کنید که مرکز ارتفاعی متقارن نقطه ای از دایره نسبت به ضلع مثلث است.

۱۴۶. نقطه K را روی AM طوری انتخاب کنید که $BM = MK$ باشد و ثابت کنید مثلث‌های ABK و BMC برابرند.

۱۴۷. از گزاره مسئله قبل استفاده کنید.


۱۴۸. شعاع دایره را با R نشان داده و عبارات $\angle ACK = \alpha$ و $\angle KCB = \beta$ را در نظر بگیرید. با استفاده از قانون سینوسها AK ، KC ، AB و KB را بر حسب R ، α و β بیان کنید.

۱۴۹. ارتباط بین کسرهای طرف چپ تساوی و کتانژانت زوایای مثلث را بدست آورید.

۱۵۰. دایره ای بر مثلث ABC محیط کرده و نقطه M را روی وتر AB اختیار کنید. خطوطی با شرایط $MD \perp BC$ و $MF \perp AB$ ، $MK \perp AC$ چهار ضلعی‌های $MAKF$ و $MFBD$ محیط کرد. ثابت کنید که $\angle AFK = \angle DFB$ است.

۱۵۱. بر محیط ABC دایره ای محیط کرده و نیمساز CD را امتداد دهید تا دایره را در نقطه P قطع کند. از تشابه مثلث‌های BCD و ACP و از رابطه $BD \cdot AD = CD \cdot DP$ استفاده کنید.

۱۵۲. ثابت کنید که $\angle BHI = \angle OBC$ است (شکل ۱۹۱). سپس از تشابه مثلث‌های ABC و BDF (D و E پای ارتفاعات است) و تشابه مثلث‌های BIA و BID استفاده کنید.



شکل ۱۹۱

۱۵۳. $(3 + \sqrt{3})cm$. از رابطه $CD \cdot AD = BD^2$ استفاده کرده و قانون کسینوس‌ها را در مورد مثلث

BAD بکار گیرید.

۱۵۵. 120°

۱۵۴. $\frac{3R\sqrt{57}}{19}$

$$\pi - \arctan \frac{\sqrt{k^2+6k+1} - k - 1}{2} \text{ و } 2 \arctan \frac{\sqrt{k^2+6k+1} - k - 1}{2} \bullet 156$$

$$\frac{ac}{a+c} \bullet 160 \quad 12 \text{ cm} \bullet 159 \quad \arccos \frac{2}{3} \bullet 157$$

$$2 \text{ cm} \bullet 163 \quad \sqrt{a^2+ab+b^2} \bullet 162 \quad 6 \text{ cm و } 4\sqrt{3} \text{ cm, } 2\sqrt{3} \text{ cm} \bullet 161$$

$$3 \text{ cm, } 2 \text{ cm} \bullet 165 \quad 2\sqrt{6} \text{ cm} \bullet 164 \quad \text{و } 120^\circ, 30^\circ, 30^\circ \bullet 166$$

$$a(\pi - \beta - \gamma) \times \frac{\sin \beta \sin \gamma}{\sin(\beta + \gamma)} \bullet 167$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm و } \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm, } 120^\circ, 30^\circ, 30^\circ \bullet 169$$

$$\bullet 170 \quad 35 \frac{35}{47} \text{ cm. نوع مثلث را تعیین کنید.}$$

$$\bullet 171 \quad M \text{ را گرانیگاه و } P \text{ را محل تلاقی } CM \text{ و } DE \text{ فرض کنید. رابطه } MP \cdot PC = PE \cdot DP \text{ را}$$

مورد استفاده قرار دهید.

$$\bullet 172 \quad a^2 + b^2 = 2c^2. \text{ نتیجه حاصله در مسئله قبل را منظور کرده و فرمول میانه } m_c \text{ بر حسب اضلاع مثلث}$$

را مورد استفاده قرار دهید.

$$\bullet 173 \quad 2 \text{ cm و } 4 \text{ cm. از این حقیقت استفاده کنید که محیط مثلث } BDE \text{ از انتخاب نقطه تماس}$$

مستقل است. قانون کسینوسها را در مورد مثلث } BDE \text{ بکار بگیرید.}

$$\bullet 174 \quad 8 \frac{1}{8} \text{ cm. ثابت کنید که مثلث های } DEC \text{ و } ABC \text{ متشابه و نیز } DE = EC = 15 \text{ cm است. از}$$

این نکته استفاده کنید که مرکز این دایره روی محل تلاقی } AD \text{ و عمود مرسوم بر میانگاه } DE \text{ قرار دارد و } \sin A = \frac{12}{13} \text{ است.}

$$\bullet 175 \quad \beta \cot \beta. \text{ از این موضوع استفاده کنید که پاره خط } BH \text{ (مرکز ارتفاعی مثلث است)}$$

محیط دایره بوده و } BH = 2OK \text{ است (به مثال ۸ بخش ۲ رجوع کنید). در این رابطه } O \text{ مرکز دایره محیطی مثلث } ABC \text{ و } OK \text{ عمود وارده از نقطه } O \text{ بر } AC \text{ است.}

$$\bullet 177 \quad 10 \frac{5}{8} \text{ cm} \quad \bullet 178 \quad \frac{\sqrt{a^2+b^2+2ab \cos^2 \alpha}}{2 \sin 2\alpha} \quad \bullet 179 \quad \frac{8R}{5}$$

$$\bullet 180 \quad 2 \cos^2 \frac{\alpha}{4}$$

$$\bullet 181 \quad \arccos \frac{k-1}{k}; \text{ در صورت } k \geq 1, \pi - \arccos \frac{k-1}{k}$$

$$\bullet 182 \quad \frac{4 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}}{\pi \sin \alpha \sin \beta}$$

$$\bullet 183 \quad (\alpha) \text{ فرض کنید که یکی از اقطار با اضلاع چهار ضلعی زوایای } \alpha, \beta, \gamma \text{ و } \delta \text{ درست کند. و } a$$


و } b, c, m, d_1, d_2 \text{ بر حسب شعاع دایره و زوایای } \alpha, \beta, \gamma, \delta \text{ را بوسیله قانون کسینوس ها بیان کنید.}

$$\bullet 184 \quad \text{فرض کنید که ارتفاعات } BD, AF \text{ و } CE \text{ در نقطه } H \text{ همدیگر را قطع کنند. بر چهار ضلعی}$$

دایره ای را محیط کرده و ثابت کنید $AC \cdot CD = CE \cdot CH = ab \cos C$ است. بطریق مشابه ثابت کنید $BD \cdot BH = ac \cos B$, $AF \cdot AH = bc \cos A$ هر یک از اضلاع a , b و c اعمال کنید.

۱۸۵ • 15 cm و 20 cm. بر مثلث مفروض دایره ای را محیط کنید.

۱۸۶ • 17 cm. قضیه فیثاغورس را در مورد مثلث OKM بکار بگیرید (شکل ۱۹۲)



شکل ۱۹۲

۱۸۷ • 2 cm و 2 cm. از این موضوع استفاده کنید که محیط مثلث AMP از انتخاب نقطه تماس مستقل است. قانون کسینوسها را در مورد AMP اعمال کنید.


۱۸۸ • اگر $k \geq \sqrt{2}$ باشد $\arcsin \frac{1}{k} \sqrt{\frac{1 + \sqrt{1 + 4k^2}}{2}}$ خواهد بود. شعاع دایره محاطی را با x و زاویه حاده دوزنقه را با x نشان دهید. اضلاع دوزنقه، قطر و سپس شعاع دایره محاطی را بر حسب x و z بیان کنید.

۱۸۹ • $2 \sqrt{4 \tan^2 \alpha + 3}$. ثابت کنید EM میانه مثلث CED بوده و بنابراین $EM = \frac{1}{2} CD$ است.

۱۹۰ • $\frac{30 \tan \alpha}{\sqrt{25 + 36 \tan^2 \alpha}}$. ثابت کنید EH بر AB عمود است.

۱۹۱ • $\sqrt{\frac{65}{2}}$. ثابت کنید $\sin \angle (A+B) < 0$ است. این امر بدین معنی است که خطوط مستقیم AD

و BC در نقطه K همدیگر را قطع می کنند که طرف چپ AB قرار دارد (شکل ۱۹۳). زوایای مثلث ODC را بدست آورید.



شکل ۱۹۳

۱۹۴ • $12 \sqrt{5}$ cm

۱۹۵ • $\sqrt{10}$ cm

۱۹۶ • $\frac{R}{2} (\sqrt{7} - 1)$

۱۹۷ • $\frac{\sin \alpha}{1 + \sin \alpha}$

۱۹۸ • $\frac{R \sin \frac{\alpha}{2}}{\sin(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{6})}$

۱۹۹ • $\frac{2}{5} R \sqrt{4 + \sin^2 \alpha} - \frac{4}{5} R \cos \alpha$

۲۰۰ • $\frac{4R \sqrt{3} \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{3}$

۲۰۱ • $\frac{2a \sqrt{ab}}{b}$

۲۰۲ • $\frac{R}{2} (\sqrt{3} \cos \alpha + \sqrt{3 + \sin^2 \alpha})$

۲۰۳ • 3 cm

$$0.6\alpha \bullet 206 \quad 4R \sin^2 \frac{\alpha}{8} \cos \frac{\alpha}{4} \bullet 205 \quad \frac{b}{2} \tan^3 \frac{\alpha}{2} \bullet 204$$

$$r \geq \frac{\sqrt{3}}{2} a, \frac{a\sqrt{3} + r - \sqrt{4r^2 + 2ar\sqrt{3}}}{3} \bullet 208 \quad \frac{6-4\sqrt{2}}{3} \text{ cm} \bullet 207$$

$$\frac{b}{4 \sin \alpha \cos^2 \frac{\alpha}{2}} \bullet 210 \quad \frac{b}{2} \tan \frac{\alpha}{2} \tan^3 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right) \bullet 209$$


$$4R \cos \frac{\alpha}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{8} \bullet 211$$

۲۱۲ فرض کنید که دایره های محیطی مثلث های ADM و BDK در نقطه P همدیگر را قطع کنند. بخاطر داشته باشید که $\angle DAM + \angle DPM = 180^\circ$ و $\angle MCK + \angle MPK = 180^\circ$ است.

ثابت کنید $\angle DBK + \angle DPK = 180^\circ$ برقرار می باشد.

۲۱۳ 120° . شعاع دایره محاطی را به عنوان عنصر مرجع برحسب عناصر خطی معلوم و $\angle AOB = 2\pi$ از دو مثلث O_1PH و O_1MB بیان کنید. P میانگاه KH و M میانگاه AB است.

۲۱۴ $R \left(\sqrt{1 - \frac{1}{3} \cos^2 \frac{\alpha}{2}} - \cos \frac{\alpha}{2} \right)$ ، اگر $\alpha \geq \frac{\pi}{3}$ باشد OC را برحسب R و α بیان کرده و قانون کسینوسها را در مورد مثلث ODC (شکل ۱۹۴) بیان کنید. در این مثلث $OD = R$ ، $CD = x$ و $\angle OCD = 150^\circ$ است.




شکل ۱۹۴

۲۱۵ $2r \tan \frac{\alpha}{2} \left(1 - \tan \frac{\alpha}{2} \right)$. قانون کسینوسها را در مورد مثلث OAO_1 اعمال کنید بطوریکه در آن O و O_1 مراکز دایره هاست.

۲۱۶ $\tan^2 \frac{\alpha}{2} \left(\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} \sqrt{r^2 + \arcsin \alpha} - r - a \cot \frac{\alpha}{2} \right)$. راهنمایی مسئله قبل را ملاحظه کنید.

۲۱۷ $\frac{\sin \frac{\alpha}{2} \left(b \cos \frac{\alpha}{2} - \sqrt{4r^2 - b^2} \sin \frac{\alpha}{2} - 2r \sin \frac{\alpha}{2} \right)}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}}$. کسینوس زاویه OAO_1 را پیدا کرده

و قانون کسینوسها را در مورد زاویه AO_1O اعمال کنید (O و O_1 مراکز دایره هاست).
 ۲۱۸ • $\frac{b+c-2\sqrt{bc}\cos\alpha}{2\sin^2\alpha}$. از روابط $AM^2 = AC \cdot AB$ (شکل ۱۹۵) و $AM = AD + DM$ استفاده کنید.



شکل ۱۹۵

۲۱۹ • $DE = \frac{b^2 - a^2}{b}$ و $R = \frac{a^2 + b^2 - 2ab\cos\alpha}{2b\sin\alpha}$. از رابطه $OC^2 = OD \cdot OE$ استفاده کنید.

قانون سینوسها و کسینوسها را در مورد مثلث های OEC ، ODC و CED اعمال کنید.

(a) 9 cm^2 ; (b) 3 cm^2 ; (c) 12 cm^2 • ۲۲۴ 360 cm^2 • ۲۲۳

$\frac{180\sqrt{3}}{19}$ • ۲۲۷ $\frac{a^2}{2}(3+2\sqrt{2})$ • ۲۲۶ 4 cm^2 • ۲۲۵

• ۲۲۸ $\frac{1}{4}c^2(q^2-1)$ ، اگر $1 < q \leq \sqrt{2}$ باشد.

$m \sin \beta (\sqrt{c^2 - m^2 \sin^2 \beta} + m \cos \beta)$ • ۲۳۰ $m^2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} \cot \alpha$ • ۲۲۹

$\frac{2\sqrt{3}\cos\alpha + \sin\alpha}{\sin\alpha}$ • ۲۳۲ $\frac{\sin(\alpha - \beta)}{2\cos\alpha \sin\beta}$ • ۲۳۱

$\frac{\tan \frac{|\alpha - \gamma|}{2} \sin\alpha \sin\gamma}{\sin(\alpha + \gamma)}$ (c) ، $\frac{\sin(\alpha - \gamma)}{2\sin(\alpha + \gamma)}$ (b) ، $\frac{\tan \frac{|\alpha - \gamma|}{2}}{2 \tan \frac{\alpha + \gamma}{2}}$ (a) • ۲۳۳

$\frac{9\sqrt{3}}{4}$ • ۲۳۵ $\frac{l(a+b)}{4ab} \sqrt{4a^2b^2 - l^2(a+b)^2}$ • ۲۳۴

• ۲۳۶ اضلاع مثلث را بر حسب R و زوایای A ، B و C (با استفاده از قانون سینوسها) بیان کرده و ثابت کنید $\sin A \sin B \sin C \leq \frac{3}{4}$ است.

• ۲۳۷ $ab\sqrt{3}$. مساحت مثلث را بدو طریق بیان کنید: بوسیله فرمول هر دو فرمول $S = pr$.

$(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$ • ۲۳۸

عبارات $CQ = y$ ، $BQ = x$ را منظور کرده و از تساوی های $\left(\frac{x+y}{y}\right)^2 = \frac{S_{ABC}}{S_2}$ و $\frac{S_1}{S_2} = \frac{x^2}{y^2}$ استفاده کنید.

• ۲۳۹ $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3})^2$ را هنمایی مسئله قبل را ملاحظه کنید.

۲۴۰. $\frac{720}{17}$. نوع مثلث را تعیین کنید.

۲۴۱. 200 cm^2 . فرض کنید که AK و CM عمودهای وارده بر مماس و BD ارتفاع مثلث ABC

باشد. از تشابه مثلث های AKB و BMC تساوی $\frac{BD}{16} = \frac{AB}{BC}$ و از تشابه مثلث های AKB و BDC

تساوی $\frac{BD}{25} = \frac{BC}{AB}$ را برپا سازید.

۲۴۲. $\frac{abc}{mka + nkb + mna}$. رابطه $S_{DEF} = S_{MDE} + S_{MEF} + S_{MDF}$ را بکار گرفته و S_{DEF} را

برحسب m ، n و k و سینوس زوایای مثلث ABC بیان کنید. سپس سینوس زوایای مثلث ABC را برحسب مساحت و اضلاع آن بیان کنید.

۲۴۳. $2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$. از تشابه مثلث های ABC و BFD (به مثال ۱۱ بخش ۳ رجوع کنید)

رابطه $FD = b \cos \beta$ را استنتاج کرده و بطریق مشابه $DE = c \cos \gamma$ را بدست آورید. رابطه

$\angle ABE = \angle FDA = \angle ADE = \angle FCA$ (به مثال ۳ بخش ۱ مراجعه کنید) را بکار گرفته و زاویه

FDE را برحسب زاویه BAC بیان کنید.

۲۴۴. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$. عبارات $AC = b$ و $BC = a$ را در نظر بگیرید. با اعمال قانون کسینوسها در مورد

مثلث های ABC ، ACD و BCD دستگاه زیر حاصل می شود:

$$\begin{cases} 2a^2 + b^2 = 12, \\ a^2 + b^2 + ab = 9. \end{cases}$$

۲۴۵. $3\sqrt{2}$. به راهنمایی مسئله قبل رجوع کنید.

۲۴۶. $\frac{27}{65} \text{ cm}^2$. به مثال ۵ بخش ۴ مراجعه کنید.

۲۴۷. 210 cm^2 . فرض کنید که $OP = 10 \text{ cm}$ ، $OP \perp AC$ ، BH ارتفاع مثلث ABC و $OK \perp BH$

است. از مثلث BHD درمی یابیم که $BH = 20 \text{ cm}$ است. آنگاه در مثلث OBK ، $OBK = 10 \text{ cm}$ و

$\angle OBK = \angle BDH$ می باشد. از این مثلث شعاع دایره و سپس AP ، AC را پیدا می کنیم. با استفاده از

فرمول $CD \cdot AD = BD^2$ مقدار CD را بدست می آوریم.

$$48 \text{ cm}^2 \bullet 242 \quad 135 \text{ cm}^2 \bullet 251 \quad a^2 \bullet 250 \quad \frac{(a-b)^2 \sin \alpha}{2} \bullet 249$$

$$126 \text{ cm}^2 \bullet 255 \quad 147 \text{ cm}^2 \bullet 254 \quad \frac{5R^2 \sqrt{3}}{4} \bullet 253$$

$$25 \sqrt{3} \text{ cm}^2 \bullet 259 \quad 168 \text{ cm}^2 \bullet 258 \quad 336 \text{ cm}^2 \bullet 257 \quad 1476 \text{ cm}^2 \bullet 256$$

$$2R^2 \sin 2\alpha \sin^2 \alpha \bullet 262 \quad \frac{1}{2} (a^2 - b^2) \tan \alpha \bullet 261 \quad 150 \text{ cm}^2 \bullet 260$$

$$\frac{H^2}{2} \sin \beta \cos (\alpha - \gamma) \bullet 264 \quad \frac{4 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\pi \sin \alpha \sin \beta} \bullet 263$$

۲۶۵. ارتفاع BH را رسم کرده و نقطه M را بر نقطه H منطبق کنید.

۲۶۶. $(a+b)^2$. ثابت کنید که $S_{AOB} = S_{COD}$ است. رابطه $\frac{S_{BOC}}{S_{COD}} = \frac{BO}{CD} = \frac{b}{a}$ را بکار بگیرید.

۲۶۷. 20 cm^2 . خطوط مستقیم لوزی را به نه قسمت تقسیم می کنند. چهارتا از این قسمتها مثلث

است. مساحت هریک از مثلث‌ها را با x نشان داده و ثابت کنید مساحت هر چهار ضلعی مجاور به ضلع لوزی برابر $3x$ است. مساحت مثلث ABN را بر حسب مساحت لوزی بیان کنید.

$$\bullet 268. \frac{8ab\sqrt{ab}}{a+b} \text{ به مثال } 7 \text{ بخش } 3 \text{ رجوع کنید.}$$

$$\bullet 269. 70 \text{ cm}^2 \text{ از تساوی } \frac{S_{AOD}}{S_{COD}} = \frac{AO}{OC} \text{ استفاده کنید.}$$

$\bullet 270. 40 \text{ cm}^2$ را با x نشان دهید (P و M بترتیب نقاط تماس دایره با AD و AB است).

تساوی $PD^2 = CD \cdot KD$ را بکار گرفته پاره خط‌های PD ، OP و MK را بر حسب x بیان کنید.

$\bullet 271. 20 \text{ cm}^2$ و 10.4 cm^2 عبارات $AB = x$ ، $BC = 2x$ ، $\angle ABM = \alpha$ را منظور کنید. قانون

کسینوس‌ها را در مورد AM (در مثلث ABM) و CM (در مثلث BMC) اعمال کرده و سپس فرمول $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ را بکار گیرید.

$$\bullet 272. 4S + 2c^2 \quad \bullet 273. 926 \text{ cm}^2 \quad \bullet 274. 2a^2 (\sqrt{2} - 1)$$

$$\bullet 275. \frac{3}{2} a^2 \quad \bullet 276. (\sqrt{3} + 1) \text{ cm}^2 \quad \bullet 277. \frac{R^2}{4} (8\sqrt{3} - 9) \quad \bullet 278. \frac{37}{64}$$

$\bullet 279. 11 \text{ cm}^2$ عبارات $BF = x$ ، $AF = 2x$ ، $BK = y$ ، $CK = 3y$ را منظور کرده و مساحت‌های مثلث‌های BKF و ABC را مقایسه کنید.

$$\bullet 280. \frac{784}{7225} \quad \bullet 281. \frac{a^2}{24} (3\sqrt{3} - \pi) \quad \bullet 282. \frac{5\sqrt{3}\pi - 18}{54}$$

$$\bullet 283. (a) \cdot \arccos \frac{a-b}{a+b} - \frac{1}{2} (a^2 - b^2) - \frac{\pi b^2}{2} - \frac{1}{2} (a+b) \sqrt{ab} \quad (b) \cdot \frac{\pi a^2 b^2}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^4}$$

$$\bullet 284. \frac{a^2}{18} (3\sqrt{3} - \pi) \quad \bullet 285. \frac{a^2}{2} (\pi - 2)$$

$$\bullet 286. (a) \cdot (2\sqrt{3} - \pi) \cdot \frac{R^2}{6} (7 - 4\sqrt{3}) \quad (b) \cdot (4 - \pi) \cdot R^2 (3 - 2\sqrt{2}) \quad (c) \cdot \frac{2R^2}{9} (3\sqrt{3} - \pi)$$

$$\bullet 287. R^2 (\alpha + \sin \alpha) \quad \bullet 288. \frac{\pi a^2}{6} \quad \bullet 289. 10R^2 \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\bullet 290. \frac{\pi a^2}{18} (2 - \sqrt{3}) \quad \bullet 291. \frac{(4\pi - 3\sqrt{3})(4 + \sqrt{7})}{27}$$

$\bullet 292$ ثابت کنید که $CD^2 = AC \cdot BC$ است.

$$\bullet 293. \frac{b^2}{4} \cot \beta (\beta - \sin \beta \cos (2\alpha + \beta)) \text{ از این نکته استفاده کنید که دایره از نقطه } C \text{ می‌گذرد.}$$

$$\bullet 294. \left(\cot \alpha + \pi - \frac{\pi n}{2} \right) \cdot \frac{\pi a^2}{1 + \tan^2 \alpha} \text{؛ در این رابطه } \alpha = \frac{\pi}{n} \text{ است. مساحت شکل «ستاره‌ای»}$$

عبارت از تفاضل مساحت n ضلعی با رئوس واقع بر مراکز دایره‌ها و مساحت n تا قطاع است.

$$\bullet 295. \left(\cot \alpha + \pi - \frac{\pi n}{2} \right) \cdot \frac{\pi a^2 \cos^2 \alpha}{4(1 + \sin \alpha)^2} \text{ در این رابطه } \alpha = \frac{\pi}{n} \text{ است.}$$

به راهنمایی مسئله قبل مراجعه کنید

$$\bullet 301. 75 \text{ cm} \quad \bullet 302. 2 \sqrt{\frac{S}{3} \cot \frac{\alpha}{2}} \quad \bullet 303. \frac{2ab \cos \frac{\gamma}{2}}{a+b} \quad (a) \quad \bullet \frac{ab \sin \gamma}{c} \quad (b)$$

$$\arctan \frac{a^2 - b^2}{4S} \bullet 306 \quad \sqrt{\frac{2}{4-\pi}} \bullet 305 \quad \sqrt{\frac{a^2 \sin \alpha + 2ah \cos \alpha - 2ah}{\sin \alpha}} \bullet 304$$

$$\sqrt{3} \text{ cm و } 120^\circ \bullet 308 \quad \frac{\sqrt{2S \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma}}{\sin \alpha} \bullet 307$$

$$\frac{7\sqrt{145}}{5} \text{ cm} \bullet 309$$

۳۱۰. عبارات $c = a + 2d$ و $b = a + d$ را در نظر گرفته و مساحت S را بر حسب a و d بیان کنید. فرمول هرور را بکار گرفته و سپس فرمول های $R = \frac{abc}{4S}$ و $r = \frac{S}{p}$ را مورد استفاده قرار دهید.

۳۱۱. $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$ فرض کنید که ارتفاع دوزنقه بوسیله پاره خط x به قسمت های h و kh ($k > 1$) تقسیم شود. آنگاه $\frac{1}{2} \frac{a+b}{2} (k+1)h = kh = \frac{b+x}{2}$ و $\frac{x-b}{a-b} = \frac{k}{k+1}$ را خواهیم داشت. از این دستگاه x را بیابید.

۳۱۲. $14.4 \text{ cm} \bullet$ تشابه مثلث AKD و CKM را بکار بگیرید. K نقطه تلاقی AM و CD است.

۳۱۳. $4.5 \text{ cm} \bullet$ به مثال ۱۱ بخش ۳ مراجعه کنید.

۳۱۴. $24 \text{ cm} \bullet$ به مثال ۱۱ بخش ۳ مراجعه کنید.

۳۱۵. $4 \text{ cm} \bullet$ مثال ۴ بخش ۴ را ملاحظه کنید.

۳۱۶. عبارات $AC = x$ و $AB = y$ را در نظر بگیرید. مساحت مثلث ABC را

$$\frac{2\sqrt{S_2(S_1+S_2)}}{\sqrt{4S_1^2 - S_2^2}}$$

بر حسب x و y بیان کنید. ثابت کنید $\frac{y}{x} = \frac{S_1}{S_2}$ است.

۳۱۷. $8.25 \text{ cm} \bullet$ شعاع دایره محیطی را بدست آورده و گزاره حاصل از مثال ۸ بخش ۲ را ملاحظه کنید.

۳۱۸. $\frac{26\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$ و $\frac{18\sqrt{3}}{3} \text{ cm} \bullet$ ثابت کنید که $a:b:c = 4:13:15$ است.

عبارات $a = 4x$ ، $b = 13x$ و $c = 15x$ را منظور کنید.

۳۱۹. $\frac{2 \cos \frac{\gamma}{3} + 3}{1 + 6 \cos \frac{\gamma}{3}} \bullet$ با معرفی پارامتر کمکی $AC = b$ آنگاه $BC = 3b$ خواهد بود.

روش مساحت ها را بصورت $S_{ACD} + S_{DCB} = S_{ACK} + S_{KCB}$ بکار بگیرید.

۳۲۰. $\frac{\sqrt{7}}{9} (4 + \sqrt{7}) \bullet$ مثال ۱۳ بخش ۴ را ملاحظه کنید.

۳۲۱. $\frac{33 + 12\sqrt{6}}{25} \bullet$ به مثال ۱۳ بخش ۴ مراجعه کنید.

۳۲۳. مثلث های $A_1B_1C_1$ و PQR نسبت به نقطه M متقارن هستند.

۳۲۴. تقارن را نسبت به میانگانه ضلعی مورد ملاحظه قرار دهید که طول آن مجهول است. آنگاه مثلث را

می توان با اضلاع a ، b و $2m$ رسم کرد. طول میانه در محدوده $\frac{a+b}{2} < m < \frac{a-b}{2}$ تغییر می کند که در آن طول میانه مفروض است.

۳۲۵ • ثابت کنید که نقطه تلاقی مثلث مرکز تقارن است که مثلث ABC را به مثلث رسم شده انتقال می‌دهد.

۳۲۶ • تقارن نسبت به نقطه P را مورد ملاحظه قرار دهید.

۳۲۷ • از این موضوع استفاده کنید که نقطه تلاقی اقطار متوازی الاضلاع مرکز تقارن آن است.

۳۲۸ • از مرکز تقارن متوازی الاضلاع خط مستقیمی عبور دهید.


۳۲۹ • از این نکات استفاده کنید که مرکز دایره مرکز تقارن آن بوده و خطوط متناظر در تقارن مرکزی موازی هستند.

۳۳۰ • مرکز دایره مرکز تقارن شش ضلعی محیطی است.

۳۳۱ • ثابت کنید که نقطه O محل تلاقی اقطار AD و BE مرکز تقارن شش ضلعی $ABCDEF$ است. از این گذشته $S_{\Delta OEA} = S_{\Delta ODE}$ و $S_{\Delta COE} = S_{\Delta OEF}$ ، $S_{\Delta COA} = S_{\Delta OAF}$ است. با جمع این تساویها به رابطه $S_{\Delta ACE} = \frac{1}{2} S_{ABCDEF}$ می‌رسیم.

۳۳۲ • فرض کنید که نقطه A' متقارن نقطه A نسبت به نقطه M باشد (شکل ۱۹۶).

آنگاه زاویه BKA' معلوم بوده (نقطه تلاقی خطوط BX و l است) و مقدار آن برابر $180^\circ - \alpha$ خواهد بود. این مسئله دارای دو جواب است.



شکل ۱۹۶

۳۳۳ • خط مطلوب m از نقاطی عبور می‌کند که نسبت به نقطه M متقارن بوده و به اضلاع زاویه ABC تعلق دارند. برای اثبات این گزاره نشان دهید که مساحت مثلث ایجاد شده در اثر برش خط l که محتوی نقطه M است و با خط m متفاوت است از مساحت مثلث حاصله بوسیله خط m بزرگتر است.


۳۳۴ • از تقارنی استفاده کنید که مرکز آن بر مرکز دایره منطبق است.

۳۳۵ • میانگام ضلع BC (نقطه M) مرکز تقارن متوازی الاضلاع $BXYC$ است (شکل ۱۹۷). بنابراین تبدیلی که x را به y انتقال می‌دهد تقارنی نسبت به M است. یا تبدیل متجانس H_1 با نسبت تجانس -1 و مرکز M است. بدلیل $\vec{AZ} = 2\vec{MY}$ ، $\vec{XY} = \vec{AZ}$ در نتیجه تبدیلی که Y را به Z انتقال می‌دهد عبارت از تبدیل H_2 با مرکز S در نقطه تلاقی ZY و AM و نسبت $k_2 = 2$ است. ترکیب این

تبدیلات متجانس یعنی $H_2 \circ H_1$ عبارت از تبدیل متجانس و معین H با نسبت تجانس -2 است $k = k_1 \cdot k_2 = -2$ است. مرکز این تجانس را بدست می‌آوریم.


بدلیل $H(M) = H_2(M) \circ H_1(M) = H_2(M) = A$ ، $H_1(M) = M$ است. در نتیجه $\vec{OA} = -2\vec{OM}$.

خواهد بود. این امر بدین معنی است که O مرکز تلاقی میانه های مثلث ABC است. بدین ترتیب $z \rightarrow x$ تبدیلی با مرکز واقع بر محل تلاقی میانه های مثلث ABC و نسبت $k = -2$ است.




شکل ۱۹۷

۳۳۶ ● (a) فرض کنید $ABCD$ متوازی الاضلاع مطلوب محاط در چهار ضلعی $LMNK$ ، O مرکز تقارن متوازی الاضلاع و نقاط B و D به ترتیب به MN و KM متعلق باشند (شکل ۱۹۸). بدلیل $(A) = B \rightarrow T_{AB}$ و $(D) = C \rightarrow T_{AB}$ نقطه C محل تلاقی ML و تصویر KL است.



شکل ۱۹۸

۳۳۷ ● با در نظر گرفتن $BC = a$ و $AC = b$ آنگاه طبق فرض $a > b$ خواهد بود. روش اول. نقطه D متقارن نقطه C را نسبت به نقطه M (میانگاه ضلع AB) مشخص کرده و نقطه D را به رأس A وصل می کنیم (شکل ۱۹۹). مثلث ADM با مرکز تقارن M متقارن مثلث BCM است. در نتیجه $AD = BC = a$ و $\angle BCM = \angle ADM = \beta$ خواهد بود. بدین ترتیب در مثلث ACD حاصله که محتوی زوایای α و β است اضلاع متقابل به این زوایا یعنی اضلاع AD و AC به ترتیب برابر a و b خواهند بود. طبق فرض $a > b$ و $\alpha > \beta$ است. روش دوم. میانگاه E مربوط به ضلع AC را به نقطه M وصل کرده و مثلث CEM را بدست آورید. اضلاع آن بصورت $EM = \frac{a}{2}$ و $CE = \frac{b}{2}$ است. زوایای مثلث CEM که متقابل به این اضلاع هستند به ترتیب برابر α و β است. این امر می تواند به آسانی با استفاده از میانخط مثلث ثابت شود.



شکل ۱۹۹


۳۳۸ ● (a) یک رأس روی محور تقارن و دو رأس را در خارج آن اختیار کرده و رئوس متقارن آنها را رسم کنید. (b) پنج ضلعی ای که دارای دو محور تقارن باشد منتظم خواهد بود.

۳۳۹ ● از محور تقارن استفاده کرده و خطی را به خط دیگر انتقال دهید

۳۴۰ • از تقارن نسبت به نیمساز زاویه مقابل به ضلع معین استفاده کنید.

۳۴۱ • بعد از استفاده از تقارن نسبت به عمود منصف وارد بر ضلع سوم مسئله به رسم مثلثی با دوضلع و زاویه بین تحویل می یابد.

۳۴۳ • شکل ۲۰۰ را ملاحظه کنید



شکل ۲۰۰

۳۴۴ • اثبات مسئله را می توان از طریق تناقض انجام داد. اگر خط مستقیم محتوی قطری از پنج ضلعی نقش محور تقارن را ایفاء کند آنگاه فقط و فقط دورأس پنج ضلعی روی این محور واقع خواهد شد. سه رأس مانده بایستی روی هریک از نیم صفحات با مرز l پخش شوند. ولی برای سه رأس چنین امکانی وجود ندارد. در نتیجه چنین پنج ضلعی ای وجود نخواهد داشت.

۳۴۵ • حل این مسئله مشابه حل مسئله قبلی است.

۳۴۶ • مثلثی کمکی رسم کنید که دوضلع و زاویه بین آنها معلوم بوده و از تقارن نسبت به عمود منصف ضلع سوم استفاده کنید.

۳۴۷ • راهنمایی مسئله قبل را ملاحظه کنید.

۳۴۸ • (a) یک قطریکی از دایره ها و قطر دایره دیگر را که متعامد بر آن است رسم کنید. (b) قطر AB را از دایره کوچکتر امتداد دهید تا دایره بزرگتر را در نقطه C قطع کند. محور تقارن پاره خط های AC و BC را رسم می کنیم.

۳۴۹ • ترکیب تقارن های محوری $S_p \circ S_q \circ S_r$ تقارنی با محور l بوده و $S_r \circ S_q \circ S_p(A) = A$ است. در نتیجه $S_l(A) = A$ بوده و l به A متعلق خواهد بود. خط l را رسم کرده و $\angle(p, q) = \angle(l, r)$ را منظور کنید. هر نقطه l می تواند نقش A را ایفاء کند.


۳۵۰ • از مرکز دایره سه خط متعامد بر خطوط مفروض رسم کنید. از نتیجه مسئله قبل استفاده کنید.

۳۵۱ • فرض کنید که خط DH خط CO را در نقطه H' قطع کرده و C' انتهای قطری باشد که سردیگر آن C است (شکل ۲۰۱).

نیمخط های CH و CO نسبت به CM متقارن هستند.

روابط زیر را داریم.

$$CD:CM = CH':CC' = CH:CC' = 2R \cos C : 2R = \cos C$$



شکل ۲۰۱

۳۵۲ • اگر $OM = p, ON = q, OP = r, OQ = l$ باشد

آنگاه بدلیل $\sigma(0) = A$ و $\sigma(A) = 0$ یک حرکت همانند خواهد بود.


در نتیجه $S_q \circ S_p = S_r \circ S_l$ یا $\angle(p, q) = \angle(l, r)$ خواهد بود.

۳۵۳ • ترکیب $\delta = S_l \circ S_r \circ S_q \circ S_p$ را مورد ملاحظه قرار دهید که در آن r, q, p و l خطوط

محتوی نیمسازهای زوایای چهارضلعی است. بدلیل $(AD) = AD$ و $\delta(0) = 0$ و δ یک انتقال

همانند محسوب می شود. $S_q \circ S_p = S_r \circ S_l$ بوده و از اینرو $\angle(p, q) = \angle(l, r)$ را داریم.

در نتیجه $\angle COD + \angle AOB = 180^\circ$ (شکل ۲۰۲) خواهد بود.



شکل ۲۰۲

۳۵۶ • قاعده های دوزنقه را با AD و BC و محور تقارن را با l نشان می دهیم. آنگاه $S_l(A) = D$

ولی نقطه تلاقی خط مستقیم و تصویر آن نسبت به تقارن محوری به محور تقارن تعلق دارد. در نتیجه نقطه

تلاقی خطوط AB و DC به l و نقطه تلاقی پاره خط های BC و AC نیز به l تعلق خواهد داشت.

۳۵۷ • نقطه O را مرکز دایره، AB و CD را وترهای موازی از این دایره، M را میانگه وتر AB و N را

میانگه وتر CD در نظر بگیرد. بدلیل $AO = OB$ و $AM = MB$ محور تقارن نقاط A و B بوده و از

اینجا نتیجه می شود که $OM \perp AB$ است. بطریق مشابه ON محور تقارن نقاط C و D بوده و $ON \perp CD$

خواهد بود. با منظور کردن $OM \parallel ON$ ، حاصل شده و بنابراین $OM = ON$ خواهد بود.

۳۵۸ • O را مرکز دایره F_1 و O_1 را مرکز دایره های F_2 و F_3 فرض می کنیم. دایره های F_1 و F_2 همدیگر را

در نقاط A, B و دایره های F_1 و F_3 در نقاط C و D همدیگر را قطع می کنند. آنگاه OO_1 که دایره های

F_1 و F_2 و F_3 را قطع می کند محور تقارن شکل خواهد بود.

۳۵۹ • نقطه M را نقطه مشترک دایره های ω_1 و ω_2 و ω_3 فرض می کنیم. نقاط A, B, C ، دومین نقاط

تقاطع دایره های ω_2 و ω_3 ، ω_1 و ω_3 و ω_1 و ω_2 است. ترکیب سه تقارن محوری یعنی S_{MA}, S_{MB} و

S_{MC} را که تقارنی با محور MO است مورد ملاحظه قرار می دهیم. O_2 مرکز دایره ω_2 است. اگر نقطه P

انتهای قطری از دایره ω_2 باشد که سردیگر آن نقطه M است آنگاه $S_{MA}(P) = Q, S_{MB}(Q) = R$ و

$S_{MC}(R) = P$ و $QB = BR, PA = AQ, RC = CP$ خواهد بود. در نتیجه AB, BC و CA

میانخط های مثلث PQR بوده و بنابراین دایره محیطی مثلث ABC دارای همان شعاع دایره محیطی

مثلث QAB خواهد بود.

۳۶۰. حل مسئله ۳۵۹ را ملاحظه کنید.

۳۶۱. نقطه مفروض را با A ، خط مفروض را با l نشان می‌دهیم. رابطه $AO \perp l$ را در نظر می‌گیریم. به آسانی می‌توان دریافت که مکان هندسی مطلوب F نسبت به خط AO متقارن بوده و بنابراین کافی است که فقط نیمصفحه واقع در طرف راست AO را مورد ملاحظه قرار دهیم. بدیهی است که نقطه K (به K AO تعلق دارد) با شرط $AK = 2KO$ به مکان هندسی F متعلق خواهد بود. از نقطه K خط m را به موازات خط l رسم می‌کنیم. M را مرکز مثلث متساوی الاضلاع ABC و بالای خط m ، AD را ارتفاع مثلث ABC در نظر می‌گیریم. بدلیل اینکه AOB و $AODB$ زوایای قائمه هستند از اینرو نقاط O و D روی دایره‌ای با قطر AB واقع شده و بدین ترتیب $\angle AOD = \angle ABD = 60^\circ$ خواهد بود. مثلث‌های AOD و AKM متشابه بوده و از اینرو $\angle AKM = 60^\circ$ است. اگر نقطه M زیر خط m واقع باشد آنگاه بطریق مشابه $\angle AKM = 120^\circ$ خواهد بود. عکس این امر نیز درست است: هر نقطه‌ای مانند M با شرط اینکه AKM یا مساوی 60° و یا مساوی 120° است به مکان هندسی F تعلق دارد. سرانجام مکان هندسی F . دو خط مستقیم ماز بر نقطه K را نشان می‌دهد که با خط AO زوایای 60° و 120° و با خط l زوایای 30° و 150° می‌سازند.

۳۶۲. A را نقطه مفروض، l را خط مفروض، A' را متقارن نقطه A حول خط l و m را خط ماز بر نقطه A' به موازات l در نظر بگیرید. به آسانی دریافت می‌شود که مکان هندسی F نسبت به خط AA' متقارن بوده و از اینرو فقط نیم صفحه واقع در طرف راست AA' را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. فرض می‌کنیم که نقطه C از مکان هندسی F بوده و در بالای خط m واقع باشد. همچنین تصور می‌کنیم که B رأس دوم مثلث ABC است. آنگاه دایره‌ای با شعاع AB و مرکز B از نقاط A ، A' و C می‌گذرد. از اینرو نتیجه می‌شود که $\angle AA'C = 30^\circ$ است. و اگر نقطه C زیر خط m واقع باشد آنگاه $\angle AA'C = 150^\circ$ خواهد بود. همچنین بدیهی است که فقط یک نقطه A' وجود دارد که به مکان F روی خط m متعلق است. بدین ترتیب نقاط مکان هندسی F که در نیم صفحه راست AA' قرار دارند روی دونیم خط ناشی از نقطه A' واقع بوده و با AA' زوایای 30° و 150° می‌سازند. ثابت کنید که این زوج نیم خط‌ها واقع در نصفه طرف راست مجموعه نقاط F است. سرانجام مکان هندسی F دو خط مستقیم را ارائه می‌دهد که از نقطه A' با زوایای 30° و 150° با خط AA' و با زوایای 60° و 120° با خط مفروض l عبور می‌کنند.

۳۶۳. نقطه M' متناظر به نقطه M را بعد از دوران حول O به اندازه 90° رسم کنید. فاصله نقطه O تا $M'N$ برابر نصف طول ضلع مربع است.

۳۶۴. تصویریکی از دایره‌ها را بعد از دوران حول نقطه O به اندازه 60° رسم کنید. نقطه تلاقی دایره دوم و دایره رسم شده رأس دوم مثلث مطلوب خواهد بود.

۳۶۵. وتر مفروض مسئله را رسم کنید. دایره هم مرکز با دایره مفروض را که از نقطه مفروض نیز

می‌گذرد رسم کنید.


۳۶۶ • دوران حول مرکز مثلث به اندازه 120° نقطه M را به N ، نقطه N را به P و نقطه P را به M انتقال می‌دهد. چنین داریم: $MN = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

۳۶۷ • دوران حول مرکز مربع به اندازه 90° نقطه P را به Q ، Q را به R ، R را به S و S را به P انتقال می‌دهد؛ $PQ = \frac{a\sqrt{10}}{4}$.

۳۷۰ • پاره خط‌های AD و AE را می‌توان بدو طریق جدا کرد. در یک حالت شرط مسئله متقاعد نمی‌شود. در حالت دیگر دایره‌ای وجود دارد که از نقاط B ، C ، D و E می‌گذرد (مرکز این دایره روی محور تقارن l پروانه $DEABC$ قرار دارد).

۳۷۱ • فرض کنید که O نقطه تلاقی اقطار AC و BD مربع $ABCD$ ، و MN و KL قطعات خطوط مفروض باشند که در داخل مربع قرار دارند (نقاط M ، N ، K و L بترتیب به اضلاع AB ، CD ، BC و AD مربع تعلق دارند). آنگاه $(AB) = AD \cdot R_{90^\circ}$ خواهد بود. تصویر نقطه M عبارت از نقطه M' از خط AD خواهد بود، بطوریکه $\angle MO, M' = 90^\circ$. یعنی این نقطه همان L خواهد بود. بطریق مشابه $R_{90^\circ}(N) = K$ بوده و در نتیجه $R_{90^\circ}(MN) = KL$ و $MN \equiv KL$ درمی‌آید.


۳۷۲ • برای اثبات تساوی پاره خط‌ها لازم است حرکتی پیدا شود که در آن یکی از پاره خط‌ها به دیگری انتقال می‌یابد. از آنجا که زاویه بین خطوط محتوی پاره خط‌های مطروحه برابر 60° است از اینرو دوران حول نقطه O را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. از آنجا که دوران حول نقطه O به اندازه 120° مثلث را به خودش انتقال می‌دهد از اینرو مناسب است که دوران حول O به اندازه 120° را مورد ملاحظه قرار دهیم. در این دوران نقطه A به B ، B به C ، C به A ، AB به BC ، BC به CA و CA به AB انتقال می‌یابد. نقطه E که به AC متعلق است به نقطه M انتقال می‌یابد که به AB متعلق است. (شکل ۲۰۳)؛ نقطه F متعلق به AB به نقطه N متعلق به BC انتقال پیدا می‌کند ($\angle EOM = 120^\circ$) و $\angle FON = 120^\circ$). در نتیجه EF نیز به MN منتقل می‌شود. از اینرو $EF = MN$ درمی‌آید.



شکل ۲۰۳

۳۷۳ • فرض کنید که PKL مثلث مطلوب باشد (شکل ۲۰۴). آنگاه نقاط K و L از نقطه P هم فاصله خواهند بود. آنها بترتیب به خطوط a و b متعلق بوده و از نقطه P با زاویه 60° دیده می‌شوند. از آنجا که نقطه L تصویر نقطه K به هنگام دوران حول P به اندازه 60° است از اینرو این نقطه به تصویر خط a در دوران مزبور متعلق خواهد بود (یعنی نقطه L ، نقطه مشترک خط $a = R_{60^\circ}(a)$ و خط b است).

نقطه K پیش تصویر نقطه L است. اگر $b = R_{90^\circ}^a(a)$ باشد آنگاه مسئله دارای بینهایت جواب خواهد بود. در بقیه حالت ها مسئله دو جواب بیشتر ندارد زیرا خط b با خط a' و نیز با خط $a = R_{\overline{P}^{60}}(a)$ از یک نقطه بیشتر، نقطه مشترک ندارد.



شکل ۲۰۴


۳۷۴ • تعامد دو خط وقتی ثابت می شود که یکی از آنها در دوران به اندازه زاویه 90° روی دیگری انتقال یابد. در تجزیه و تحلیل شرایط مسئله توجه داشته باشید که نقاط M و B از نقطه A هم فاصله بوده و $\angle MAB = 90^\circ$ است. بطریق مشابه $AC = AP$ و $\angle CAP = 90^\circ$ است. از اینرو دوران به اندازه زاویه 90° در جهت عقربه های ساعت حول نقطه A نقطه M را به نقطه B و نقطه C را به نقطه P انتقال می دهد. دوران صفحه به اندازه زاویه 90° و حول نقطه M را مورد ملاحظه قرار دهید.

۳۷۶ • ترکیب دو دوران $R_D^{90^\circ}$ و $R_E^{270^\circ}$ را مورد ملاحظه قرار دهید. انتقال T_{AC} را در نظر بگیرید که در آن نقطه D به F منتقل می شود و $\vec{DF} = \vec{AC}$ است. ولی $\angle FDE = 45^\circ$ بوده و از اینرو زاویه مطلوب برابر 45° خواهد بود.

۳۷۸ • فرض کنید که $T_{CD}(B) = B'$ و E میانگانه پاره خط AB' است. از نقاط A, B, C و D خطوطی به موازات BE رسم کنید.

۳۷۹ • رابطه $BC \parallel AD$ را در نظر بگیرید. تصویر قطر AC را در انتقال T_{AD} مورد ملاحظه قرار دهید.

۳۸۰ • رابطه $BC \parallel AD$ را فرض کرده و تصاویر پاره خط های AB و CD را در انتقال های T_{BM} و



شکل ۲۰۵

مورد ملاحظه قرار دهید. ثابت کنید که نیمساز زاویه مثلث حاصله در همان حال میانه نیز هست (شکل ۲۰۵).


۳۸۱ • انتقال T_{AC} را در نظر بگیرید. نقطه L متناظر به نقطه K را رسم کرده و درمی یابیم که: $\angle KCL = 90^\circ$ ، در نتیجه $\angle AKC = 90^\circ$ خواهد بود.

۳۸۲ • یکی از اضلاع جانبی دوزنقه را به داخل آن انتقال دهید.

۳۸۳ • توجه داشته باشید که مجموع فواصل رئوس متقابل متوازی الاضلاع $OABC$ از هر خط

مستقیمی برابر است، زیرا این مجموع‌ها مساوی دو برابر فاصله نقطه تلاقی اقطار متوازی الاضلاع از خط مزبور می‌باشد.

۳۸۴ • دایره کمکی رسم کنید که مساوی دایره مفروض و مماس بر آن بوده و از نقطه M بگذرد (شکل ۲۰۶). به تساوی‌های $MO_1 = R$ و $OO_1 = 2R$ توجه کنید.



شکل ۲۰۶

۳۸۶ • AD و BC را قاعده‌های دوزنقه $ABCD$ ، M را میانگاه پاره خط BC و N را میانگاه پاره خط

AD در نظر بگیرید. در انتقال T_{BM} نقطه B به نقطه M و نقطه A به نقطه A_1 منتقل می‌شود.

در انتقال T_{CM} نقطه C به نقطه M و نقطه D به نقطه D_1 منتقل می‌گردد. آنگاه داریم:

$$A_1N = AN - AA_1 = AN - BM \quad (1)$$

$$ND_1 = ND - D_1D = ND - MC \quad (2)$$

با تجمیع تساوی‌های (1) و (2) به $AD - BC$ و $A_1N + ND_1 = A_1D_1$ ولی $A_1N + ND_1 = A_1D_1$ حاصل

می‌شود. بدلیل $A_1N = ND_1$ ، MN ، میانه مثلث قائم الزاویه A_1MD_1 است.

بدین ترتیب $MN = \frac{1}{2}A_1N + ND_1$ خواهد بود. با در نظر گرفتن تساوی (3) درمی‌یابیم که:

$$MN = \frac{1}{2}A_1D_1 = \frac{1}{2}(AD - BC)$$

۳۸۷ • رئوس دوزنقه را با A ، B ، C و D نشان می‌دهیم ($BD = 20\text{ cm}$ ، $AC = 13\text{ cm}$ و

$AD + BC = 21\text{ cm}$). آنگاه $S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AD + BC)h$ خواهد بود که در آن h ارتفاع دوزنقه است.

انتقال T_{BC} را مورد ملاحظه قرار دهید.

این انتقال نقطه B را به نقطه C ، و نقطه D را به نقطه D' منتقل می‌سازد. مساحت مثلث ACD' برابر

$\frac{1}{2}AD'h$ بوده و $AD' = AD + DD' = AD + BC$ است.

بنابراین مساحت دوزنقه $ABCD$ نیز برابر مساحت مثلث ACD' خواهد بود.

۳۸۸ • اگر مراکز دایره‌های مفروض را با O_1 و O_2 نشان دهیم آنگاه انتقال $T_{O_1O_2}$ دایره با مرکز O_1 را به

دایره‌ای با مرکز O_2 منتقل می‌سازد. در این انتقال نقطه A به نقطه C و نقطه B به نقطه D می‌رود.


در نتیجه $AC = BD = O_1O_2 = d$ خواهد بود.

۳۸۹ • فرض کنید که چهار ضلعی مطلوب $ABCD$ رسم شده باشد (شکل ۲۰۷). انتقال T_{DN} را

روی ضلع DA و انتقال T_{CN} را روی ضلع CB انجام می‌دهیم. در این حالت از نقطه N سه پاره خط

NA_1 ، NM و NB_1 ناشی می شود که طول آنها معلوم است. به آسانی می توان نشان داد که M میانگانه پاره خط A_1B_1 است. در حقیقت طول پاره خط های AA_1 و BB_1 برابر $\frac{1}{2}DC$ بوده و این پاره خط های موازی DC هستند. بدین ترتیب چهارضلعی A_1AB_1B متوازی الاضلاع خواهد بود. نقطه M میانگانه قطر AB بوده و از این رو M به قطر A_1B_1 متعلق بوده و میانگانه آن محسوب می شود. بدین ترتیب در مثلث NA_1B_1 اضلاع NA_1 ، NB_1 و میانه محصور بین آنها معلوم هستند. برای رسم این مثلث نقطه N_1 را که متقارن N نسبت به مرکز تقارن M است مشخص می کنیم. بدیهی است که $A_1N_1 = NB_1$ است. مثلث NN_1A_1 را می توان با سه ضلع معلوم یعنی $NA_1 = DA$ ، $A_1N_1 = NB_1 = CB$ و $NN_1 = 2NM$ رسم کرد. حال چهارضلعی مطلوب را رسم می کنیم.

پاره خط NN_1 را بوسیله نقطه M به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم. با مرکز تقارن M ، نقطه B_1 را متقارن نقطه A_1 رسم می کنیم. مثلث های A_1MA و B_1MB را بوسیله سه ضلع معلوم رسم می کنیم. با انتقال پاره خط AA_1 بوسیله $T \rightarrow A_1N$ و پاره خط BB_1 بوسیله $T \rightarrow B_1N$ چهار رأس چهارضلعی مطلوب $ABCD$ بدست می آید. به آسانی می توان ثابت کرد جواب منحصر بفرد است.




شکل ۲۰۷

۳۹۱ • حالت کلی را در نظر بگیریم: مثلث ABC متساوی الاضلاع بوده و از این رو نقاط H ، O و M متمایز هستند. تبدیل متجانس با مرکز M و نسبت $k = -\frac{1}{2}$ مثلث ABC را به مثلث $A'B'C'$ انتقال می دهد که رئوس آن میانگانه اضلاع مثلث مفروض است. اضلاع متناظر این مثلث ها موازی هستند. ارتفاعات AA_1 ، BB_1 ، CC_1 از مثلث ABC به ارتفاعات $A'A_1$ ، $B'B_1$ ، $C'C_1$ از مثلث $A'B'C'$ انتقال یافته و ارتفاعات مثلث $A'B'C'$ بر اضلاع ABC عمود می باشند. از این رو در تبدیل متجانس ارائه شده نقطه H محل تلاقی ارتفاعات مثلث به مرکز O دایره محیطی مثلث ABC منتقل می شود. از این رو نتیجه می شود که نقاط M ، H و O روی یک خط مستقیم واقع بوده و $\vec{MO} = -\frac{1}{2}\vec{MH}$ است که از آن نیز $\vec{OM} = \frac{1}{2}\vec{MH}$ استنتاج می شود. اگر ABC مثلث متساوی الاضلاع باشد آنگاه $O = M = H$ بوده و خط اولر مبهم خواهد بود.


۳۹۲ • KD پاره خط مطلوب است؛ یعنی $KM:MD = 1:2$ را داریم (شکل ۲۰۸).
 آنگاه تبدیل متجانس $H_M^{-\frac{1}{2}}$ نقطه D را به نقطه K انتقال می دهد. بدلیل تعلق D به BC ، نقطه K به $B'C'$ متعلق بوده و $B'C' = H_M^{-\frac{1}{2}}(BC)$ است. در نتیجه K نقطه تلاقی BA و $B'C'$ خواهد

بود. در رسم نقطه K روی BC نقطه D را بیابید که پیش تصویر نقطه K در تبدیل متجانس $H_M^{\frac{1}{2}}$ است.




شکل ۲۰۸

۳۹۳ • دودایره O_1 و O_2 که بر هم در نقطه M مماس هستند نسبت به این نقطه متجانس می‌باشند. تبدیل متجانسی را مورد ملاحظه قرار دهید که R را به S انتقال می‌دهد. این تبدیل نقطه A را به نقطه C (شکل ۲۰۹) و نقطه B را به نقطه D منتقل می‌سازد. با استفاده از ویژگی‌های تجانس $AB \parallel CD$ بدست می‌آید.



شکل ۲۰۹

۳۹۴ • فرض کنید M نقطه تماس دایره ω به مرکز O و شعاع r با دایره ω_1 به مرکز O_1 و شعاع r_1 بوده و a و A نقطه‌ای باشد که دایره‌ها را در نقاط A و A_1 قطع می‌کند (شکل ۲۱۰). اثبات $O_1A_1 \parallel OA$ مطلوب مسئله است. تبدیل متجانس HM را در نظر بگیرید که نقطه O را به نقطه O_1 منتقل می‌سازد. در این تبدیل متجانس خط a به خودش منتقل می‌شود زیرا از مرکز تبدیل می‌گذرد. این تبدیل دایره ω را به دایره ω_1 انتقال می‌دهد. نقطه A که محل تلاقی a و ω است به نقطه تلاقی a و ω_1 انتقال می‌یابد. این نقطه متفاوت با M بوده و از این رو روی A_1 قرار می‌گیرد. از آنجا که O_1A_1 تصویر پاره خط OA در تبدیل متجانس است از این رو این پاره خط‌ها موازی خواهند بود.



شکل ۲۱۰

۳۹۵ • نقطه تلاقی خطوط MP و NQ را X ، نقطه تلاقی خطوط مستقیم MR و NS را Y و نقطه تلاقی خطوط PR و QS را Z نشان می‌دهیم. به آسانی استنباط می‌شود که ترکیب تبدیلات متجانس $H_X^{(M, P)}$ و $H_X^{(P, R)}$ عبارت از تبدیل متجانس $H_X^{(M, R)}$ است. تبدیل متجانسی با مرکز X را نشان می‌دهد که نقطه M را به نقطه P انتقال می‌دهد. اگر ترکیب دو تبدیل متجانس یک تبدیل

متجانس باشد آنگاه مراکز همه سه تبدیل متجانس روی یک خط واقع بوده و Y به ZX متعلق خواهد بود. دومین قسمت نیز بطریق مشابه حل می شود.

۳۹۶ • تبدیل متجانس H_A را مورد ملاحظه قرار دهید که دایره ω را به ω_1 انتقال می دهد. در این حالت نقاط M و N به نقاط N_1 و P_1 (نقطه تلاقی دایره ω و خط AN)، و P_1 نقطه تلاقی دایره ω و خط AP (است) انتقال می یابند. آنگاه خط N_1P_1 به عنوان تصویر خط VP موازی آن در تبدیل متجانس خواهد بود. براساس توازی خطوط MQ و M_1P_1 ، کمانهای QP_1 و MM_1 برابر بوده و از اینرو زوایای محاطی متناظر به آنها یعنی زوایای M_1AN_1 و QAP_1 نیز برابر خواهند بود؛ یعنی $\angle MAN = \angle QAP$ را خواهیم داشت.

۳۹۷ • فرض کنید که M نقطه انتهایی مشترک پاره خط ها، A_3, A_2, A_1 ، نقاط انتهایی دیگر پاره خط ها باشند که روی یک قرار دارند، M_3, M_2, M_1 و را نقاطی روی پاره خط های MA_1, MA_2, MA_3 ، در نظر بگیرید که آنها را به نسبت λ تقسیم می کنند؛ یعنی:

$$\frac{A_1M_1}{M_1M} = \frac{A_2M_2}{M_2M} = \frac{A_3M_3}{M_3M} = \dots = \lambda$$

ثابت کنید که

$$\frac{MM_1}{MA_1} = \frac{MM_2}{MA_2} = \frac{MM_3}{MA_3} = \dots = \frac{MA_1}{MM_1} = \frac{MM_1 + M_1A_1}{MM_1} = 1 + \frac{M_1A_1}{MM_1} = 1 + \lambda$$


بوده و آنگاه $\frac{MM_1}{MA_1} = \frac{1}{1+\lambda}$ است. بطریق مشابه داریم: $\frac{MM_2}{MA_2} = \frac{1}{1+\lambda}$ و غیره.

تبدیلات $H_M^{\frac{1}{1+\lambda}}$ ، $H_M^{\frac{1}{1+\lambda}}$ ، $H_M^{\frac{1}{1+\lambda}}$ ، $(A_1) = M_1$ ، $(A_2) = M_2$ ، و غیره را مورد ملاحظه قرار می دهیم.

با منظور کردن اینکه تصویر یک خط مستقیم در یک تبدیل متجانس خط مستقیم است، درمی یابیم که نقاط M_1, M_2, M_3 و غیره به یک خط مستقیم تعلق دارند.

413 • اگر نقطه تلاقی D, A و C, B را نقطه O فرض کنیم (شکل ۲۱۱)،


آنگاه $\vec{OD} = \alpha \vec{OA}$ و $\vec{OC} = \alpha \vec{OB}$ خواهد بود. طبق فرض $AN \parallel CM$ بوده و از اینرو $\vec{OM} = \beta \vec{OA}$ و $\vec{ON} = \beta \vec{OC}$ را داریم. در نتیجه $\vec{OD} = \frac{\alpha}{\beta} \vec{OM}$ و $\vec{ON} = \frac{\alpha}{\beta} \vec{OD}$ حاصل می شود. بنابراین $DN \parallel MB$ استنتاج می گردد.



شکل ۲۱۱

۴۱۵ • میانگاه وتر AC بوده و از اینرو $\vec{OK} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OC})$ را داریم (شکل ۲۱۲). نقطه L میانگاه

وتر BD است و بنابراین $\vec{OL} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OD})$ و $\vec{OM} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD})$ را داریم. از اینرو $\vec{LM} = \vec{OM} - \vec{OL} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OC})$ بوده و بدین ترتیب $\vec{OK} = \vec{LM}$ استنباط می‌شود. بنابراین چهار ضلعی $OKML$ متوازی الاضلاع خواهد بود.



شکل ۲۱۲

۴۱۶ • اگر CC_1 میانه مثلث ABC فرض شود آنگاه $\vec{CC}_1 = \frac{1}{2}(\vec{CA} + \vec{CB})$ و $|\vec{CC}_1| = \frac{1}{2}|\vec{CA} + \vec{CB}|$ خواهد بود. بدلیل ناهمخط بودن \vec{CA} و \vec{CB} ، $|\vec{CA} + \vec{CB}| < |\vec{CA}| + |\vec{CB}|$ است. از اینرو $CC_1 < \frac{1}{2}(CA + CB)$ استنتاج می‌شود.

۴۱۷ • می‌دانیم که $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{0}$ است. از اینرو $\vec{OM} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$ بوده و نقطه دلخواهی از صفحه است. چون \vec{OA} ، \vec{OB} ، \vec{OC} بردارهای ناهمخط هستند، داریم:


$$|\vec{OM}| < \frac{1}{3}(|\vec{OA}| + |\vec{OB}| + |\vec{OC}|)$$

از اینرو $OM < \frac{1}{3}(OA + OB + OC)$ حاصل می‌شود.

۴۱۸ • طبق فرض $ABCD$ و $AB_1C_1D_1$ متوازی الاضلاع بوده و بنابراین داریم (شکل ۲۱۳).

$$\vec{AC}_1 = \vec{AB}_1 + \vec{AD}_1 \quad \vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$$

با تفریق تساوی برداری دوم از تساوی اول $\vec{AC}_1 - \vec{AC} = \vec{AB}_1 - \vec{AB} + \vec{AD}_1 - \vec{AD}$ حاصل می‌شود. در نتیجه $\vec{CC}_1 = \vec{BB}_1 + \vec{DD}_1$ استنتاج می‌شود که از آن نیز $CC_1 \leq BB_1 + DD_1$ بدست می‌آید.



شکل ۲۱۳

۴۱۹ • اگر A_0 ، B_0 ، C_0 و D_0 بترتیب میانگانه پاره خط‌های AA_1 ، BB_1 ، CC_1 باشند.

(شکل ۲۱۴ a) آنگاه به ازاء نقطه دلخواه O در صفحه داریم:

$$\vec{OA}_0 = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OA}_1) \quad \vec{OB}_0 = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OB}_1) \quad \vec{OC}_0 = \frac{1}{2}(\vec{OC} + \vec{OC}_1)$$




$$\vec{OD}_0 = \frac{1}{2}(\vec{OD} + \vec{OD}_1)$$

از این روابط زیر بدست می آید.

$$\vec{A_0B_0} = \vec{OB_0} - \vec{OA_0} = \frac{1}{2} (\vec{OB} - \vec{OA} + \vec{OB_1} - \vec{OA_1}) = \frac{1}{2} (\vec{AB} + \vec{A_1B_1}),$$

$$\vec{D_0C_0} = \vec{OC_0} - \vec{OD_0} = \frac{1}{2} (\vec{OC} - \vec{OD} + \vec{OC_1} - \vec{OD_1}) = \frac{1}{2} (\vec{DC} + \vec{D_1C_1}).$$

طبق فرض $ABCD$ و $A_1B_1C_1D_1$ متوازی الاضلاع بوده و از اینرو $\vec{A_1B_1} = \vec{D_1C_1}$ و $\vec{AB} = \vec{DC}$ است. در نتیجه $\vec{A_0B_0} = \vec{D_0C_0}$ بوده و چهارضلعی $A_0B_0C_0D_0$ متوازی الاضلاع خواهد بود. حالت های خاص مسئله در اشکال b و c و ۲۱۴c نشان داده شده اند.



شکل ۲۱۴

۴۲۰ • فرض کنید که $\frac{AP}{PB} = \frac{BQ}{QC} = \frac{CR}{RD} = \frac{DS}{SA} = k$ بوده O نقطه دلخواهی در صفحه باشد. داریم:

که از آن نیز $k = \frac{\vec{AP}}{\vec{PB}} = \frac{\vec{OP} - \vec{OA}}{\vec{OB} - \vec{OP}}$ بدست آمده و از اینرو $\vec{OP} = \frac{\vec{OA} + k\vec{OB}}{k+1}$ را خواهیم داشت.

بطریق مشابه $\vec{OQ} = \frac{\vec{OB} + k\vec{OC}}{k+1}$, $\vec{OR} = \frac{\vec{OC} + k\vec{OD}}{k+1}$ و $\vec{OS} = \frac{\vec{OD} + k\vec{OA}}{k+1}$ حاصل می شود. به آسانی استنباط می شود که $\vec{PQ} = \vec{SR}$ است. درحقیقت داریم:

$$\vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP} = \frac{1}{k+1} (\vec{OB} - \vec{OA}) + \frac{k}{k+1} (\vec{OC} - \vec{OB}) = \frac{1}{k+1} \vec{AB} + \frac{k}{k+1} \vec{BC}$$

$$\vec{SR} = \vec{OR} - \vec{OS} = \frac{1}{k+1} (\vec{OC} - \vec{OD}) + \frac{k}{k+1} (\vec{OD} - \vec{OA}) = \frac{1}{k+1} \vec{DC} + \frac{k}{k+1} \vec{AD}$$

ولی $\vec{AB} = \vec{DC}$ و $\vec{BC} = \vec{AD}$ بوده و بنابراین $\vec{PQ} = \vec{SR}$ خواهد بود. در نتیجه $PQRS$ یک متوازی الاضلاع خواهد بود.

۴۲۱ • نقاط تلاقی میانه های مثلث های ABC و $A_1B_1C_1$ را با G و G_1 نشان می دهیم. فرض می کنیم

که: $CG \parallel A_1B_1$ و $BG \parallel A_1C_1$, $AG \parallel B_1C_1$.

آنگاه طبق فرض $\vec{GB} = \mu (\vec{G_1C_1} - \vec{G_1A_1})$, $\vec{GB} = \lambda (\vec{G_1B_1} - \vec{G_1C_1})$ و $\vec{GA} = \gamma (\vec{G_1A_1} - \vec{G_1B_1})$ خواهد بود. با تجمیع طرفین این تساوی ها چنین حاصل می شود:

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{G_1A_1} (\gamma - \mu) + \vec{G_1B_1} (\lambda - \gamma) + \vec{G_1C_1} (\mu - \lambda)$$

ولی $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ بوده و از اینرو داریم: $\vec{G_1A_1} (\gamma - \mu) + \vec{G_1B_1} (\lambda - \gamma) + \vec{G_1C_1} (\mu - \lambda) = \vec{0}$

از طرف دیگر نیز $\vec{G}_1A_1 + \vec{G}_1B_1 + \vec{G}_1C_1 = \vec{0}$ در دسترس قرار می‌گیرد.

از این رو به $\lambda = \mu = \nu$ وصول می‌یابیم. بدین ترتیب

$$\frac{1}{\lambda} (\vec{GA} - \vec{GB}) = \vec{G}_1A_1 + \vec{G}_1B_1 - 2\vec{G}_1C_1 = 3(\vec{G}_1A_1 + \vec{G}_1B_1) = -3\vec{G}_1C_1$$

حاصل می‌شود. یعنی رابطه $\frac{1}{\lambda} \vec{BA} = -3\vec{G}_1C_1$ بدست می‌آید که از آن نیز $BA \parallel G_1C_1$ استنتاج می‌شود.

۴۲۲ • فرض می‌کنیم که A_1, B_1, C_1, D_1 بترتیب نقاط تلاقی میانه‌های مثلث‌های DAB, CD_1A, BCD و ABC باشد. داریم:

$$\vec{OA}_1 = \frac{1}{3}(\vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD}), \vec{OB}_1 = \frac{1}{3}(\vec{OC} + \vec{OD} + \vec{OA})$$

$$\vec{OC}_1 = \frac{1}{3}(\vec{OD} + \vec{OA} + \vec{OB}) \text{ و } \vec{OD}_1 = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) \quad (1)$$

اگر M_1 و M محل تلاقی میانخط‌های چهارضلعی‌های $AB_1C_1D_1$ و $ABCD$ باشد آنگاه

$$\vec{OM}_1 = \frac{1}{4}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD})$$

خواهد بود. با منظور کردن تساوی (1) رابطه $\vec{OM} = \frac{1}{4}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD})$ بدست می‌آید که $M_1 = M$ را ثابت می‌کند.

۴۲۳ • فرض کنید که R میانگاه ML بوده و $d \parallel OR$ باشد (شکل ۲۱۵). به عنوان مثال ثابت

می‌کنیم که در این حالت $OE \parallel c$ است. E میانگاه NP می‌باشد.

آنگاه $\vec{ON} = n\vec{OM}$ و $\vec{OP} = m\vec{OL}$ و $\vec{OR} \parallel NP$ یعنی $\vec{OR} = k(\vec{OM} + \vec{OL})$ و $\vec{OP} - \vec{ON} = k(\vec{OM} + \vec{OL})$ خواهد بود. جاگذاری

مقادیر \vec{OP} و \vec{ON} در تساوی اخیر به $k\vec{OM} + k\vec{OL} = m\vec{OL} - n\vec{OM}$ یعنی $(m-k)\vec{OL} = (k+n)\vec{OM}$

منجر می‌شود. از آنجا که بردارهای \vec{OL} و \vec{OM} ناهمخط هستند، $m-k=0$ و $k+n=0$ خواهد بود.


یعنی $m=k$ و $n=-k$ حاصل می‌شود. آنگاه $\vec{OP} = k\vec{OL}$ و $\vec{ON} = -k\vec{OM}$ استنتاج می‌گردد.

بردار $(\vec{ON} + \vec{OP})$ را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم که با

$$\vec{OE} = \vec{ON} + \vec{OP} = -k\vec{OM} + k\vec{OL} = k(\vec{OL} - \vec{OM}) = k\vec{ML}$$

همخط است. در نتیجه $OE \parallel ML$ خواهد بود. بطریق مشابه می‌توان ویژگی مطروحه را در مورد خطوط

دیگر نیز ثابت کرد.



شکل ۲۱۵

۴۲۴ • فرض کنید که خطوط m_1 و l_1 در نقطه K همدیگر را قطع کنند (شکل ۲۱۶). ثابت کنید که

$\vec{KC} \parallel n$ است. داریم:

$$\vec{KC}_0 = \vec{SC}_0 - \vec{SK}, \vec{SC}_0 = \frac{1}{2} \vec{SA} + \frac{1}{2} \vec{SB}$$

$$\vec{SK} = \vec{SA}_0 + \vec{A_0B_0} + \vec{B_0K} = \frac{1}{2} \vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SC} + \frac{1}{2} \vec{SA} - \frac{1}{2} \vec{SB} + m\vec{SB} = m\vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SA} + \frac{1}{2} \vec{SC}$$


از طرف دیگر نیز رابطه زیر را داریم:

$$\vec{SK} = \vec{SB}_0 + \vec{B_0A_0} + \vec{A_0K} = \frac{1}{2} \vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SC} + \frac{1}{2} \vec{SA} - \frac{1}{2} \vec{SA} + n\vec{SA} = n\vec{SA} + \frac{1}{2} \vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SC}$$

آنگاه $m\vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SA} = n\vec{SA} + \frac{1}{2} \vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SC} = n\vec{SA} + \frac{1}{2} \vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SC}$ یا $m\vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SA} + \frac{1}{2} \vec{SC} = n\vec{SA} + \frac{1}{2} \vec{SB} + \frac{1}{2} \vec{SC}$ حاصل می شود که از آن نیز $m = \frac{1}{2}$ یا $n = \frac{1}{2}$ استنتاج می شود. بدین ترتیب داریم:

$$\vec{SK} = \frac{1}{2} (\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$$

آنگاه $\vec{KC}_0 = \frac{1}{2} \vec{SA} + \frac{1}{2} \vec{SB} - \frac{1}{2} (\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC}) = -\frac{1}{2} \vec{SC}$ در نتیجه $\vec{KC}_0 \parallel \vec{SC}$ حاصل می شود. یعنی خط n_1 از نقطه تلاقی خطوط l_1 و m_1 می گذرد.



شکل ۲۱۶

۴۲۵ • به راه حل مسئله ۴۲۴ مراجعه کنید.

۴۲۶ • ابتدا ثابت کنید که در دو چهارضلعی رابطه $\vec{MN} = \frac{1}{2} (\vec{CD} + \vec{BA})$ که در آن M و N به ترتیب

میانگاه اضلاع CB و DA هستند و $\vec{MN} = \vec{MC} + \vec{CD} + \vec{DN}$ و $\vec{MN} = \vec{MB} + \vec{BA} + \vec{AN}$ برقرار می باشد.

با جمع این تساویها و منظور کردن $\vec{DN} + \vec{AN} = 0$ و $\vec{MC} + \vec{MB} = 0$ به $\vec{MN} = \frac{1}{2} (\vec{CD} + \vec{BA})$

وصول می یابیم. اگر بردارهای \vec{CD} و \vec{BA} ناهمخط باشند آنگاه $\vec{MN} < \frac{1}{2} (\vec{CD} + \vec{BA})$ بدست می آید.

در نتیجه $CD \parallel BA$ بوده و چهارضلعی $ABCD$ متوازی الاضلاع یا دوزنقه خواهد بود.

۴۲۷ • چنین داریم: $\vec{AA}_1 + \vec{BB}_1 + \vec{CC}_1 = 0$. بدین ترتیب

$$\vec{OA}_1 - \vec{OA} + \vec{OB}_1 - \vec{OB} + \vec{OC}_1 - \vec{OC} = 0$$

حاصل می شود. اگر O نقطه تلاقی میانه های مثلث ABC باشد آنگاه $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 0$ بوده و در


نتیجه $\vec{OA}_1 + \vec{OB}_1 + \vec{OC}_1 = 0$ خواهد بود.

از اینرو نتیجه می شود که O محل تلاقی میانه های مثلث $A_1B_1C_1$ است.

۴۲۸ • داریم: $\vec{CA}_2 = \vec{A_2A} + \vec{AC}$. در دوران با زاویه 90° ، $\vec{A_2A}$ به \vec{CB} و \vec{AC} به \vec{BB}_2 انتقال می یابد؛

یعنی \vec{CA}_2 به $\vec{CB} + \vec{BB}_2 = \vec{CB}$ منتقل می شود که از آن نیز $CA_2 \perp CB_2$ و $CA_2 = CB_2$ استنتاج می گردد.

۴۲۹ • فرض کنید که D میانگاه $C_1C'_1$ (شکل ۲۱۷) بوده و $\vec{CD} = \frac{1}{2}(\vec{CC}_1 + \vec{CC}'_1)$ باشد. در دوران به اندازه زاویه 90° بردارهای \vec{CC}_1 و \vec{CC}'_1 به ترتیب به بردارهای \vec{CA} و $-\vec{CB}$ منتقل می‌شوند. در نتیجه این دوران مجموع برداری $\vec{CC}_1 + \vec{CC}'_1$ را به بردار $\vec{CA} - \vec{CB}$ یعنی به بردار \vec{BA} انتقال می‌دهد. بدین ترتیب $\vec{BA} \perp (\vec{CC}_1 + \vec{CC}'_1)$ و $|\vec{BA}| = |\vec{CC}_1 + \vec{CC}'_1|$ بوده و از اینجا حکم مسئله اثبات می‌گردد.




شکل ۲۱۷

۴۳۰ • ثابت کنید بردار \vec{PR} با دوران بردار \vec{SQ} با زاویه 90° بدست می‌آید (شکل ۲۱۸). چنین داریم: $\vec{SQ} = \vec{SL} + \vec{LK} + \vec{KQ}$ یا $\vec{SQ} = \vec{SL} + \frac{1}{2}(\vec{DC} + \vec{AB}) + \vec{KQ}$. اگر هر یک از بردارهای واقع در طرف راست تساوی آخر را به اندازه 90° دوران دهیم آنگاه \vec{SL} به $\frac{1}{2}\vec{AD}$ ، \vec{LD} به $\frac{1}{2}\vec{DC}$ ، \vec{MR} به $\frac{1}{2}\vec{BC}$ نیز به $\frac{1}{2}\vec{AB}$ و \vec{PN} به $\frac{1}{2}\vec{BC}$ منتقل می‌شود. و آنگاه \vec{SQ} نیز به

$$\frac{1}{2}\vec{AD} + \vec{MR} + \vec{PN} + \frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{PN} + \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) + \vec{MR} = \vec{PN} + \vec{NM} + \vec{MR} = \vec{PR}$$

انتقال می‌یابد. از اینرو \vec{PR} با دوران \vec{SQ} به اندازه 90° بدست می‌آید. در نتیجه $PR \perp SQ$ و $PR = SQ$ خواهد بود.



شکل ۲۱۸

۴۳۱ • بدلیل

$$\vec{MD} = -(\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}) \text{ یعنی } \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = \vec{0}, \quad \frac{\vec{MA} + \vec{MB}}{2} = -\frac{\vec{MC} + \vec{MD}}{2}$$

را داریم. آنگاه $\vec{U} = \vec{MA} + \vec{MB}$ و $\vec{V} = -\vec{MD}$ یعنی $\vec{V} = \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = -\vec{MD}$ حاصل می‌شود.

این امر بدین معنی است که M میانگاه پاره خط DV است. مساحت چهارضلعی $MAUV$ را به دو طریق بیان می‌کنیم:

$$(a) S_{MAUV} = S_{MAV} + S_{MUV} = S_{MAB} + S_{MCD}$$

$$(b) S_{MAUV} = S_{MAV} + S_{UAV} = S_{MAD} + S_{MBC}$$

از اینرو $S_{MAUV} = 2S_{MAB} + S_{MCD} + S_{MAD} + S_{MBC} = S_{ABCD}$ و در نتیجه $S_{MAUV} = 2$ بوده و در نتیجه حاصل می‌شود.

۴۳۰. اگر AL و BK میانه‌های مثلث ABC ، M نقطه تلاقی AL و BK باشد آنگاه

$$\vec{KL} = \frac{1}{2} \vec{AB} \quad (1)$$

را خواهیم داشت. از این گذشته

$$\vec{KL} = \vec{KM} + \vec{ML} \quad (2)$$

را داریم. از تساوی‌های (1) و (2) نتیجه می‌شود که $\vec{AB} = \frac{1}{2}(\vec{KM} + \vec{ML})$ بوده و از اینرو

$$2\vec{KM} + 2\vec{ML} = \vec{AB} \quad \text{ولی } \vec{AM} + \vec{MB} = \vec{AB} \quad \text{بوده و بنابراین } \vec{AM} + \vec{MB} = \vec{AB}$$

$$(\vec{AM} - 2\vec{ML}) + (\vec{MB} - 2\vec{KM}) = 0$$

را داریم. بردارهای $\vec{AM} - 2\vec{ML}$ و $\vec{MB} - 2\vec{KM}$ با بردارهای \vec{AL} و \vec{BK} همخط هستند. از اینرو

$$\vec{AM} - 2\vec{ML} = 0 \quad \text{و} \quad \vec{MB} - 2\vec{KM} = 0 \quad \text{یعنی } \vec{AM} = 2\vec{ML} \quad \text{و} \quad \vec{MB} = 2\vec{KM} \quad \text{را داریم. بنابراین}$$

$$\frac{|\vec{ML}|}{|\vec{KM}|} = 2 \quad \text{و} \quad \frac{|\vec{AM}|}{|\vec{MB}|} = 2 \quad \text{استنتاج می‌گردد.}$$

۴۳۳. قبل از همه ثابت کنید که نقاط M ، N و B به یک خط تعلق دارند. برای این کار ثابت کنید که

بردارهای \vec{MN} و \vec{NB} همخط هستند. چنین داریم:

$$\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{AN}, \quad \vec{MA} = \frac{1}{5} \vec{DA}, \quad \vec{AN} = \frac{1}{6} (\vec{AB} + \vec{AD})$$

$$\vec{MN} = \frac{1}{5} \vec{DA} + \frac{1}{6} \vec{AB} - \frac{1}{6} \vec{DA} = \frac{1}{6} \vec{AB} + \frac{1}{30} \vec{DA} = \frac{1}{30} (5\vec{AB} + \vec{DA})$$

$$\vec{NB} = \vec{NA} + \vec{AB} = \vec{AB} - \frac{1}{6} \vec{AB} - \frac{1}{6} \vec{AD} = \frac{5}{6} \vec{AB} + \frac{1}{6} \vec{DA}$$

$$\vec{NB} = \frac{1}{6} (5\vec{AB} + \vec{DA})$$

از اینرو $\vec{NB} = 5\vec{MN}$ بوده و در نتیجه بردارهای \vec{NB} و \vec{MN} همخط خواهند بود. نقطه N پاره خط MB را به نسبت 5:1 تقسیم می‌کند.

۴۳۴. به زبان برداری مطلوب مسئله این است که $\vec{MO} = \vec{ON}$ ثابت شود. در این رابطه O محل تلاقی

پاره خط‌هایی است که نقاط انتهایی آنها میانگانه اضلاع مقابل چهارضلعی $ABCD$ ، M و N میانگانه اقطار AC و BD است. چنین داریم: $\vec{MO} = \vec{MP} + \vec{PO}$ و $\vec{MP} = \frac{1}{2} \vec{DA}$. از اینرو

$$\vec{MO} = \frac{1}{2} \vec{DA} + \vec{FO} \quad (1)$$

حاصل می‌شود. از این گذشته $\vec{ON} = \vec{OR} + \vec{RN}$ بوده و در نتیجه

$$\vec{ON} = \frac{1}{2} \vec{DA} + \vec{OR} \quad (2)$$

استنتاج می‌شود.

با مقایسه تساوی‌های (1) و (2) و با یادآوری $\vec{PO} = \vec{OR}$ به $\vec{PO} = \vec{ON}$ و \vec{MO} وصول می‌یابیم.

۴۳۵ • اگر پاره‌خط‌های A_1A_2 و B_1B_2 روی خطوط موازی با l_1 واقع شوند آنگاه در حالت $\vec{A_1A_2} = \vec{B_1B_2}$

بینهایت جواب وجود خواهد داشت. یعنی کافی است که روی خط مستقیم هر پاره‌خطی مانند C_1C_2

را طوری اختیار کنیم که $\vec{C_1C_2} = \vec{A_1A_2}$ باشد. و اگر پاره‌خط‌های مفروض طوری باشند که $\vec{A_1A_2} \neq \vec{B_1B_2}$

برقرار شود آنگاه نقاط مطلوب C_1 و C_2 موجود نخواهند بود. حال برای قاطعیت فرض کنید که A_1A_2 موازی

l نبوده و A_1 نقطه تلاقی خطوط A_1A_2 و l_1 باشد.

روی خط B_1B_2 دو نقطه M_1 و M_2 را طوری مشخص کنید که $A_2A_1 : A_2A_3 = B_2M_1 : B_2M_2$ باشد و نقطه B_3

را با شرط زیر رسم کنید:

اگر A_1 بین دو نقطه دیگر روی خط A_1A_2 واقع شود آنگاه B_1 بین دو نقطه دیگر در خط B_1B_2 واقع خواهد

بود. حال نقاط B_1 و A_1 را بهم متصل کرده و از نقاط B_1 و B_3 خطوطی به موازات A_2B_3 رسم کنید.

نقاط تلاقی آنها را با خط l و C_1 و C_2 می‌نامیم.

در حقیقت $\frac{C_1C_2}{C_2A_3} = \frac{B_1B_2}{B_2} = \frac{A_1A_2}{A_2A_3}$ را داریم که از آن نیز $\frac{C_1A_2}{C_2A_3} = \frac{A_1A_2}{A_2A_3}$ استنتاج می‌شود.

آنگاه زوایای $A_1C_1A_2$ و $A_2C_2A_3$ به عنوان زوایای متناظر از مثلث‌های مشابه $A_1C_1A_2$ و $A_2C_2A_3$ برابر بوده

و $A_1C_1 \parallel A_2C_2$ در می‌آید.

۴۳۶ • در حل این مسئله از روش برداری استفاده می‌کنیم (شکل ۲۱۹). طبق ویژگی مجموع بردارها

$$\vec{A_1B_2} + \vec{B_2B_1} + \vec{B_1C_2} + \vec{C_2C_1} + \vec{C_1A_2} + \vec{A_2A_1} = \vec{0}$$

با استفاده از ویژگی‌های شرکت‌پذیری و جابجایی در جمع بردارها چنین حاصل می‌شود.

$$\vec{B_2B_1} + \vec{C_2C_1} + \vec{A_2A_1} + (\vec{A_1B_2} + \vec{B_1C_2} + \vec{C_1A_2}) = \vec{0}$$

بدلیل $\vec{C_1A_2} = \vec{CA}$ ، $\vec{A_1B_2} = \vec{AB}$ ، $\vec{B_1C_2} = \vec{BC}$ و $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$ مجموع بردارهای واقع در داخل

پرانتز نیز برابر صفر خواهد بود.

بدین ترتیب $\vec{B_2B_1} + \vec{C_2C_1} + \vec{A_2A_1} = \vec{0}$ بوده و آنگاه $\vec{B_2B_1} = \vec{C_1C_2} - \vec{A_2A_1}$ حاصل می‌شود.

روشن است که هر سه بردار مفروض را می‌توان برحسب تفاضل دو بردار دیگر ارائه داد.

اگر بردارها ناهمخط باشند آنگاه مثلث مطلوب موجود خواهد بود. ولی دو بردار از سه بردار مفروض

نمی‌توانند همخط باشند زیرا در اینصورت بردار سوم نیز با آنها همخط خواهد بود. اگر رأس سوم A_1

با هر نقطه‌ای از خط موازی C_1C_2 نشان داده شود آنگاه چنین حاصل می‌شود (شکل ۲۲۰):


$$\vec{B_2B_1} = \vec{B_2B} + \vec{BB_1} = \vec{A_1A} + \vec{CC_2} = (\vec{A_1A_2} + \vec{A_2A}) + (\vec{CC_1} + \vec{C_1C_2}) = (\vec{A_1A_2} + \vec{C_1C_2}) + (\vec{A_2A} + \vec{CC_1}) = \vec{A_1A_2} + \vec{C_1C_2}$$

بدین ترتیب $\vec{B_2B_1} = \vec{A_1A_2} + \vec{C_1C_2}$ بوده و مثلث مطلوب موجود نخواهد بود.


بنابراین رسم این مثلث در صورتی ممکن می‌شود که بردارهای متناظر به پاره‌خط‌های مفروض، ناهمخط باشند. راه حل مسئله قبل را با استفاده از تبدیل مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. فرض می‌کنیم که $\vec{B_2B_1}$ ، $\vec{C_1C_2}$ و $\vec{A_1A_2}$ بردارهای ناهمخط باشند.

با تبدیل T_{CA} مثلث CC_1C_2 را انتقال می‌دهیم (شکل ۲۲۱). آنگاه به CC_1 ، AB_3 به CC_2 ، و $AB_2 = B_2B_1$ و $AB_2 \parallel B_2B_1$ ، $BB_1 = CC_2$ و $BB_1 \parallel CC_2$: درحقیقت داریم: $CC_2 = AB_3$ و $CC_2 \parallel AB_3$ می‌شود: $CC_2 = AB_3$ و $CC_2 \parallel AB_3$.


و در نتیجه C_1C_2 به A_2B_3 منتقل می‌شود. سرانجام در تبدیل T_{B-A} در مورد مثلث BB_1B_2 چنین حاصل می‌شود: B_2 به B_1 ، A_1 به B_2 ، B_2 به B_1 ، C_2 به B_3 ، C_1 به A_2 انتقال می‌یابد. بدین ترتیب اضلاع مثلث $A_1B_3A_2$ با پاره‌خط‌های A_2A_1 و C_2C_1 ، B_2B_1 برابر خواهد شد.



شکل ۲۱۹



شکل ۲۲۰



شکل ۲۲۱

$$2 \left(1 + \sin \frac{\beta}{2} \right) \sqrt{\frac{2S}{\sin \beta}} (c); \quad 2 \sqrt{S \tan \frac{\beta}{2}} (b); \quad 2 \sqrt{\frac{2S}{\sin \beta}} (a) \bullet ۵۴۳$$

$$b + \frac{c}{2} \bullet ۵۴۵ \quad \cdot \arccos \frac{4}{5} \bullet ۵۴۴$$

• ۵۴۶ کوچکترین مقدار مطلوب برابر h_c و بزرگترین مقدار برابر h_a است.

• ۵۴۷ قطر مستطیل ارتفاع مثلث است.

• ۵۵۰ $108 \text{ cm}^2 (b); 6000 \text{ cm}^2 (a)$ $30 \text{ cm} \bullet ۵۴۹$ $4 \sqrt{2} \text{ m} \bullet ۵۴۷$

• ۵۵۱ $S = 32 \text{ cm}^2$ و $KD = MD = 5 \text{ cm}$ $36.125 \text{ cm}^2 (b), 45 \text{ cm}^2 (a) \bullet ۵۵۲$

• ۵۵۳ $AC = BC (b), (a) \bullet ۵۵۴$ ؛ زاویه مرکزی قطاع برابر ۲ است.

• ۵۵۵ $\frac{3}{4} R^2 \sqrt{3} \bullet ۵۵۷$ $\frac{\sqrt{h^2 + 8R^2} - 3h}{4} \bullet ۵۵۶$ $\frac{p}{\pi + 4} \bullet ۵۵۵$

• ۵۵۸ روش اول. فرض کنید که در مثلث ABC ، $AC = b$ و $\angle B = \beta$ باشد. با در نظر گرفتن عبارت $\angle BAC = x$ اضلاع AB و BC را بر حسب b ، x و β بیان کرده و با دوبرابر کردن میانه مثلث، متوازی الاضلاعی رسم می‌کنیم.

روش دوم (روش هندسی). بر مثلث ABC دایره ای محیط کرده و ثابت کنید میانه BM از مثلث دلخواه از میانه B_1M مربوط به مثلث متساوی الساقین AB_1C کوتاهتر است.

۵۵۹. فرض کنید که AP و CK بر l عمود باشند. عبارت $\angle PBA = x$ را در نظر بگیرید. بعد از تکمیل محاسبات ثابت کنید $PB = BK$ است.

۵۶۰. $(a) \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$ ، $(b) 3\sqrt{3}r^2$. نصف زاویه مجاور به قاعده در مثلث را با x نشان دهید.

۵۶۱. $cm^2 \cdot \frac{75}{4}$. فرض کنید $PKME$ دوزنقه محاطی، نقطه E روی BC ، و نقطه M روی CD واقع باشد. مثلث های PAK و ECM متشابه هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت، عبارت $CM = 2x$ و $CE = 3x$ را منظور کنید.

۵۶۲. 100° . به مثال ۴ بخش ۷ رجوع کنید.

فصل دوم

۵۶۳. (a) میانگاه یال های چهار وجهی را با S_1, S_2, S_3, S_4 (شکل ۲۲۲) و نقطه تلاقی میانه های وجوه را با M_1, M_2, M_3, M_4 نشان می دهیم. پاره خط های DM_1 و AM_2 واقع در صفحه ADS_1 متقاطع هستند. نقطه تلاقی آنها را با O نشان می دهیم.

بدلیل $[DA] \parallel [M_1M_2]$ و $|DA| = 1/3 |M_1M_2|$ از تشابه مثلث های M_1OM_2 و DOA نتیجه می شود که $|DO|/|OM_1| = |AO|/|OM_2| = |DA|/|M_1M_2| = 3/4$ است.

بطریق مشابه (با ملاحظه مثلث های BS_5D و CS_6D) می توان ثابت کرد که پاره خط های BM_3 و CM_4 نیز پاره خط DM_1 را از طرف رأس یعنی از طرف همان نقطه O به نسبت $3/4$ تقسیم می کنند. پاره خط های BM_3 و CM_4 با همان نقطه به همان نسبت تقسیم می شوند.

(b) ثابت می کنیم که O میانگاه پاره خط S_1S_2 است. مثلث ADS_1 را مورد ملاحظه قرار می دهیم (اشکال ۲۲۲ و ۲۲۳). نماد $O' = [DM_1] \cap [S_1S_2]$ را در نظر گرفته و $O' = O$ را ثابت می کنیم. پاره خط S_1S_2 میانه مثلث DS_1A است.


بدلیل $[AD] \parallel [M_1M_2]$ پاره خط S_1S_2 پاره خط M_1M_2 را در میانگاه آن قطع می کند (شکل ۲۲۳). با منظور کردن $|DA| = 1/3 |M_1M_2| = |S_2D|$ از تشابه مثلث های KM_1O' و S_2DO' به

$$|KO'|/|S_2O'| = |M_1O'|/|DO'| = 1/3$$


وصول می یابیم. همچنین $|O'S_2| = \frac{3}{4} |KS_2|$ را بدست می آوریم.

بدلیل $|KS_2| = \frac{2}{3} |S_1S_2|$ و $|O'S_2| = \frac{1}{2} |S_1S_2|$ می رسمیم. بدین ترتیب نقطه $O (O=O')$ میانگاه

پاره خط S_1S_2 خواهد بود. با ملاحظه مثلث های BS_6D و CS_3D می توان بطریق مشابه ثابت کرد که نقطه O میانگاه پاره خط های S_3S_4 و S_5S_6 است.



شکل ۲۲۲



شکل ۲۲۳

۵۶۴ • رسم برش در شکل ۲۲۴ نشان داده شده است.

(1) $S = (MN) \cap (AC)$ (2) $Q = (SP) \cap [AB]$

با اختصاص $|BQ| = xa$ خطی بصورت $|QQ_1| \parallel [AC]$ رسم می کنیم. آنگاه $|QQ_1| = |BQ_1| = xa$


را داریم. بدلیل $|BP| = \frac{4}{5}a$ به $|Q_1P| = (\frac{4}{5} - x)a$ وصول می یابیم.

از تشابه مثلث های SPC و QPQ_1 نتیجه می شود که $|SC|/|QQ_1| = |CP|/|Q_1P|$ است. از اینجا نیز

$|SC| = \frac{x}{4-5x}a$ را داریم. خطی بصورت $[MM_1] \parallel [AC]$ رسم می کنیم. با استدلال بطریق مشابه

به $|SC| = a/3$ می رسمیم. این امر به معنی $x/(4-5x) = 1/3$ است که از آن نیز $x = 1/2$ ، $BQ = a/2$ ،

بدست می آید و جواب مسئله عبارت از $a/2$ خواهد بود.



شکل ۲۲۴

۵۶۵ • نقطه تلاقی خط AM و صفحه SCD را رسم می کنیم. بدلیل $(AB) \parallel (CD)$ به $(AB) \parallel (SCD)$


دست می یابیم. و این امر بدین معنی است که صفحات SAB و SCD در امتداد خط موازی با (AB)

همدیگر را قطع می کنند (در شکل ۲۲۵، $l \parallel (AB)$ است). چنین حاصل می شود:

$S_1 = (AM) \cap l = (AM) \cap (SCD)$ ، $N = (S_1P) \cap [SC]$

برش عبارت از چهار ضلعی $AMNP$ است. رابطه $S_2 = (S_1P) \cap (CD)$ را در نظر بگیرید. M و P .

میانگاه پاره خط های SB و SD بوده و چنین داریم: $|S_2D| = |S_1S| + |S_1S_2| = |AB|$
 بدلیل $|CD| = |AB|$ نیز داریم: $|S_2D| = |CD|$ و $|S_2C| = 2|CD|$
 حال از تشابه مثلث های SNS_1 و CNS_2 به $1/2$ می رسیم. $|SN|/|NC| = |SS_1|/|CS_2| = 1/2$ می رسمیم.



شکل ۲۲۵

۵۶۶ • صفحه NQP را مورد ملاحظه قرار می دهیم. این صفحه، وجه BCC_1B_1 را در امتداد پاره خط CQ قطع می کند. صفحه برش، صفحه NQP را در امتداد خط موازی با NQ قطع می کند. خطی در صفحه NQP بصورت $(NQ) \parallel (PT)$ رسم می کنیم (شکل ۲۲۶). نقطه $T = (PT) \cap (CQ)$ به صفحه برش متعلق است. توجه دارید که بدلیل $|CP| = |PN|$ چنین داریم: $|CT| = |TQ|$. آنگاه ترسیمات زیر را انجام می دهیم:

$$S_1 = (MP) \cap (BC) \quad S_2 = (S_1T) \cap |CC_1| \quad S_3 = (S_1T) \cap |B_1C_1|$$

$$S_4 = (S_1T) \cap (BB_1) \quad S_5 = (MP) \cap (AB) \quad S_6 = (S_4S_6) \cap |A_1B_1|$$

$S_7 = (S_4S_6) \cap [AA_1]$ برش مطروحه عبارت از شش ضلعی $MPNS_2S_3S_6S_7$ است. حال مساحت

برش را محاسبه می کنیم. به آسانی دریافت می شود که $|S_1C| = |S_6A| = a/3$ است. نقطه T میانگاه

پاره خط CQ بوده $|QS_6| = |S_1C| = a/3$ و $|S_3B_1| = a/3$ را داریم. مثلث های S_1S_2C و $S_3S_4B_1$ با

مثلث $S_3S_5C_1$ متشابه بوده و $|S_2C| = |S_4B_1| = a/3$ استنتاج می شود.

بدین ترتیب $|BS_1| = |BS_4| = |BS_6| = 4a/3$ را داریم. از اینرو مثلث $S_1S_4S_6$ متساوی الاضلاع


بوده و طول ضلع آن برابر $a/3\sqrt{2}$ و مساحت آن نیز برابر $8\sqrt{3} a^2/9$ است. هریک از مثلث های

S_1S_2P ، $S_4S_6S_3$ و S_6MS_7 با نسبت تشابه ۴ با مثلث های $S_1S_4S_6$ متشابه هستند. این امر بدین

معنی است که مساحت هریک از آن مثلث ها برابر $\frac{\sqrt{3}}{18} a^2$ است. $\frac{1}{16} \cdot \frac{8\sqrt{3}}{9} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{18} a^2$ است.

و حال می توان مساحت برش را بدست آورد: $\frac{13\sqrt{3}}{18} a^2 = \frac{8\sqrt{3}}{9} a^2 - 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{18} a^2$

یعنی مقدار آن برابر $\frac{13\sqrt{3}}{18} a^2$ است.




شکل ۲۲۶

۵۶۷ • فرض می‌کنیم که برشی از چهار وجهی باشد که بوسیله صفحه موازی خطوط AC و BD تشکیل شده باشد (شکل ۲۲۷)، $(\widehat{MN}, \widehat{MQ}) = (\widehat{AC}, \widehat{BD}) = \varphi$ ، و $[MN] \parallel [QP] \parallel [AC]$ و $[MQ] \parallel [NP] \parallel [BD]$ است).
 آنگاه $\widehat{MN}, \widehat{MQ} = \varphi$ را داریم که به معنی $\angle QMN = \varphi$ یا $\angle QMN = \pi - \varphi$ است. در هر دو حالت $\sin QMN = \sin \varphi$ را داریم.

با در نظر گرفتن عبارت $|AM|/|AB| = x$ به $|AM|/|AB| = x$ یا $|MQ| = x \times |BD| = xb$ وصول می‌یابیم.
 بدلیل $|MB| = (1-x)|AB|$ نتیجه می‌شود که $|MN| = (1-x)a$ است. آنگاه مساحت سطح برش عبارت از $S = |MQ||MN| \cdot \sin \varphi = x(1-x)ab \sin \varphi$ خواهد بود که در آن $0 < x < 1$.

تابع $x(1-x)$ (دوجمله‌ای درجه دوم بصورت $x - x^2$) به ازاء $x=1/2$ دارای بزرگترین مقدار بوده و این مقدار آن برابر $1/4$ است. این امر بدین معنی است که برشی که از میانگاه یال‌های AB, BC, CD, AD می‌گذرد دارای بیشترین مساحت بوده و مقدار این مساحت برابر $\frac{1}{4} ab \sin \alpha$ خواهد بود.
 پس جواب مسئله برابر $\frac{1}{4} ab \sin \alpha$ می‌باشد.




شکل ۲۲۷

۵۶۸ • ضرورت. اگر $\alpha \parallel \gamma$ فرض شود آنگاه نیم خط‌های $(MN), (A_1A_2)$ و $[MP]$ (شکل ۲۲۸) روی خطوط موازی با صفحه γ واقع خواهند بود. این امر به معنی هم‌صفحه بودن بردارهای $\vec{MN}, \vec{A_1A_2}$ و \vec{MP} است. از آنجا که بردارهای \vec{MN} و \vec{MP} هم‌صفحه نیستند (نقاط M, N, P روی یک خط قرار

ندارند) بردار $\vec{A_1A_2}$ را می‌توان برحسب این بردارها بیان کرد: $\vec{A_1A_2} = \alpha \vec{MN} + \beta \vec{MP}$
 کفایت. فرض می‌کنیم که $\vec{A_1A_2} = \alpha \vec{MN} + \beta \vec{MP}$ است. بردار $\vec{MQ} = \alpha \vec{MN} + \beta \vec{MP}$ را از نقطه M جدا می‌کنیم. اگر $\beta = 0$ باشد آنگاه $\vec{MQ} = \alpha \vec{MN}$ بوده و نقطه Q روی بردار MN واقع خواهد شد. بدلیل $\vec{A_1A_2} = \vec{MQ}$ جهات این بردارها برهم منطبق بوده و این امر بدین معنی است که نیم خط‌های $[A_1A_2]$ و $[MQ]$ که این جهت‌ها را تعریف می‌کنند روی خطوط موازی قرار دارند، یعنی: $a \parallel (MN)$. از اینرو نتیجه می‌شود که $a \parallel \gamma$ است.

بطریق مشابه اگر $\alpha = 0$ باشد آنگاه $a \parallel (MP)$ یعنی $a \parallel \gamma$ خواهد بود. اگر $\alpha \neq 0$ و $\beta \neq 0$ باشد آنگاه طبق قانون توازی نقطه Q به صفحه γ متعلق خواهد بود. از اینرو $\gamma \subset (MQ)$ داریم. از $\vec{A_1A_2} = \vec{MQ}$ درمی‌یابیم که $a \parallel (MQ)$ یعنی $a \parallel \gamma$ است.



شکل ۲۲۸

۵۶۹ • فرض کنید که $Q \in [AD]$ بوده و عبارت $|AQ|/|AD| = x$ را نیز در نظر بگیرید. (شکل ۲۲۹). خط‌های DM و AN موازی صفحه ماربر PQ بوده و بردارهای \vec{DM} ، \vec{AN} و \vec{PQ} همخط می‌باشند. و چون بردارهای \vec{DM} و \vec{AN} ناهمخط هستند از اینرو بردار \vec{PQ} را می‌توان برحسب این بردارها بیان کرد؛ یعنی اعدادی مانند α و β وجود دارد بطوریکه:
 $\vec{PQ} = \alpha \vec{DM} + \beta \vec{AN}$ (۱)
 حال بردارهای \vec{PQ} ، \vec{DM} و \vec{AN} را برحسب بردارهای ناهمخط \vec{AB} ، \vec{AC} و \vec{AD} بیان می‌کنیم.
 چنین داریم:

$$\vec{DM} = \vec{DA} + \vec{AM} = -\vec{AD} + \frac{1}{2} \vec{AB}, \quad \vec{AN} = \frac{1}{2} (\vec{AD} + \vec{AC})$$


$$\vec{PQ} = \vec{PB} + \vec{BA} + \vec{AQ} = \frac{1}{2} \vec{CB} - \vec{AB} + x \vec{AD} = \frac{1}{2} (\vec{AB} - \vec{AC}) - \vec{AB} + x \vec{AD} = -\frac{1}{2} \vec{AB} - \frac{1}{2} \vec{AC} + x \vec{AD}$$

با جاگذاری این روابط در (۱) چنین بدست می‌آید:

$$-\frac{1}{2} \vec{AB} - \frac{1}{2} \vec{AC} + x \vec{AD} = \frac{\alpha}{2} \vec{AB} + \frac{\beta}{2} \vec{AC} + \left(\frac{\beta}{2} - \alpha\right) \vec{AD}$$

روابط -1 ، $\alpha = -1$ ، $\beta = -1$ و $x = 1/2$ بدست می‌آید.

از اینرو $|AQ|/|AD| = 1/2$ و $|AQ| = |AD|/2$ حاصل شده و جواب مسئله عبارت از $1/4$ خواهد بود.



شکل ۲۲۹

۵۷۰ • بردارهای \vec{AP} و \vec{AQ} با بردار $\vec{AC_1}$ همخط بوده (شکل ۲۳۰)

از اینرو $\vec{AP} = x\vec{AC_1}$ و $\vec{AQ} = y\vec{AC_1}$ را داریم.

بنابراین $\vec{BQ} = -\vec{AB} + y\vec{AC_1} + \vec{A_1P} = -\vec{AA_1} + x\vec{AC_1}$ استنتاج می شود.

بدلیل $(A_1P) \perp (AC_1)$ رابطه $\vec{A_1P} \cdot \vec{AC_1} = 0$ را داریم که از آن نیز $x = \frac{\vec{AA_1} \cdot \vec{AC_1}}{|\vec{AC_1}|^2}$ استنتاج می شود.

از آنجا که $\vec{AC_1} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1}$ است روابط $a^2 + b^2 + c^2 = |\vec{AC_1}|^2$ و $\vec{AA_1} \cdot \vec{AC_1} = c^2$


حاصل می شود. این امر به معنی $x = c^2 / (a^2 + b^2 + c^2)$ است.

بطریق مشابه $y = a^2 / (a^2 + b^2 + c^2)$ بدست می آید.

از این گذشته $\vec{PQ} = \vec{AQ} - \vec{AP} = (y - x)\vec{AC_1}$ را داریم که به معنی

$$|PQ| = |y - x| \cdot |\vec{AC_1}| = |c^2 - a^2| / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

است. بنابراین جواب مسئله عبارت از $c^2 - a^2 / \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ خواهد بود.



شکل ۲۳۰

۵۷۱ • بدلیل $(MN) \perp (AB)$ رابطه $\vec{MN} \cdot \vec{BA} = 0$ استنتاج می گردد.

بردار \vec{MN} را برحسب بردارهای ناهمبافتحه \vec{BA} ، \vec{BC} و $\vec{BB_1}$ بیان می کنیم (شکل ۲۳۱).

اگر عبارات $|MB_1|/|AB_1| = x$ و $|BN|/|BC_1| = y$ را در نظر بگیریم آنگاه رابطه زیر را خواهیم داشت:

$$\vec{MN} = \vec{MB_1} + \vec{B_1B} + \vec{BN} = x\vec{AB_1} - \vec{BB_1} + y\vec{BC_1} = x(\vec{BB_1} - \vec{BA}) - \vec{BB_1} +$$

$$y(\vec{BB_1} + \vec{BC}) = -x\vec{BA} + y\vec{BC} + (x + y - 1)\vec{BB_1}$$

با منظور کردن $a = |BA| = |BC| = |BB_1|$ ، $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = a^2/2$ و $\vec{BA} \cdot \vec{BB_1} = \vec{BC} \cdot \vec{BB_1} = 0$ و با

توجه به $\vec{MN} \cdot \vec{BA} = 0$ و $|\vec{MN}|^2 = a^2/3$ دستگاه زیر حاصل می گردد:

$$\begin{cases} -xa^2 + \frac{y}{2}a^2 = 0, \\ x^2a^2 + y^2a^2 + (x+y-1)^2a^2 - xy a^2 = a^2/3 \end{cases}$$


از معادله اول دستگاه $2x = y$ و بنابراین از معادله دوم نیز $36x^2 - 18x + 2 = 0$ حاصل می‌شود. از این معادله $x_1 = 1/3$ و $x_2 = 1/6$ بدست می‌آید. متناظرأً $y_1 = 2/3$ و $y_2 = 1/3$ حاصل می‌شود.

از اینرو به آسانی دریافت می‌شود که یا $|AM|/|MB_1| = |BN|/|NC_1| = 2/1$ یا

$$|AM|/|MB_1| = 5/1, |BN|/|NC_1| = 1/2$$

خواهد بود، بنابراین جواب مسئله عبارت از $|AM|/|MB_1| = |BN|/|NC_1| = 2/1$ یا بصورت زیر است

$$|AM|/|MB_1| = 5/1, |BN|/|NC_1| = 1/2$$



شکل ۲۳۱

۵۷۲ • فرض کنید که: $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta, \alpha \cap \beta = c, \gamma \cap \alpha = a, \gamma \cap \beta = b$. مطلوب مسئله اثبات $\gamma \perp c$ است. نقطه M را روی خط c اختیار کرده و از آن عمود c_1 را بر a در صفحه α ، و عمود c_2 را بر b در صفحه β رسم می‌کنیم. آنگاه $\gamma \perp c_1$ و $\gamma \perp c_2$ بوده و چون تنها عمود بر γ را می‌توان از نقطه M رسم کرد از اینرو $c_1 = c_2 = c$ است.

بدلیل $c_2 \subset \beta, c_1 \subset \alpha, c_1 = c_2 = \alpha \cap \beta = c$. این امر به معنی $c \perp \gamma$ بوده و این همان چیزی است که می‌باید ثابت می‌کردیم.

۵۷۳ • ثابت می‌کنیم که (a) موجب (b) می‌شود.

فرض کنید که $|SA_1| = |SA_2| = \dots = |SA_n| = l$ (شکل ۲۳۲) بوده، SO ارتفاع هرم H و $|SU| = H$ است.

چنین داریم: $\sin SA_1O = \sin SA_2O = \dots = \sin SA_nO = H/l$ که از آن نیز


$$\angle SA_1O = \angle SA_2O = \dots = \angle SA_nO$$

بدست می‌آید. یعنی یال‌های جانبی با صفحه قاعده زوایای مساوی درست می‌کنند. حال ثابت می‌کنیم که (b) موجب (c) می‌شود. اگر $\angle SA_1O = \angle SA_2O = \dots = \angle SA_nO = \psi$ فرض شود آنگاه $|OA_1| = |OA_2| = \dots = |OA_n| = H \cot \psi$ خواهد بود. این امر بدین معنی است که دایره‌ای به

مرکز O و شعاع $R = H \cot \varphi$ بر قاعده هرم محیط می‌شود. سرانجام ثابت می‌کنیم که (c) موجب (a) می‌شود. اگر O را مرکز دایره محیطی قاعده فرض کنیم آنگاه $|OA_1| = |OA_2| = \dots = |OA_n| = R$ شعاع دایره خواهد بود. بدلیل اینکه SO ارتفاع هرم است، چنین داریم:

$$|SA_1| = |SA_2| = \dots = |SA_n| = \sqrt{R^2 + H^2}$$

یعنی یال‌های جانبی دارای طول‌های مساوی هستند. بدین ترتیب ثابت کردیم که از (a) به (b)، از (b) به (c) و از (c) به (a) می‌توان وصول یافت. از اینرو نتیجه می‌شود که این سه حکم هم‌ارز هستند.




شکل ۲۳۲

۵۷۴ • صفحه‌ای که از میانگاه یک پاره خط می‌گذرد و بر آن عمود است عبارت از مجموعه همه نقاط هم‌فاصله از دو سر پاره خط است. فرض کنید که O مرکز دایره محیطی وجه چهارضلعی (شکل ۲۳۳) و l پاره خط مار‌برنقطه O و عمود بر صفحه ABC باشد. هر نقطه پاره خط l از نقاط A, B و C هم‌فاصله است.

در حقیقت $|OA| = |OB| = |OC|$ را داریم و اگر $S \in l, S \neq O$ باشد آنگاه از مثلث‌های قائم‌الزاویه SOA, SOB, SOC درمی‌یابیم که $|SA| = |SB| = |SC|$ است. فرض کنید که صفحه α از میانگاه یال AD عبور کرده و بر آن عمود باشد. ثابت می‌کنیم که α و l متقاطع هستند. رابطه $l \parallel \alpha$ را در نظر می‌گیریم. از $\alpha \perp (AD)$ و $l \parallel \alpha$ نتیجه می‌شود که $(AD) \perp l$ است. همچنین بدلیل $l \perp (AB)$ رابطه $l \perp (ABD)$ را داریم. بدین ترتیب استنباط شد که دو صفحه متمایز ABC و ABD مار از نقطه A بر خط l عمود هستند. ولی این امر غیرممکن بود و در نتیجه گزاره $l \parallel \alpha$ نادرست خواهد بود؛ یعنی $l \cap \alpha$ خواهد بود.

اگر $S = l \cap \alpha$ فرض شود آنگاه $|SD| = |SA|$ خواهد بود. زیرا $S \in l$ و $S \in \alpha$ و $|SB| = |SC| = |SA|$ است.

این امر بدین معنی است که نقطه S از همه نقاط A, B, C و D بیک فاصله بوده و از اینرو به هر صفحه عمود بر یال چهاروجهی در میانگاه آن متعلق خواهد بود.



شکل ۲۳۳

۵۷۵ • در صفحه ASC از M ، میانگاه یال SC که در صفحه برش قرار دارد عمودی بر آن یال رسم می‌کنیم. نقطه تلاقی این عمود و AC را با K نشان داده و $|KC|$ را پیدا می‌کنیم. از مثلث SOC (شکل ۲۳۴) a و b به $\cos \psi = |OC|/|CS| = a/\sqrt{2}l$ وصول می‌یابیم.

در نتیجه $\cos \psi = 1/\sqrt{3}$ (a) و $\cos \psi = 1/\sqrt{5}$ (b) خواهد بود. حال از مثلث KMC به

$$(a) |KC| = |MC|/\cos \psi = \frac{3}{4} a \sqrt{2} = \frac{3}{4} |AC|$$

$$(b) |KC| = \frac{5}{4} a \sqrt{2} = \frac{5}{4} |AC|$$

می‌رسیم. از نقطه K برش را رسم می‌کنیم. صفحه α برش و خط BD بر یال SC عمود بوده و از اینرو موازی خواهند بود. این امر بدین معنی است که فصل مشترک صفحات α و $ABCD$ نیز با (BD) موازی است. خطی بصورت $(EF) \parallel (BD)$ رسم می‌کنیم. سپس (EM) و (FM) را ترسیم می‌کنیم. در نتیجه برش‌های مطلوب بدست می‌آید: (a) پنج ضلعی $MNPQR$ و (b) چهارضلعی $MNPO$.

حال مساحت سطح این برش‌ها را محاسبه می‌کنیم:
(a) چنین داریم:

$$|MK| = |MC| \cdot \tan \psi = \frac{\sqrt{3}}{2} a, \quad |EF| = 2 |KC| = \frac{3}{\sqrt{2}} a,$$

$$S_{EFM} = |EF| \cdot |MK| = \frac{3\sqrt{6}}{8} a^2$$

به آسانی دریافت می‌شود که $|CE| = \frac{3}{2} |BC|$ و $|BE| = \frac{1}{3} |CE|$ است.

از اینرو $|EP| = \frac{1}{3} |EF|$ را داریم. خطی بصورت $|SB| \parallel |MM_1|$ رسم کرده و آنگاه $|EB| = |BM_1|$ را خواهیم داشت. این رابطه به معنی $|EN| = \frac{1}{2} |EM|$ است.

از $|EP| = \frac{1}{3} |EF|$ و $|EN| = \frac{1}{2} |EM|$ در می‌یابیم که $S_{EPN} = \frac{1}{6} S_{EFM}$ است.

از تقارن اشکال حول صفحه SAC استنتاج می‌شود که $S_{FQR} = S_{EPN} = \frac{1}{6} S_{EFM}$ است. در نتیجه

$$\text{مساحت سطح برش برابر } S_{EFM} - S_{EPN} - S_{FQR} = \frac{2}{3} S_{EFM} = \frac{\sqrt{6}}{4} a^2 \text{ خواهد بود.}$$

(b) بطریق مشابه چنین حاصل می‌شود:

داریم $\triangle PSM$ در $S_{EFM} = \frac{5\sqrt{5}}{4} a^2$ ، $|EF| = \frac{5}{\sqrt{2}} a$ ، $|KM| = \sqrt{\frac{5}{2}} a$

$\angle PSM = \pi - 2\varphi$ ، $\tan PSM = -\tan 2\varphi = 4/3$ ، $|PM| = |MS| \cdot \tan PSM = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{5}{2}} a$

از اینرو $|PM| = \frac{2}{3} |KM|$ حاصل می شود. خطی بصورت $|MM_1| \parallel |SB|$ رسم می کنیم.



آنگاه داریم: $|BM_1| = \frac{1}{2} |BC|$ ، $|EM_1| = 2 |BC|$ ، $|EC| = \frac{5}{2} |BC|$

در نتیجه $|MN|/|ME| = |M_1B|/|M_1E| = 1/4$ حاصل می شود.

از $|MN| = \frac{1}{4} |ME|$ ، $|MP| = \frac{2}{3} |MK|$ استنتاج می شود که $S_{MEK} = \frac{1}{6} S_{MNP}$ یعنی

$$S_{MNPQ} = \frac{1}{6} S_{MEF} = \frac{5\sqrt{5}}{24} a^2$$

است. پس جواب مسئله عبارت از $\frac{5\sqrt{5}}{24} a^2$ (b)، $\frac{\sqrt{6}}{4} a^2$ (a) خواهد بود.




شکل ۲۳۴

۵۷۶ قطر A_1C_1 مکعب بر صفحه BDC_1 عمود است (شکل ۲۳۵). بنابراین صفحه برش موازی خط A_1C_1 خواهد بود. بر اساس این حقیقت برش را به صورت زیر رسم می کنیم: در صفحه A_1DCB_1 از محل تلاقی آن با قطر AD_1 یعنی نقطه O خط مستقیمی به موازات A_1C_1 رسم می کنیم تا یال CD را در نقطه K قطع کند. در نتیجه برش بصورت مثلث AD_1K حاصل می شود.

بدلیل $|DO| = |OA_1|$ به $|DK| = |KC|$ وصول می یابیم. طول یال مکعب را با a نشان می دهیم. حجم هرم D_1ADK برابر $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot |AD| \cdot |DK| \times |DD_1| = \frac{1}{12} a^3$ است. از اینرو نتیجه می شود که نسبت قسمت های حاصله از مکعب در اثر تقسیم برش عبارت از $1/11$ است.

پس جواب مسئله عبارت از $1/11$ خواهد بود.




شکل ۲۳۵

۵۷۷ • عبارت $|SB| = a$ را در نظر می‌گیریم (شکل ۲۳۶). آنگاه h طول عمود مرسوم از نقطه B بر صفحه SCD یعنی فاصله آن نقطه را از صفحه SCD بدست می‌آوریم. بدلیل $(SCD) \parallel (AB)$ فاصله M ، میانگانه یال AB از صفحه SCD نیز برابر h است. فرض کنیم که N میانگانه یال CD باشد. آنگاه $(SCD) \perp (SMN)$ بوده و اگر $(SN) \perp [MP]$ باشد آنگاه $(SCD) \perp [MP]$ خواهد بود. از اینرو $|MP| = h$ را داریم. حال $|MP|$ را به عنوان ارتفاع مثلث SMN بدست می‌آوریم. بدلیل $SBO = \pi/4$ رابطه $|SO| = |OB| = a/\sqrt{2}$ را داریم. این امر بدین معنی است که:

$$|MO| = a/2, \quad |MN| = a, \quad |SN| = \sqrt{|SO|^2 + |ON|^2} = a\sqrt{3}/2$$

حال می‌توان $h = |MP| = |SO| \cdot |MN| / |SN| = \sqrt{2/3}a$ را بدست آورد.

از اینرو نتیجه می‌شود اگر α زاویه بین (SB) و (SCD) باشد آنگاه $\alpha = h/a = \sqrt{2/3}$ خواهد بود. پس جواب مسئله بصورت $\arcsin \sqrt{2/3}$ درمی‌آید.



شکل ۲۳۶

۵۷۸ • اگر $M_0 \in \alpha$ باشد آنگاه $\rho = 0$ و $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$ بوده و این به معنی درستی فرمول در حالت اخیر است. فرض کنید که $M_0 \notin \alpha$ بوده و $M_1(x_1; y_1; z_1)$ پای عمود مرسوم از M_0 بر α باشد. عبارات $r_1 = \vec{OM}_1 = (x_1; y_1; z_1)$ ، $r_0 = \vec{OM}_0 = (x_0; y_0; z_0)$ که در آن O مبدأ است. معادله $ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0$ را می‌توان به شکل $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_1 + d = 0$ باز نوشت که در آن $\mathbf{n} = (a; b; c)$ بردار عمود بر صفحه است.

بردارهای $\vec{M}_0\vec{M}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0$ و \mathbf{n} همخط بوده و بنابراین $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0 = \lambda \mathbf{n}$ را داریم.

از اینرو حاصل می‌شود. آنگاه $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_0 + \lambda \mathbf{n}$ بوده و در نتیجه $\lambda = -\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0 + d}{|\mathbf{n}|^2}$ بدست می‌آید. حال داریم:

$$\rho = |\vec{M}_0\vec{M}_1| = |\lambda| \cdot |\mathbf{n}| = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0 + d|}{|\mathbf{n}|} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

۵۷۹ • اگر M مرکز قاعده ABC باشد (شکل ۲۳۷) آنگاه

$$\vec{OM} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) = (4; -1; 0)$$

خواهد بود. نقطه S دارای مختصات $(0, y, z)$ بوده و از اینرو

$$\vec{MS} = \vec{OS} - \vec{OM} = (-4; y + 1; z)$$

را داریم. چنین بدست می‌آید: $\vec{AB} = (0; -3; 3)$ و $\vec{AC} = (-3; -3; 0)$
 بدلیل $(MS) \perp (ABC)$ روابط $\vec{MS} \cdot \vec{AB} = 0$ و $\vec{MS} \cdot \vec{AC} = 0$ را داریم.

از این تساوی معادلات $0 = 0$ و $12 - 3(y + 1) = 0$ بدست می‌آید که جوابهای
 آنها عبارت از $y = 3$ و $z = 4$ است. فرض کنید که P میانگاه یال AC و PQ عمود بر (SB) در
 صفحه SBP باشد. بدلیل $(AC) \perp (PQ)$ ، $(AC) \perp (SBP)$ را داریم که به معنی این است که عمود


مشترک پاره خط‌های AC و SB بوده، و $|PQ|$ فاصله بین این خطوط است. چنین داریم:

$$\vec{OP} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OC}) = (7/2; -1/2; -1), \quad \vec{BP} = \vec{OP} - \vec{OB} = (-3/2; 3/2; -3),$$

$$\vec{BS} = \vec{OS} - \vec{OB} = (-5; 5; 2), \quad \vec{MS} = (-4; 4; 4), \quad |BP| = \sqrt{27/2},$$

از اینرو چنین استنتاج می‌شود:

$$|BS| = \sqrt{54}, \quad |MS| = \sqrt{48}, \quad |PQ| = |BP| \cdot |MS| / |BS| = 2\sqrt{3}$$



شکل ۲۳۷

۵۸۰ • فرض کنید l یال فرجه نشان داده شده در شکل ۲۳۸ باشد. صفحاتی بصورت $l \perp (APM)$ و
 $l \perp (BQN)$ رسم کرده و آنگاه چنین داریم: $\angle APM = \angle BQN = \pi/3$. همچنین عمودهای AA_1 و
 BB_1 را بر وجوه γ_1 و γ_2 فرجه وارد می‌کنیم. اندازه فرجه حاده بوده و نقاط A_1 و B_1 روی اضلاع PM
 QN از رویای مسطحه قرار دارند. طبق فرض $\angle BAB_1 = \pi/6$ ، $\angle ABA_1 = \arcsin 0.7$ را داریم. اگر
 $l \parallel (AC)$ باشد آنگاه $(AC) \perp (BQN)$ بوده و از اینرو $\angle BCA = \pi/2$ خواهد بود، زاویه BAC حاده
 بوده و برابر زاویه بین (AB) و l است. عبارت $AB = a$ را در نظر می‌گیریم. درمی‌یابیم که:


$$|BB_1| = a \cdot \sin BAB_1 = a/2, \quad |QB_1| = |BB_1| \times \cot |BQB_1| = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

$$|AA_1| = a \cdot \sin ABA_1 = 0.7a, \quad |PA| = |AA_1| / \sin APA_1 = 7a/5\sqrt{3}$$

بدلیل $|QC| = |PA|$ داریم: $|B_1C| = |PA| - |QB_1| = 9a/10\sqrt{3}$.


$$|AB_1| = a \cdot \cos(\pi/6) = a\sqrt{3}/2, \quad |AC| = \sqrt{|AB_1|^2 - |B_1C|^2} = \frac{2\sqrt{3}}{5}a$$

در نتیجه $\cos BAC = |AC|/|AB| = 2\sqrt{3}/5$ خواهد بود.
 پس جواب مسئله عبارت از $\arccos(2\sqrt{3}/5)$ خواهد بود.



شکل ۲۳۸

۵۸۱ • برش $ABMN$ را رسم می‌کنیم (در شکل ۲۳۹، $[MN] \parallel [AB] \parallel [CD]$ را داریم).
 حجم هرم $SABCD$ را با V_1 و حجم هرم $SABMN$ را با V_2 نشان می‌دهیم. حجم V_1 برابر مجموع V_2 و V_3 مربوط به هرم‌های $SBMN$ و $SBAN$ است. حجم‌های $SBMN$ و $SBAN$ را مقایسه می‌کنیم. وجه SMN و SCD را به عنوان قاعده این هرم‌ها و نقطه B را به عنوان رأس مشترک در نظر می‌گیریم. بدلیل $|SM| = \frac{1}{2}|SC|$ ، $S_{SMN} = \frac{1}{4}S_{SCD}$ را داریم که به معنی $V_2 = \frac{1}{4}V_{SCD}$ است. بدیهی است که $V_{SCD} = \frac{1}{2}V$ بوده و در نتیجه $V_2 = \frac{1}{8}V$ را خواهیم داشت.
 هرم‌های $SBAN$ و $SBAD$ را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. وجه SAN و SAD را به عنوان قاعده آنها و نقطه B را به عنوان رأس مشترک در نظر می‌گیریم. بدلیل اینکه N میانگانه یال SD است از اینرو $S_{SAN} = \frac{1}{2}S_{SAD}$ را داریم که به معنی $V_3 = \frac{1}{2}V_{SBAD} = \frac{1}{4}V$ است.
 حال می‌توانیم حجم $V_1 = V_2 + V_3 = \frac{3}{8}V$ را بدست آوریم، حجم قطعه جدا شده از هرم $\frac{5}{8}V$ بوده و نسبت حجم‌ها نیز برابر $3/5$ است.



شکل ۲۳۹

۵۸۲ • بدیهی است که چهار وجهی و متوازی‌السطوح در رأس D مشترک هستند (شکل ۲۴۰).
 یال‌های متوازی‌السطوح که از این رأس منشعب می‌شوند روی یال‌های چهار وجهی قرار دارند. وجه

ABC چهار وجهی فقط می‌تواند محتوی رأسی از متوازی السطوح باشد که روی وجه دارای رأس D قرار ندارند. برای این شرط مسئله فقط یک رأس متوازی السطوح یعنی رأس F_1 وجود دارد. برش‌هایی از چهار وجهی را که بوسیله صفحات DD_1F_1F و $D_1E_1F_1G_1$ ایجاد شده‌اند مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. عبارات $|CF_1|/|CK| = y$ ، $|MF_1|/|MN| = x$ را در نظر می‌گیریم.

ارتفاع چهار وجهی مرسوم از رأس C را با H و ارتفاع متوازی السطوح که بر قاعده $DEFG$ وارد شده است را با h نشان می‌دهیم. ارتفاع چهار وجهی CD_1MN مرسوم از رأس C برابر $H - h$ است.

این چهار وجهی با مرکز C و نسبت y متجانس چهار وجهی $CDAB$ است. بنابراین داریم:

$$S_{D_1MN} = y^2 \cdot S_{DAB}, \quad H - h = yH$$

یعنی: $h = (1 - y)H$. مثلث‌های ME_1F_1 و MD_1N با نسبت x متشابه بوده و از اینرو

$$S_{ME_1F_1} = x^2 \cdot S_{MD_1N}$$

را داریم. مثلث‌های NG_1F_1 و ND_1M با نسبت $1 - x$ متشابه بوده و از اینرو

$$S_{NG_1F_1} = (1 - x)^2 S_{ND_1M}$$

است. بنابراین نتیجه می‌شود که:

$$S_{D_1E_1F_1G_1} = S_{D_1MN} - S_{ME_1F_1} - S_{NG_1F_1} = 2x(1 - x) S_{D_1MN} = 2x(1 - x) \times y^2 S_{DAB}$$

حجم متوازی السطوح بصورت زیر درمی‌آید:

$$V_D = S_{D_1E_1F_1G_1} \cdot h = 2x(1 - x)y^2(1 - y) S_{DAB} \cdot H$$

بدلیل $0 < y < 1$ ، $0 < x < 1$ که در آن $V_D = 6x(1 - x)y^2(1 - y) V$ ، $S_{DAB} \times H = 3V$

است. تابع $(1 - x)$ به ازاء $x = 1/2$ بزرگترین مقدار است و مقدار آن برابر $1/4$ می‌باشد. به

آسانی دریافت می‌شود که تابع $y^2(1 - y)$ بزرگترین مقدار خود در بازه $(0, 1)$ را به ازاء $y = 2/3$

اختیار کرده و این مقدار برابر $4/27$ است. این امر بدین معنی است که به ازاء $0 < y < 1$ ، $0 < x < 1$

$$\text{داریم: } x(1 - x)y^2(1 - y) \leq (1/4) \cdot (4/27) = 1/27$$

علامت تساوی وقتی اعمال می‌شود که $x = 1/2$ و $y = 2/3$

باشد.


بدین ترتیب بزرگترین مقدار برای حجم متوازی السطوح

برابر $6 \cdot \frac{1}{27} V = \frac{2}{9} V$ خواهد بود. متوازی السطوحی که

رأس F_1 آن بر نقطه تلاقی میانه‌های وجه ABC منطبق

است دارای بیشترین حجم ممکنه بوده و در نتیجه

جواب مسئله عبارت از $\frac{2}{9} V$ خواهد بود.



شکل ۲۴۰