

توانا پوهنتون سرک دانا پور  
وزارت آموزش و پرورش

# جبر و آنالیز

سال چهارم

آموزش متوسطه عمومی

ریاضی و فیزیک

۲۹۰

طهرت‌شاه درین کتاب  
توانا بود هر که دانا بود  
وزارت آموزش و پرورش

# جبر و آنالیز

سال چهارم

آموزش متوسطه عمومی

ریاضی و فیزیک

۲۵۳۷ شاه‌شاهی

حقوق مادی این اثر متعلق به وزارت  
آموزش و پرورش است

پدیدآورندگان

مؤلفان ◀ ● غلامرضا عسجدی ● جلیل‌الله قراگزلو ● هدایت‌الله موسوی

این کتاب در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی بوسیله وزارت  
آموزش و پرورش مورد تجدید نظر قرار گرفته است .

صفحه پرداز ◀ فاطمه سقانزاد تهرانی

چاپ از ◀ چاپخانه پیروز

به نام خدا

## فهرست

۱	مقدمه
۲	فصل ۱ - یادآوری و تکمیل
۷۹	فصل ۲ - بررسی تغییرات توابع
۱۴۷	فصل ۳ - دیفرانسیل و انتگرال

## مقدمه

اگر به پیشرفت انسان در زمینه‌های علوم و فنون توجه شود ملاحظه خواهد شد که از اواخر قرن هفدهم میلادی به اینطرف این پیشرفت چشمگیر و انقلابی بوده است. در حال حاضر نیز گسترش تکنیک و صنعت، شگفت‌انگیز و حتی رعب‌آسا می‌باشد. دست‌اندازی انسان به کرات آسمانی نشانه گسترش همه جانبه صنعت است.

عامل اساسی و ریشه باطنی این پیشرفت تحول در ریاضیات و کاربرد آن‌ها در اکثر علوم و فنون از جمله فیزیک، نجوم، مهندسی، شیمی، اقتصاد، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی و حتی این اواخر برخی از شاخه‌های علوم اجتماعی بوده است. این تحول با پیدایش مفاهیم مشتق و انتگرال در اواخر قرن هفدهم میلادی آغاز شد و افتخار پیدایش آن را باید از آن اسحق نیوتن و گاتفرید لاینز دانست. این مفاهیم را کد نما نندند و مرتب در حال توسعه و تعمیم بودند. در قرن نوزدهم دوتن از ریاضی-دانان بزرگ به نام‌های آگوستین کشی و برنارد ریمان مفهوم انتگرال را به طور دقیق در قالب ریاضیات بیان کردند و این مفهوم بعداً در اوایل قرن بیستم توسط ریاضی‌دان نامی هنری لیگک توسعه یافت.

در کتاب حساب و جبر سال سوم با مفاهیم حد و پیوستگی و مشتق آشنا شده‌اید در این کتاب ابتدا این مطالب را بررسی کرده و در جهت تکمیل آن مطالبی اضافه می‌کنیم، سپس به بررسی تغییرات و رسم نمودار برخی از توابع و مسائل وابسته به آنها خواهیم پرداخت. سرانجام با مطالعه مختصری در مورد دبرانسیل، تابع اولیه، و مفهوم ابتدائی انتگرال و کاربرد آنها کتاب را به پایان می‌رسانیم.

زنا

## یادآوری و تکمیل

بیشتر مطالب این فصل همان مطالبی است که در کتاب حساب و جبر سال سوم با آنها آشنا شده‌اید. چون این مطالب اهمیت زیادی دارند آنها را یادآوری نموده و در جهت تکمیل آنها مطالبی اضافه می‌نمایم.

۱-۱- تعریف تابع - فرض کنید  $A$  و  $B$  دو مجموعه باشند.  $f$  زیر مجموعه‌ای از حاصلضرب

دکارتی  $A \times B$  (یعنی یک رابطه از  $A$  به  $B$ ) را یک تابع از  $A$  به  $B$  گویند هرگاه  $(a, b) \in f$  و  $(a, b') \in f$ ، آنگاه  $b = b'$ . به عبارت دیگر  $f$  مجموعه‌ایست از جفت‌های مرتب در  $A \times B$  به قسمی که هیچ دو عضو متفاوت  $f$  دارای مؤلفه‌های اول مساوی نباشند. مجموعه مؤلفه‌های اول اعضای تابع  $f$  را دامنه (دامنه تعریف)  $f$  و مجموعه مؤلفه‌های دوم اعضای  $f$  را برد  $f$  می‌خوانند و آنها را به ترتیب با  $D_f$  و  $R_f$  نشان می‌دهند. وقتی  $(x, y) \in f$  باشد  $y$  را

مقدار تابع  $f$  در  $x$  می‌خوانند و معمولاً آن را به صورت  $y = f(x)$  می‌نویسند. در این مقام مؤلفه اول، یعنی  $x$ ، را متغیر مستقل و مؤلفه دوم، یعنی  $y$ ، را متغیر تابع می‌خوانند، توجه کنید که تابع  $f$ ، که مجموعه‌ای از زوج‌های مرتب است، با مقدار آن در  $x$ ، یعنی  $f(x)$ ، فرق دارد.


هرگاه  $f$  تابعی از  $A$  به  $B$  باشد، مؤلفه دوم هر زوج مرتب در  $f$  بطور یگانه‌ای از روی مؤلفه اول آن زوج مرتب مشخص می‌شود و بدین ترتیب از روی  $f$  قانون یا دستوری بدست می‌آید که به کمک آن می‌توان به هر عضو  $x$  از  $D_f$  یک و تنها یک عضو  $y$  متعلق به  $R_f$  متناظر ساخت به قسمی که  $(x, y) \in f$ . به عکس هرگاه دستور یا قانونی داشته باشیم که به هر عضو  $x$  از یک زیر مجموعه  $A$  یک و تنها یک عضو  $y \in B$  را نسبت دهد، مجموعه همه زوج‌های مرتب  $(x, y)$

که به این ترتیب حاصل می‌شود تابعی از  $A$  به  $B$  خواهد بود. از این روی معمولاً برای مشخص کردن تابع دامنه آن و قانون یا دستور را می‌دهند، و اگر دامنه داده نشود باید آن را بزرگترین زیر مجموعه‌ای از مجموعه جهانی (مورد بحث) اختیار کرد که آن قانون برای آن زیر مجموعه بامعنی است. وقتی  $f$  تابعی است از  $A$  به  $B$  معمولاً می‌نویسند  $f: A \rightarrow B$  و در صورتیکه  $A$  و  $B$  و قانون تابع مشخص باشند به نوشتن  $f: x \rightarrow f(x)$  یا  $y = f(x)$  اکتفا می‌کنند.

هرگاه دامنه و برد تابعی زیر مجموعه‌هایی از  $R$ ، یعنی مجموعه اعداد حقیقی، باشد آنگاه

آن تابع را یک تابع عددی یا حقیقی می‌نامند. در این کتاب اغلب سروکارمان با توابع حقیقی است.

مثال ۱ - فرض کنید  $A = \{5, \sqrt{2}, \pi, e, \nu\}$  و  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ . شکل زیر تابع  $f$  از  $A$  به  $B$  را مشخص می کند.



دامنه و برد  $f$  و دستور  $y = f(x)$  را مشخص کنید، مجموعه  $f$  را بنویسید.  
 حل - با ملاحظه شکل معلوم می شود که دامنه و برد  $f$  چنین است.

$$D_f = \{\sqrt{2}, \pi, e\}$$

$$R_f = \{1, 2\}$$

دستور  $y = f(x)$  آنرا مشخص کنید

$x$	$5$	$\sqrt{2}$	$\pi$	$e$	$\nu$
$f(x) = y$		1	2	2	

مجموعه  $f$  چنین است:

$$f = \{( \sqrt{2}, 1 ) \text{ و } ( \pi, 2 ) \text{ و } ( e, 2 )\}$$

مثال ۲ - معین کنید رابطه زیر تابع است یا خیر:

$$E = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 - 1 = 0 \}$$

جواب - بدیهی است که این رابطه تابع نیست زیرا مثلا به ازای  $x = 0$  دو مقدار  $y$

۱ - برای  $y$  بدست می آید.

مثال ۳ - دامنه تعریف تابع زیر را مشخص کنید:

$$F = \{ (x, y) \mid y = \sqrt{x-1} \}$$

جواب - دامنه تعریف آن چنین است:

$$D_f = \{ x \mid x > 1 \}$$

مثال ۴ - دامنه تعریف تابع  $f$  را که به وسیله  $x \mapsto \frac{x}{x-2}$  مشخص شده است تعیین

کنید.

$$D_f = \mathbb{R} - \{2\}$$

جواب- دامنه تعريف تابع چنين است

در اين كتاب معمولاً " بجای " تابع  $f$  با ضابطه  $y = f(x)$  عبارت " تابع  $y = f(x)$  " بكار رفته است .

تمرین:

۱- آیا مجموعه زیر تابعی را نمایش می‌دهد یا خیر:

$$f = \{(1, 2) \text{ و } (3, 5) \text{ و } (4, 2) \text{ و } (1, 5)\}$$

۲- در رابطه زیر اصلاحی بکنید تا تابعی را نمایش بدهد

$$f: x \mapsto y = \pm \sqrt{x}$$

۳- نمودار تابع زیر را رسم کنید

$$f: x \mapsto \frac{\bar{x}}{|x|}$$

۴- نمودار تابع زیر را رسم کنید

$$f: x \mapsto |x^2 - 2x + 2|$$

۵- نمودار تابع زیر را رسم کنید

$$f: x \mapsto \frac{x-1}{x+1}$$

۶- کدام يك از دستوره‌های زیر يك تابع را مشخص می‌کنند.

$$y = \sin x, y = \arctan x \quad (x^2 - y^2)$$

۷- مجموعه زیر داده شده است با تغییر يك عدد آنرا تابع کنید

$$\{(1, 2) \text{ و } (2, 3) \text{ و } (3, 4) \text{ و } (2, 4)\}$$

۸- تابع  $f$  به شکل زیر داده شده است

$$f = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{N} \text{ و } x < 6 \text{ و } y = x^2\}$$

$\mathbb{N}$  مجموعه اعداد طبیعی است. تابع  $f$  را به شکل زوجهای مرتب بنویسید (نمایش تفصیلی)

۹- دامنه تعريف تابع  $x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}$  را بنویسید

۱۰- دامنه تعريف تابع  $x \mapsto \frac{x}{x} + 1$  را بنویسید

۱۱- دامنه تعريف تابع  $f = \{(a, 1) \text{ و } (b, 2) \text{ و } (c, 3)\}$  را بنویسید

۱۲- رابطه  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  دستورهائی برای دو تابع بدست می‌دهد، آنها را از هم جدا

کنید و دامنه تعريف هر يك را بنویسید.


۱۳- تابعی بنویسید که شامل يك یا دو یا سه زوج مرتب باشد



۱۴- تابعی به شکل  $f = \{(1,2) \text{ و } (2,3) \text{ و } (3,4) \text{ و } (4,5)\}$  داده شده است. ضابطه  $y = f(x)$  آنرا مشخص کنید

۱۵- تابعی به شکل  $f = \{(1,2) \text{ و } (2,3) \text{ و } (3,4) \text{ و } (4,1)\}$  داده شده است. قانون  $y = f(x)$  آنرا معلوم کنید

۱۶- اشکال زیر نمودار روابطی هستند. مشخص کنید کدامیک از آنها تابع است و کدامیک تابع نیست.



۱۷- هر خط موازی با محور  $Oy$  نمودار يك تابع را حداكثر در چند نقطه قطع می کند؟  
( $x$  متغیر مستقل است)

۱۸- هر خط موازی با محور  $Ox$  نمودار يك تابع را حداكثر در چند نقطه قطع می کند؟  
( $y$  متغیر مستقل است)

۱۹- هر خط موازی با محور  $Oy$  نمودار يك تابع را در چند نقطه قطع می کند؟ ( $y$  متغیر مستقل است)

۲۰- هر خط موازی با محور  $Ox$  نمودار يك تابع را در چند نقطه قطع می کند؟ ( $x$  متغیر مستقل است)

دامنه تعریف هر يك از توابع زیر را مشخص کنید:

$$f: x \mapsto x^2 + 5x + 1 \quad -21$$

$$\text{بحث } f: x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d} \quad -22$$

$$f: x \mapsto \frac{x^2+1}{x^2-2} \quad -23$$

$$f: x \mapsto \sqrt{x^2-1} \quad -24$$

$$\text{بحث } f: x \mapsto \sqrt{ax^2+bx+c} \quad -25$$

$$\text{بحث } f: x \mapsto \frac{ax^2+bx+c}{a'x^2+b'x+c'} \quad -26$$

$$f: x \mapsto \frac{x}{x-1} + \sqrt{x^2 - 16} \quad -27$$

آیا معادلات دو متغیره زیر که در آنها  $x$  متغیر مستقل است تابعی تعریف می کنند یا خیر:

$$xy + 5 = 0 \quad -28$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad -29$$

$$x^2y + x^2y - 2y + 3x = 0 \quad -30$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0 \quad -31$$

$$y^2 - 2x = 0 \quad -32$$

$$x^2 + 2y = 0 \quad -33$$

$$ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0 \quad -34$$

حد

۳-۱- مقدمه - برای تعریف حد تابع در حالت کلی به سه تعریف زیر نیاز داریم:

الف - می گوئیم متغیر  $x$  به سمت  $x_0$  میل می کند و می نویسیم  $x \rightarrow x_0$  ، در صورتیکه فاصله نقطه  $x$  تا نقطه  $x_0$  یعنی  $|x - x_0|$  مثبت بوده و از هر عدد مثبت کوچک  $\alpha$  (هر اندازه کوچک که بخواهیم) کوچکتر شود.

اگر تفاضل  $x - x_0$  را که می تواند مثبت یا منفی باشد  $\varepsilon$  بنامیم خواهیم داشت:

$$x - x_0 = \varepsilon \Rightarrow x = x_0 + \varepsilon$$


روی محور  $x$  نقطه  $A$  را به طول ثابت  $x_0$  و نقطه  $M$  را به طول متغیر  $x$  انتخاب

می کنیم. اگر  $\varepsilon > 0$  باشد  $x > x_0$  و نقطه  $M$  از سمت راست به نقطه  $A$  میل می کند و اگر  $\varepsilon < 0$

باشد نقطه  $M$  از طرف چپ به نقطه  $A$  میل می کند. حالت  $\varepsilon = 0$  پیش نخواهد آمد، زیرا که

$x - x_0$  مخالف صفر فرض شده است. توجه داریم که نقطه  $M$  نمی تواند به نقطه  $A$  برسد بلکه

هر اندازه که بخواهیم می تواند به آن نزدیک شود. این مطلب را در شکل زیر نشان داده ایم.



ب - اگر مقادیر متغیر  $x$  از هر عدد مثبت بزرگی بزرگتر شود، می گوئیم  $x$  به سمت باضافه

بینهایت میل می کند و این مطلب را به اختصار چنین نشان می دهیم  $x \rightarrow +\infty$ .

توجه کنید که  $+\infty$  یک عدد نیست و  $x \rightarrow +\infty$  فقط یک نماد برای نشان دادن مفهوم

فوق است.

ج- اگر مقدار متغیر  $x$  از هر عدد منفی کوچکی کوچکتر شود، می گوئیم  $x$  به سمت منهای  
 ینهایت میل می کند و می نویسیم  $x \rightarrow -\infty$ .  
 توجه کنید که روی محور اعداد حقیقی جایی بنام  $-\infty$  نداریم و  $x \rightarrow -\infty$  فقط نمادی  
 برای نشان دادن مفهوم بالا است.

۳-۱- حد تابع - اکنون تابع  $f$  و فاصله  $I$  و نقطه  $x_0$  از این فاصله را در نظر می گیریم  
 و فرض می کنیم که  $f$  در  $I$  (مگر محتملا در  $x_0$ ) تعریف شده است. می گوئیم: حد تابع  $f$  وقتی که  
 $x$  به سمت  $x_0$  میل کند عدد (حقیقی)  $L$  است و می نویسیم:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

هر گاه به ازای هر عدد مثبت  $\beta$  عدد مثبتی مانند  $\alpha$  (معمولا به  $\beta$  بستگی دارد) وجود داشته  
 باشد به قسمی که داشته باشیم:

$$(I) \quad 0 < |x - x_0| < \alpha \text{ و } x \in D_f \Rightarrow |f(x) - L| < \beta$$

در تعریف فوق  $\beta$  و  $\alpha$  دو عدد مثبت اند که هر اندازه بخواهیم می توانیم آنها را کوچک  
 اختیار کنیم. ابتدا باید  $\beta$  را اختیار کنیم و سپس ثابت کنیم که لاقلا يك  $\alpha$  که معمولا به  $\beta$  بستگی  
 دارد پیدا می شود که استلزام بالا صحیح باشد.

$D_f$  دامنه تعریف تابع است و بدیهی است که  $x$  باید متعلق به دامنه باشد تا  $f(x)$  تعریف  
 شده باشد. از این روی گاهی اوقات در استلزام فوق از نوشتن شرط  $x \in D_f$  خودداری می کنیم  
 ولی استنباط چنین خواهد بود که همواره  $x$  به  $D_f$  متعلق است. علاوه بر این همانطور که در تعریف  
 $x \rightarrow x_0$  دیدیم  $x$  نباید برابر  $x_0$  اختیار شود.

معمولا برای مختصر و ساده نویسی، تعریف  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  حد را به صورت

نمادی زیر می نویسند. (نماد « $\exists$ » خوانده می شود: به قسمی که یا به طوریکه).

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists \quad 0 < |x - x_0| < \alpha \text{ و } x \in D_f \Rightarrow |f(x) - L| < \beta$$

۴-۱- نکات قابل توجه در حد - اگر تابع  $f$  وقتی  $x$  به سمت  $x_0$  میل کند حد داشته  
 باشد، نکات زیر را باید در نظر داشت:

الف - اگر  $L$  حد  $f$  باشد،  $L$  عددی است حقیقی و یگانه (یگانگی آن را در اینجا ثابت

نمی کنیم.)

ب- گفتن اینکه  $f(x)$  به سمت  $L$  میل می کند به تنهایی هیچ معنی ندارد، مگر اینکه

بگوئیم  $f(x)$  به سمت  $L$  میل می کند وقتی که  $x$  به سمت  $x_0$  میل کند.

پ - تعریف  $f(x) = L$  حد هم ارز است با اینکه بگوئیم به ازای هر  $\beta > 0$  يك  $\alpha > 0$

وجود دارد بطوریکه اگر  $x \neq x_0$  متعلق به فاصله باز  $[\alpha, x_0 + \alpha]$  و دامنه تعریف  $f$  باشد، آنوقت مقدار  $f$  در این  $x$  به فاصله باز  $[L - \beta, L + \beta]$  متعلق باشد. توجه کنید که حد  $f$  به مقادیر نزدیک به  $x_0$  بستگی دارد نه به خود  $x_0$ . ممکن است  $f(x_0)$  اصلاً تعریف نشده باشد و یا در صورت تعریف شدن با  $L$  مساوی نباشد. مثلاً حد تابع  $f(x) = \frac{x^2}{x}$  وقتی  $x \rightarrow 0$  مساوی با صفر است در صورتیکه  $f(0)$  معنی ندارد.

ت - برای آنکه نشان دهیم  $f(x) = L$  حد باید  $\beta > 0$  را به دلخواه انتخاب کنیم و

يك  $\alpha > 0$  به دست آوریم که در تعریف حد صدق کند. معمولاً منحصر به فرد نیست و اگر  $\alpha$  در تعریف صادق باشد هر عدد  $\alpha$ ،  $0 < \alpha \leq \alpha_0$  نیز در تعریف صدق خواهد کرد.

مثال ۱ - می‌خواهیم با استفاده از تعریف حد ثابت کنیم حد تابع

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{اگر } x \neq -1 \\ 2 & \text{اگر } x = -1 \end{cases}$$

وقتی  $x$  به سمت  $-1$  میل کند برابر  $5 -$  است.

حل - باید ثابت کنیم که به ازای هر  $\beta > 0$  يك  $\alpha > 0$  وجود دارد به قسمی که:

$$0 < |x - (-1)| < \alpha \Rightarrow |f(x) - (-5)| < \beta$$

چون  $|x - (-1)| = |x + 1|$  بدین معنی است که  $x \neq -1$  پس  $f(x) = 2x - 3$  و استلزام فوق به صورت زیر در می‌آید

$$0 < |x + 1| < \alpha \Rightarrow |(2x - 3) - (-5)| < \beta$$

و یا

$$0 < |x + 1| < \alpha \Rightarrow 2|x + 1| < \beta$$

و یا

$$0 < |x + 1| < \alpha \Rightarrow |x + 1| < \frac{\beta}{2}$$

بنابر این کافیت که  $\alpha > 0$  را کوچکتر از  $\frac{\beta}{2}$  یا مساوی آن اختیار کنیم. در حقیقت

$$0 < |x + 1| < \frac{\beta}{2} \Rightarrow 2|x + 1| < \beta \quad \text{و یا} \quad 0 < |x + 1| < \frac{\beta}{2}$$

$2|x + 1| < \beta$  و یا  $|2x - 3 - (-5)| < \beta$  که همان چیزی است که

می خواستیم ثابت کنیم .

توجه کنید که در این مثال  $f(-1) = 2$  در حالیکه  $f(x) = -5$  حد پس بطور  $x \rightarrow -1$

کلی لازم نیست که حد تابع در يك نقطه مساوی مقدار تابع در آن نقطه باشد.

مثال ۲- تابع  $f(x) = ax + b$  را که در آن  $a$  و  $b$  دو عدد حقیقی و ثابت هستند در

نظری می گیریم . با استفاده از تعریف حد ثابت کنید که حد  $f$  وقتی که  $x \rightarrow x_0$  برابر  $f(x_0) = ax_0 + b$  می باشد . یعنی :

$$\text{حد } (ax+b) = ax_0 + b \quad x \rightarrow x_0$$

حل - حالت اول  $a = 0$  . باید ثابت کنیم :

$$\text{حد } (b) = b \quad x \rightarrow x_0$$

بنابه تعریف باید نشان دهیم :

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - b| < \beta$$

یا

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |b - b| < \beta$$

اما  $|b - b| = 0$  و از هر  $\beta > 0$  کوچکتر است پس هر  $\alpha > 0$  در تعریف صدق می کند.

حالت دوم  $a \neq 0$  . بنابه تعریف باید نشان دهیم :

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |(ax+b) - (ax_0+b)| < \beta$$

یا

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |a(x - x_0)| < \beta$$

یا

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |x - x_0| < \frac{\beta}{|a|}$$

بنابراین کفایت  $\alpha$  را مثبت و کوچکتر از  $\frac{\beta}{|a|}$  یا مساوی آن اختیار کنیم تا تعریف برقرار

شود . در حقیقت اگر  $|x - x_0| < \frac{\beta}{|a|}$  آنگاه  $|a||x - x_0| < \beta$

و یا  $|a(x - x_0)| < \beta$  و یا  $|(ax - b) - (ax_0 - b)| < \beta$  که حکم

مورد نظر است .

۱-۵- حد در بینهایت و حدهای بینهایت - تا کتون در مورد  $f(x)=L$  حد که در  $x \rightarrow x_0$

آن نه  $x_0$  و نه  $L$  بینهایت بودند بحث کرده ایم . ولی حالتی وجود دارد که در آنها  $x_0$  یا  $L$  یا هر دو متناً  $+\infty$  یا  $-\infty$  و یا  $\infty$  هستند. اگر تمام حالتی ممکن را در نظر بگیریم مجموعاً شانزده حالت می شود که یکی از آنها همان حالتی است که هم  $x_0$  و هم  $L$  اعداد حقیقی هستند و قبلاً تعریف آن را دیده اید . اکنون یکی از پانزده حالت باقیمانده را طرح و برای آن مثالی می زنیم ، سپس همه شانزده حالت را در جدولی خلاصه می کنیم تا مراجعه به آن آسان باشد .  
تعریف - فرض کنید که تابع  $f$  برای هر  $x > a$  تعریف شده باشد، که در آن  $a$  عددی است حقیقی . گوئیم وقتی  $x$  به سمت  $+\infty$  میل کند حد  $f$  عدد حقیقی  $L$  است و می نویسیم

$$\text{حد } f(x)=L$$

$$x \rightarrow +\infty$$

هر گاه به ازای هر  $\beta > 0$  يك  $M > 0$  وجود داشته باشد به قسمی که :

$$x \in D_f \text{ و } x > M \Rightarrow |f(x) - L| < \beta$$

یا بطور نمادی

$$\forall \beta > 0 \exists M > 0 \ni x > M \text{ و } x \in D_f \Rightarrow |f(x) - L| < \beta$$

مثال - ثابت کنید که :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{2x+2} = \frac{2}{2}$$

حل - باید نشان دهیم که :

$$\forall \beta > 0 \exists M > 0 \ni x > M \Rightarrow \left| \frac{2x+1}{2x+2} - \frac{2}{2} \right| < \beta$$

فرض می کنیم  $M$  با این خاصیت موجود باشد پس نامساوی طرف دوم استلزام فوق برقرار است . اکنون سعی می کنیم به کمک آن  $M$  را حدس بزنیم و سپس حدس خود را امتحان خواهیم کرد . اما نامساوی طرف دوم استلزام فوق را می توان چنین نوشت:

$$\left| \frac{2x+1}{2x+2} - \frac{2}{2} \right| = \left| \frac{-1}{2(2x+2)} \right| = \frac{1}{2|x+2|} < \beta$$

و از آنجا خواهیم داشت:

$$|2x+2| > \frac{1}{2\beta}$$

برای  $x$  در فاصله  $[\infty + 0]$  و  $0$  قدر مطلق  $2x+4$  برابر خود  $2x+4$  بوده و داریم :

$$|2x+4| > \frac{\delta}{\beta} \Rightarrow 2x+4 > \frac{\delta}{\beta} \Rightarrow x > \frac{\delta-4\beta}{2\beta}$$

پس اگر  $\frac{\delta-4\beta}{2\beta}$  مثبت باشد هر عدد بزرگتر یا مساوی  $\frac{\delta-4\beta}{2\beta}$  را می توان به عنوان  $M$

اختیار کرد و اگر  $\frac{\delta-4\beta}{2\beta} \leq 0$  هر عدد مثبت را می توان به عنوان  $M$  انتخاب کرد. مثلاً فرض

کنید که  $\frac{\delta-4\beta}{2\beta} > 0$  و  $M = \frac{\delta-4\beta}{2\beta}$ . حال صحت استلزام فوق را در این حالت

بررسی می کنیم:

$$x > \frac{\delta-4\beta}{2\beta} = M \Rightarrow 2x > \frac{\delta}{\beta} - 4 \Rightarrow 2x+4 > \frac{\delta}{\beta} \Rightarrow |2x+4| > \frac{\delta}{\beta}$$

$$\Rightarrow \frac{\delta}{|2x+4|} < \beta \Rightarrow \left| \frac{-10}{2(2x+4)} \right| < \beta \Rightarrow \left| \frac{2x+1}{2x+4} - \frac{3}{2} \right| < \beta$$

بررسی صحت استلزام را در حالتی که  $\frac{\delta-4\beta}{2\beta} \leq 0$  به عهده خواننده واگذار می کنیم .

۶-۱- جدول حد در حالت های مختلف - گفتیم اگر تمام حالت های ممکن حد تابع را در

نظر بگیریم شانزده حالت می شود و می توانیم بقیه این شانزده حالت را مانند حالت های بررسی شده بحث کنیم و مثال بزنیم. لیکن بهتر است آنها را در جدولی خلاصه کنیم تا مراجعه به آن آسان باشد.

جدول صفحه بعد برای این منظور تهیه شده است .

خواندن جدول و درك مقصود آن آسان است . برای خواندن هر سطر نمادهای آن سطر را

به ترتیب به جای سه نقطه های ابتدای جدول ( از بالا ) قرار داده و عبارت حاصل را از چپ بدراست

میخوانیم . مثلاً سطر هفتم را چنین می خوانیم :

وقتی  $x$  به سمت  $+\infty$  میل کند  $f(x)$  به سمت  $-\infty$  میل خواهد کرد هرگاه برای هر

$N > 0$  يك  $M > 0$  وجود داشته باشد به قسمی که از نامساوی  $x > M$  نامساوی  $f(x) < -N$

نتیجه شود .

جدول تعریف حد تابع  $f: x \rightarrow f(x)$

نامساوی ... نتیجه شود	به قسمی که از نامساوی ...	يك... وجود داشته باشد	هر گاه برای هر ...	وقتی $x$ به سمت ... میل کند	$f(x)$ به سمت ... میل خواهد کرد
$ f(x) - L  < \beta$	$0 <  x - x_0  < \alpha$	$\alpha > 0$	$\beta > 0$	$x_0$	$L$
$f(x) > N$	$0 <  x - 0  < \alpha$	$\alpha > 0$	$N > 0$	$x_0$	$+\infty$
$f(x) < -N$	$0 <  x - x_0  < \alpha$	$\alpha > 0$	$N > 0$	$x_0$	$-\infty$
$ f(x)  > N$	$0 <  x - x_0  < \alpha$	$\alpha > 0$	$N > 0$	$x_0$	$\infty$
$ f(x) - L  < \beta$	$x > M$	$M > 0$	$\beta > 0$	$+\infty$	$L$
$f(x) > N$	$x > M$	$M > 0$	$N > 0$	$+\infty$	$+\infty$
$f(x) < -N$	$x > M$	$M > 0$	$N > 0$	$+\infty$	$-\infty$
$ f(x)  > N$	$x > M$	$M > 0$	$N > 0$	$+\infty$	$\infty$
$ f(x) - L  < \beta$	$x < -M$	$M > 0$	$\beta > 0$	$-\infty$	$L$
$f(x) > N$	$x < -M$	$M > 0$	$N > 0$	$-\infty$	$+\infty$
$f(x) < -N$	$x < -M$	$M > 0$	$N > 0$	$-\infty$	$-\infty$
$ f(x)  > N$	$x < -M$	$M > 0$	$N > 0$	$-\infty$	$\infty$
$ f(x) - L  < \beta$	$ x  > M$	$M > 0$	$\beta > 0$	$\infty$	$L$
$f(x) > M$	$ x  > M$	$M > 0$	$N > 0$	$\infty$	$+\infty$
$f(x) < -M$	$ x  > M$	$M > 0$	$N > 0$	$\infty$	$-\infty$
$ f(x)  > M$	$ x  > M$	$M > 0$	$N > 0$	$\infty$	$\infty$

مثال - تابع  $f$  بوسیله دستور  $f(x) = \frac{-1}{(x-3)^2}$  داده شده است. ثابت کنید که اگر

$x$  به سمت ۳ میل کند  $f(x)$  به سمت  $-\infty$  میل خواهد کرد.



حل - بنا به سطر سوم جدول باید برای هر  $N > 0$  يك  $\alpha > 0$  یابیم به قسمی که :

$$0 < |x-3| < \alpha \Rightarrow \frac{-1}{(x-3)^2} < -N$$

فرض می کنیم که  $\alpha$  با این خاصیت موجود باشد . پس نامساوی طرف دوم استلزام فوق برقرار است . حال سعی می کنیم به کمک آن  $\alpha$  را حدس بزنیم و سپس حدس خود را امتحان خواهیم کرد. اما :

$$\frac{-1}{(x-3)^2} < -N \Rightarrow \frac{1}{(x-3)^2} > N \Rightarrow (x-3)^2 < \frac{1}{N} \Rightarrow |x-3| < \frac{1}{\sqrt{N}}$$

بنابراین دیده میشود که هر عدد مثبت کوچکتر یا مساوی  $\frac{1}{\sqrt{N}}$  را می توان به عنوان  $\alpha$  اختیار کرد . حال فرض کنید داشته باشیم  $0 < \alpha \leq \frac{1}{\sqrt{N}}$  ، در نتیجه :

$$0 < |x-3| < \frac{1}{\sqrt{N}} \Rightarrow 0 < (x-3)^2 < \frac{1}{N} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{(x-3)^2} > N \Rightarrow \frac{-1}{(x-3)^2} < -N$$

یعنی جوابی که برای  $\alpha$  حدس زده بودیم در استلزام فوق صدق می کند و اثبات کامل است.  
توجه - همانطور که مشاهده کرده اید سعی شده است که مثالهای ساده ای در مورد تعیین حد توابع با استفاده از تعریف داده شود و این بدان سبب بوده است که بیشتر با مفهوم حد آشنا شوید . اصولاً محاسبه حد با استفاده از تعریف کار ساده ای نیست و معمولاً برای این محاسبات از قضایای حد که بعداً در مورد آنها صحبت خواهیم کرد استفاده می شود به همین سبب در زیر سعی شده است که تمرینهای ساده ای گنجانده شود.

تمرین :

تساویهای زیر را با استفاده از تعریف حد ثابت کنید.

$$1- \lim_{x \rightarrow 1} (-3x - 1) = -4$$

$$2- \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \right) = \frac{3}{4}$$

$$3- \lim_{x \rightarrow -5} |x-3| = 8$$

$$۲- \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x-1} = 0$$

$$۵- \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

$$۶- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$۷- \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$۸- \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$۹- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$۱۰- \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$۱۱- \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$۱۲- \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$۱۳- \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = -\infty$$

$$۱۴- \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$$

۷-۱- حد چپ و حد راست يك تابع - فرض كنيد كه تابع  $f$  در نقطه  $x_0$  دارای حدی

برابر عدد  $L$  باشد. در نتیجه به ازای هر  $\beta > 0$  يك  $\alpha > 0$  موجود است به قسمی كه :

$$0 < |x - x_0| < \alpha \text{ و } x \in D_f \Rightarrow |f(x) - L| < \beta$$

از این تعریف چنین برمی آید که وقتی  $x$  به سمت  $x_0$  میل کند، خواه از آن بزرگتر باشد خواه از آن کوچکتر،  $f(x)$  در هر دو حالت به سمت  $L$  میل خواهد کرد پس داریم:

$$(1) \quad x_0 < x < x_0 + \alpha \text{ و } x \in D_f \Rightarrow |f(x) - L| < \beta$$

و

$$(2) \quad x_0 - \alpha < x < x_0 \text{ و } x \in D_f \Rightarrow |f(x) - L| < \beta$$

مطالب فوق ما را به تعریف زیر هدایت می کند.

تعریف - تابع  $f$  و نقطه  $x_0$  مفروضند.

الف - فرض کنید که  $a > x_0$  و  $f$  در فاصله  $[x_0, a]$  تعریف شده باشد. گوئیم تابع  $f$

در نقطه  $x_0$  دارای حد راست  $L$  است و می نویسیم  $f(x) = L$  حد، هرگاه  $x \rightarrow x_0^+$

به ازای هر  $\beta > 0$  يك  $\alpha > 0$  موجود باشد به قسمی که:

$$x_0 < x < x_0 + \alpha \text{ و } x \in D_f \Rightarrow |f(x) - L| < \beta$$

ب - فرض کنید که  $a < x_0$  و  $f$  در فاصله  $[a, x_0]$  تعریف شده باشد، گوئیم تابع  $f$

در نقطه  $x_0$  دارای حد چپ  $L'$  است و می نویسیم  $f(x) = L'$  حد، هرگاه به ازای هر  $\beta > 0$  يك  $\alpha > 0$

موجود باشد به قسمی که:

$$x_0 - \alpha < x < x_0 \text{ و } x \in D_f \Rightarrow |f(x) - L'| < \beta .$$

اگر تابع  $f$  در نقطه  $x_0$  دارای حد  $L$  باشد آنوقت استلزامهای (۱) و (۲) بالانشان می دهند

که در  $x_0$  دارای حد راست و چپ بوده و این دو حد با هم مساوی و مساوی همان  $L$  می باشند. به عکس می توان دید (که ما در اینجا از اثبات آن خودداری می کنیم) که اگر تابع  $f$  در  $x_0$  دارای حد راست و حد چپ بوده و این دو حد بایکدیگر مساوی و برابر  $L$  باشند آنوقت  $f$  در  $x_0$  دارای حد  $L$  است. پس می توان گفت:

قضیه - تابع  $f$  در  $x_0$  دارای حد  $L$  است اگر و تنها اگر،  $f$  در  $x_0$  دارای حد چپ و راست

مساوی  $L$  باشد.

اکنون مثالهایی در مورد حد چپ و حد راست می آوریم.

مثال ۱ - حد چپ و حد راست تابع  $f(x) = \sqrt{x} + 3$  را وقتی  $x$  به سمت ۱ میل کند

تعیین کنید.

حل - در مثال ۲ بخش ۱-۴ دیدیم که  $(ax+b) = ax_0 + b$  حد پس:

$$x \rightarrow x_0$$

$$\text{حد } (\sqrt{x} + 3) = \sqrt{1} + 3 = 4$$

$$x \rightarrow 1$$

در نتیجه بنا به قضیه فوق داریم :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{x} + 2) = 10 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} (\sqrt{x} + 2) = 10$$

مثال ۳ - حدهای چپ و راست تابع  $y = \sqrt{x-2}$  را وقتی که  $x$  به سمت ۲ میل کند (در صورت وجود) تعیین کنید.

حل - برای اینکه  $y$  معنی داشته باشد باید  $x \geq 2$  . پس دامنهٔ تعریف تابع چنین است  $D = \{x \mid x \geq 2\}$  . چون تابع در سمت چپ ۲ تعریف نشده است پس حد چپ معنی ندارد . حال ادعا می‌کنیم که  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x-2} = 0$  . برای اثبات این ادعا باید نشان دهیم که:

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists 2 < x < 2 + \alpha \Rightarrow |\sqrt{x-2} - 0| < \beta$$

و یا

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists 2 < x < 2 + \alpha \Rightarrow \sqrt{x-2} < \beta$$

و یا با مجذور کردن سمت راست استلزام اخیر

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists 2 < x < 2 + \alpha \Rightarrow 0 \leq x - 2 < \beta^2$$

و یا

$$\forall \beta > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists 2 < x < 2 + \alpha \Rightarrow 2 \leq x < 2 + \beta^2$$

بنابراین دیده می‌شود که اگر  $0 < \alpha \leq \beta^2$  اختیار شود استلزام فوق برقرار است . این تابع به‌طور کلی حد ندارد زیرا حد چپ ندارد.

قبل از پرداختن به مثال ۳ توجه شما را به این نکته جلب می‌کنیم که می‌توان تعاریفی شبیه به آنچه که در مورد حد چپ و راست در  $x$  بیان کردیم در مورد حالت‌های  $+\infty$  و  $-\infty$  و  $L = +\infty$  نیز بیان کرد. مثلاً تعریف  $f(x) = +\infty$  حد به‌طور نمادی چنین است :

$$\forall N > 0 \quad \exists \alpha > 0 \quad \exists x_0 \quad -\alpha < x < x_0 \Rightarrow f(x) > N$$


مثال ۳ - حد چپ و راست تابع  $f(x) = \frac{1}{x}$  را وقتی که  $x$  به سمت صفر میل کند تعیین کنید.

حل - می‌بینیم که مقدار  $f(0)$  بی‌معنی است و دامنهٔ تعریف تابع  $\{0\} - R$  می‌باشد. اگر  $x$  منفی باشد و به سمت صفر میل کند حد تابع  $-\infty$  است و اگر  $x$  مثبت باشد و به سمت صفر میل کند حد تابع  $+\infty$  است پس:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

درستی این تساویها را می توان به کمک تعریف تحقیق نمود، که ما از وارد شدن در این بحث خودداری می کنیم. توجه کنید که  $f(x) = \infty$  حد و در واقع این بدان معنی است که وقتی  $x$  به  $x \rightarrow 0$

سمت صفر میل می کند  $|f(x)|$  به سمت  $+\infty$  میل می کند. منحنی نمایش این تابع در نزدیکی نقطه صفر در زیر رسم شده است.



مثال ۴- حد تابع  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  را

وقتی که  $x$  به سمت صفر میل می کند تعیین کنید.

حل - در اینجا نیز  $f$  در صفر

تعریف نشده است و دامنه تعریف تابع

مجموعه  $R - \{0\}$  می باشد. خواه  $x$  مثبت باشد و خواه منفی و به سمت صفر میل کند،  $f(x)$  به سمت  $+\infty$  میل خواهد کرد یعنی:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$$

چون حد سمت چپ و حد سمت راست

تابع مساوی هستند پس تابع  $\frac{1}{x^2}$  حد دارد


ولی این حد با پایان نیست. به این سبب

گاهی گفته می شود تابع حد ندارد

یعنی حد با پایانی مانند  $I$  را ندارد در

شکل مقابل نمودار تابع در نزدیکی

نقطه صفر رسم شده است.



مثال ۵- حد تابع  $f(x) = \frac{|x|}{x}$  را

وقتی که  $x$  به سمت صفر میل کند تعیین کنید.

حل - باز در اینجا مقدار  $f(0)$  معنی ندارد، دامنه تعریف تابع  $D_f = R - \{0\}$  می باشد.

این تابع را می توان چنین نوشت:


$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{اگر } x > 0 \\ -1 & \text{اگر } x < 0 \end{cases}$$

باتوجه به این داریم :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

و

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1 = \lim_{x \rightarrow 0} (-1) = -1$$



پس تابع  $f$  در نقطه  $x=0$  حد ندارد نمودار آن در شکل مقابل رسم شده است:

مثال ۶- تابع  $f$  به صورت

زیر داده شده است :


$$f(x) = \begin{cases} x & \text{اگر } x < 2 \\ 5 & \text{اگر } x = 2 \\ x+2 & \text{اگر } x > 2 \end{cases}$$

حد راست و حد چپ این تابع را وقتی که  $x$  به سمت ۲ میل کند پیدا کنید .

حل - دامنه تعریف این تابع مجموعه اعداد حقیقی است یعنی  $D_f = \mathbb{R}$  . داریم :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x = 2 = \lim_{x \rightarrow 2} x = 2 \quad \text{و}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x+2) = 4 = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$



ملاحظه می شود که  $f(2)$  نه باحد چپ برابر است و نه باحد راست. نمودار این تابع در

شکل بالا رسم شده است.

۸-۱ - حد چپ و حد راست در تابع قدر مطلق درجه اول- تابع

$f: x \rightarrow y = |ax+b|$  را که در آن  $a \neq 0$  در نظر می‌گیریم. می‌توان فرض کرد که ضریب  $x$  یعنی  $a$  مثبت است زیرا در غیر این صورت تابع  $f$  را به صورت  $f(x) = |-ax-b|$  می‌نویسیم که در دستور اخیر ضریب  $x$  یعنی  $-a$  مثبت است. دامنه تعریف  $f$  مجموعه اعداد حقیقی و برد آن مجموعه اعداد حقیقی غیرمنفی می‌باشد.

مقدار دو جمله‌ای  $ax+b$  به ازای  $x = -\frac{b}{a}$  صفر و در این نقطه تغییر علامت می‌دهد. پس تعریف تابع چنین می‌شود.

$$f(x) = \begin{cases} -ax-b & \text{اگر } x < -\frac{b}{a} \\ 0 & \text{اگر } x = -\frac{b}{a} \\ ax+b & \text{اگر } x > -\frac{b}{a} \end{cases}$$

به طوری که ملاحظه می‌شود اگر  $x$  به سمت  $-\frac{b}{a}$  میل کند حد چپ و حد راست و

مقدار تابع هر سه باهم مساویند.


$$\lim_{x \rightarrow -\frac{b}{a}^-} (ax+b) = \lim_{x \rightarrow -\frac{b}{a}^+} (ax+b) = \lim_{x \rightarrow -\frac{b}{a}} (ax+b) = f\left(-\frac{b}{a}\right) = 0$$

نمودار تابع در نقطه  $(-\frac{b}{a}, 0)$

شکسته می‌شود و مطابق شکل مقابل است.

مثال- تابع

$$f: x \rightarrow x+1+|x-1|$$




مفروض است اگر  $x$  به سمت ۱ میل کند

حد تابع را معلوم و نمودار آن را رسم کنید.

حل - این تابع را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$f(x) = \begin{cases} f(x) = 2 & \text{اگر } x < 1 \\ f(x) = 2 & \text{اگر } x = 1 \\ f(x) = 2x & \text{اگر } x > 1 \end{cases}$$



ملاحظه می‌شود که حدهای چپ و راست  
و مقدار تابع در نقطه ۱ با هم برابرند و مساوی  
۲ می‌باشند یعنی:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} [x+1+|x-1|] = \lim_{x \rightarrow 1^+} [x+1+|x-1|] = f(1) = 2$$

نمودار تابع در شکل بالا رسم شده است.

۱ - ۹ - حد چپ و حد راست در تابع پله‌ای  $[x]$  - همانطور که در کتاب حساب و جبر

سال سوم دیده‌اید،  $[x]$  مساوی بزرگترین عدد درست کوچکتر یا مساوی  $x$  است.

مثلا اگر  $p < x < p+1$  و  $p$  عددی درست باشد داریم  $[x] = p$ .

به این ترتیب:

برای  $-1 < x < 0$  مقدار تابع مساوی است با  $-1$


برای  $0 < x < 1$  مقدار تابع مساوی است با  $0$

برای  $1 < x < 2$  مقدار تابع مساوی است با  $1$

برای  $2 < x < 3$  مقدار تابع مساوی است با  $2$

.....  
.....

قسمتی از نمودار تابع را در شکل زیر رسم کرده‌ایم.





اکنون ملاحظه می‌کنیم که این تابع در هر نقطه که طولش عددی درست باشد حد ندارد. مثلا نقطه به طول ۳ را در نظر می‌گیریم خواهیم داشت:

$$\text{حد چپ: } \lim_{x \rightarrow 3^-} [x] = 2 = \lim_{x \rightarrow 3^-} 2$$

$$\text{حد راست: } \lim_{x \rightarrow 3^+} [x] = 3 = \lim_{x \rightarrow 3^+} 3$$

$$\text{مقدار تابع: } f(3) = [3] = 3$$

به همین ترتیب در نقطه به طول عدد درست P خواهیم داشت:

$$\text{حد چپ: } \lim_{x \rightarrow p^-} [x] = p - 1$$

$$\text{حد راست: } \lim_{x \rightarrow p^+} [x] = p$$

$$\text{مقدار تابع: } f(p) = p$$

چون در نقاط به طول عدد درست، حد چپ و حد راست تابع با یکدیگر مساوی نیستند پس این تابع در آن نقاط حد ندارد. در نقاطی که طولشان عددی درست نیست این تابع حد دارد زیرا در نزدیکی و دوطرف چنین نقاطی تابع مقداری ثابت است.

۱-۱۰- حد چپ و حد راست در تابع هموگرافیک = تابع  $f(x) = \frac{ax+d}{cx+d}$  که در آن  $c \neq 0$

به تابع هموگرافیک موسوم است. بررسی این تابع و نمودار آن در سال سوم گفته شده است. این

تابع در تمام مجموعه اعداد حقیقی جز نقطه به طول  $-\frac{d}{c}$ ، که به ازای آن مخرج کسر  $\frac{ax+b}{cx+d}$

صفر می‌شود، تعریف شده است. پس دامنه تعریف آن مجموعه  $D_f = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$  می‌باشد.

حد چپ و حد راست تابع در موقعی که  $x$  به سمت  $-\frac{d}{c}$  میل کند با یکدیگر مساوی نیستند. اگر

تابع صعودی باشد حد چپ  $+\infty$  و حد راست  $-\infty$  است و اگر تابع نزولی باشد حد چپ  $-\infty$  و حد راست  $+\infty$  خواهد بود.


مثال- نمودار تابع  $f(x) = \frac{2x-6}{x-1}$  را رسم کنید.

حل - مشتق این تابع به صورت  $f'(x) = \frac{2}{(x-1)^2}$  است که همیشه مثبت است.

جدول تغییرات f بر حسب تغییرات x چنین است:

$x$	$-\infty$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$1$	$\nearrow$	$2$	$\nearrow$	$+\infty$	
$f'(x)$	+			+						
$f(x)$	$2$	$\nearrow$	$6$	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$2$

چنانچه در سال سوم دیده‌اید دو خط  $x=1$  و  $y=2$  مجانبهای نمودار تابع می‌باشند و نمودار تابع  $f$  نسبت به محورهای مختصات در شکل زیر رسم شده است.



البته توجه کرده‌اید که :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

بررسی قضایای حدود:

اینک به ذکر برخی از قضایای حد که اکثر آنها را در سال سوم دیده‌اید می‌پردازیم.

۱-۱ - دو تابع هم ارز - دو تابع  $f$  و  $g$  را در نظر می‌گیریم، اگر این دو تابع در  $x_0$

حد داشته و بعلاوه  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$  آن دو تابع را وقتی  $x$  به سمت  $x_0$  میل کند هم ارز

گویند و می‌نویسند  $g \sim f$ . در تعریف فوق  $x_0$  می‌تواند هر عدد حقیقی،  $+\infty$  یا  $-\infty$  و یا  $\infty$  باشد.

مثال ۱ - تابع های  $\sin x$  و  $x$  وقتی  $x$  به سمت صفر میل می کند هم ارز می باشند.  
( اثبات این مطلب را در سال سوم دیده اید ):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

در محاسبه حد يك عبارت در نقطه  $x_0$  می توان به جای هر تابع شرکت کننده در آن عبارت تابعی هم ارز آن (وقتی  $x$  به سمت  $x_0$  میل کند) را قرار داد.

مثال ۲ - می توانیم از این خاصیت مثلاً در مورد پیدا کردن حد تابع  $\frac{\sin \Delta x}{\sin 3 \Delta x}$  استفاده کنیم ، یعنی به جای هر تابع هم ارز آنرا قرار بدهیم ، پس خواهیم داشت.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\sin 3 \Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{3 \Delta x} = \frac{1}{3}$$

در قضایای زیر منظور از يك تابع حددار تابعی است که حد داشته و حدش با پایان باشد.

۱ - ۱۲ - قضیه - حد مجموع دو تابع حد دار مساوی است با مجموع حدود آنها  
این قضیه را بدون اثبات می پذیریم .

مثال -

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (|x-1| + |x|) - \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} |x-1| + \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} |x| = \\ & \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (-x+1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

۱ - ۱۳ - قضیه - اگر تابع حدداری را در عدد ثابتی ضرب کنیم حد آن در همان عدد ضرب خواهد شد.

اثبات - فرض کنید که  $f(x) = L$  حد، که در آن  $L$  عددی است حقیقی. فرض کنید  $\lambda$  عددی

است ثابت . اگر  $\lambda = 0$  آنوقت تابع  $\lambda f(x)$  در دامنه تعریفش متحد با صفر بوده و در نتیجه:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lambda f(x) = 0 = 0 \times L$$

پس فرض کنید  $\lambda \neq 0$ . باید نشان دهیم که:

$$(1) \quad \forall \beta > 0 \exists \alpha > 0 \exists \epsilon > 0 \epsilon < |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |\lambda f(x) - \lambda L| < \beta$$

چون  $f(x) = L$  حد پس در ازای  $\beta > 0$  يك  $\alpha > 0$  موجود است به قسمی که:

$$0 < |x - x_0| < \alpha_1 \Rightarrow |f(x) - L| < \frac{\beta}{|\lambda|}$$

و یا

$$0 < |x - x_0| < \alpha_1 \Rightarrow |\lambda| |f(x) - L| < \beta$$

و یا

$$0 < |x - x_0| < \alpha_1 \Rightarrow |\lambda f(x) - \lambda L| < \beta$$

پس دیده می شود که کافیت  $\alpha$  را دو استزام (۱) برابر  $\alpha_1$  اختیار کنیم تا به يك گزاره درست

تبدیل شود .

مثال -

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( -2 \frac{\sin x}{x} \right) = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = -2 \times 1 = -2$$

۱ - ۱۴ - قضیه - حد تفاضل دو تابع حدار مساوی است با تفاضل حدود آنها

اثبات - کافی است که برای اثبات این قضیه از دو قضیه پیش استفاده کنیم .

۱ - ۱۵ - قضیه - حد حاصل ضرب دو تابع حدار مساوی است با حاصل ضرب حدود آنها .

از اثبات این قضیه نیز صرف نظر می کنیم .

مثال -

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \sin x \left( \frac{\sin x}{x} \right) \right) =$$

$$\left( \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \right) \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) = 0 \times 1 = 0$$

تبصره - قضایای ۱-۱۲ و ۱-۱۵ را می توان در مورد چند تابع نیز بیان کرد .

۱-۱۶ - قضیه - حد خارج قسمت دو تابع حدار مساوی است با خارج قسمت حدهای آنها

به شرطی که حد منخرج صفر نباشد .

این قضیه را نیز بدون اثبات می پذیریم .

۱-۱۷ - قضیه - حد ریشه  $n$  ام یا توان  $n$  ام يك تابع حدار مساوی با ریشه  $n$  ام یا توان

$n$  ام حد همان تابع است .

اثبات - برای حالت توان  $n$  ام قضیه را ثابت می کنیم . فرض کنید که  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$   $\rightarrow$

بنا به تبصره فوق داریم

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = \underbrace{(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)) (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)) \dots (\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))}_{n \text{ بار}} = \underbrace{L \times L \times \dots \times L}_{n \text{ بار}} = L^n$$

تبصره - این قضیهها درحالتی که  $x$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل کند نیز صادق می باشند. البته توجه دارید که در این قضا با فرض شده است که حدود توابع مورد بحث با پایان هستند و نهایت نمی باشند. در غیر این صورت می توانیم نتایج زیر را اضافه کنیم :

I - اگر  $f$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  و  $g$  به سمت مقدار با پایانی میل کند مجموع  $f+g$  به ترتیب به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل خواهد کرد .  
 II - اگر  $f$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  و  $g$  به سمت مقدار با پایانی غیر صفر میل کند حاصل ضرب  $f.g$  به ترتیب به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل خواهد کرد اگر حد  $g$  مثبت و به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل خواهد کرد اگر حد  $g$  منفی باشد .

III - اگر  $f$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  و  $g$  به سمت يك حد با پایان میل کند خارج قسمت  $\frac{f}{g}$  به سمت یکی از  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل خواهد کرد .

IV - اگر  $g$  به سمت صفر و  $f$  به سمت يك حد با پایان غیر صفر میل کند خارج قسمت  $\frac{f}{g}$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل خواهد کرد .

V - اگر  $g$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  و  $f$  به سمت يك حد با پایان میل کند خارج قسمت  $\frac{f}{g}$  به سمت صفر میل خواهد کرد .

۱ - قضیه - اگر  $x$  به سمت صفر میل کند هر چند جمله ای از  $x$  هم ارز جمله ای از آن چند جمله ای خواهد بود که دارای کوچکترین توان است.

اثبات - فرض کنیم چند جمله ای  $P(x)$  به صورت زیر باشد :

$$P(x) = a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + \dots + a_m x^m, \quad m > n \geq 0, a_n \neq 0, a_m \neq 0$$

از جمله اول که دارای کوچکترین توان است فاکتور می گیریم ، خواهیم داشت :

$$P(x) = a_n x^n \left( 1 + \frac{a_{n+1}}{a_n} x + \dots + \frac{a_m}{a_n} x^{m-n} \right)$$

حال اگر  $x$  به سمت صفر میل کند داخل پرانتز به سمت ۱ میل می کند و در نتیجه خواهیم داشت:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{a_m x^n} = 1$$

پس  $P(x) \sim a_n x^n$  وقتی  $x \rightarrow 0$

۱ - ۱۹ - قضیه - اگر  $x$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل کند هر چند جمله ای از  $x$  هم از آن

جمله ای از چند جمله ای خواهد بود که دارای بزرگترین توان است.

اثبات - فرض کنیم چند جمله ای  $P(x)$  به شکل زیر باشد:

$$P(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0, \quad a_m \neq 0$$

از جمله اول که دارای بزرگترین توان است فاکتور می گیریم خواهیم داشت:

$$P(x) = a_m x^m \left( 1 + \frac{a_{m-1}}{a_m x} + \dots + \frac{a_n}{a_m x^m} \right)$$

اگر  $x$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل کند داخل پرانتز به سمت ۱ میل خواهد کرد و

در نتیجه :

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{P(x)}{a_m x^m} = 1 \implies P(x) \sim a_m x^m \quad x \rightarrow \pm \infty$$

۱ - ۲۰ - مسئله اصلی - اینک يك مسئله اساسی را که عبارت از پیدا کردن حد يك تابع است

مطرح می کنیم . در خیلی از توابع به صورت  $y = f(x)$  وقتی که  $x$  به سمت مقدار ثابت  $x_0$  میل می کند حد تابع  $f$  همان مقدار  $f(x_0)$  می شود.

این موضوع ممکن است شما را به اشتباه بیندازد و تصور کنید که هر وقت  $f(x_0)$  را

حساب کردید حتماً حد تابع است و هر وقت  $f(x_0)$  وجود ندارد حتماً حدی برای تابع نیست.

در صورتی که مطلب غیر از این است؛ چه بسا که  $f(x_0)$  وجود دارد ولی حد وجود ندارد و چه بسا که  $f(x_0)$  وجود ندارد ولی حد وجود دارد و چه بسا که هر دو وجود دارند ولی بایکدیگر مساوی نیستند .

مثال ۱ - تابع  $f(x) = x + 2 + \sqrt{x}$  داده شده است. اگر  $x$  به سمت صفر میل کند حد

تابع و همچنین  $f(0)$  را حساب کنید .

حل - ملاحظه می شود که  $f(0) = 2$  است ولی اگر  $x$  به سمت صفر میل بکند تابع حد ندارد

زیرا که حد چپ ندارد یعنی مقدار «  $x + 2 + \sqrt{x}$  » حد « موجود نیست.  $x \rightarrow 0^-$  »

مثال ۲ - تابع  $f$  به وسیله دستور  $f(x) = x + 2$  برای اعداد غیردرست تعریف شده است

وقتی  $x$  به سمت  $2$  میل کند حد این تابع را حساب کنید .

حل - چون  $2$  عددی درست است بنا براین  $f(2)$  وجود ندارد . ولی تابع حد دارد زیرا وقتی  $x$  به سمت  $2$  میل می کند  $x$  مخالف  $2$  است و در نتیجه  $f(x) = x + 2$  و از این روی حدش همان حد تابع  $2 + x$  است که برابر  $4$  می باشد.

مثال ۳ - تابع  $g(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{اگر } x \text{ عددی درست نباشد} \\ 0 & \text{اگر } x \text{ عددی درست باشد} \end{cases}$  داده شده است

$g(x)$  حد و مقدار  $g(2)$  را محاسبه کنید . آیا این دو مساوی اند؟  
 $x \rightarrow 2$

حل - وقتی  $x$  عددی درست نباشد  $g(x)$  برابر است با همان  $f(x)$  در مثال ۲ . از طرفی می دانیم که حد يك تابع در يك نقطه به مقدار خود تابع در آن نقطه بستگی ندارد پس حد  $g$  و  $f$  وقتی  $x$  به سمت  $2$  میل کند یکی هستند . پس این حد مشترك عدد  $4$  می باشد . اما مقدار  $g$  در نقطه  $2$  برابر صفر است و دیده میشود .

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4 \neq 0 = g(2)$$

از این مقدمه چنین نتیجه می شود که وجود  $f(x_0)$  برای موجود بودن حد وقتی که  $x$  به سمت  $x_0$  میل می کند نه شرط لازم است و نه شرط کافی، و فقط در توابع پیوسته است که حد تابع با مقدار  $f(x_0)$  مساوی می شود. بررسی تابع پیوسته را سال گذشته دیده اید در اینجا نیز تکرار خواهیم کرد، از طرف دیگر تشخیص تابع پیوسته از تابع غیر پیوسته باز به خود مسئله حد برمی گردد.

۱- ۲۱ - صورتهای مبهم - حتماً تاکنون در بررسی مسائل حد به صورتهای

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty \times \infty \text{ و } \infty - \infty$$

برخورده اید. این صورتهای مبهم می گویند زیرا مقادیری که سرانجام برای هر يك از آنها بدست خواهیم آورد معمولاً از مسئله ای به مسئله دیگر فرق می کند . سه صورت

$\frac{\infty}{\infty}$  و  $\infty \times \infty$  و  $\infty - \infty$  قابل تبدیل به صورت  $\frac{0}{0}$  می باشند . در زیر یادکر چند مثال روش رفع ابهام از این صور را بیان خواهیم کرد.

مثال ۱ - حد تابع  $f(x) = \frac{5x + 2}{2x - 1}$  را وقتی که  $x$  به سمت  $\pm \infty$  میل می کند تعیین کنید.

حل - این کسر به صورت  $\frac{\infty}{\infty}$  درمی آید که با استفاده از قضیه ۱-۱۹ و آنچه که در زیر مثال

شماره ۱۱-۱ گفتیم خواهیم داشت :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\Delta x + 2}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\Delta x + 2}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{\Delta x}{2x} = \frac{1}{2}$$

البته حذفی را می توان به کمک قاعده هوییتال (که در سال سوم دیده اید) نیز بدست آورد.

مثال ۲ - حد تابع  $f(x) = \frac{2x^2 - 3}{\Delta x^2 + \Delta x + 1}$  را وقتی که  $x$  به سمت  $\pm \infty$  میل می کند

تعیین کنید:

حل - این کسر نیز به صورت مبهم  $\frac{\infty}{\infty}$  در می آید که مانند مثال قبل می توان عمل کرد.

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{2x^2 - 3}{\Delta x^2 + \Delta x + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{2x^2}{\Delta x^2} = \frac{2}{1}$$

مثال ۳ - حد تابع  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 1}$  را وقتی که  $x$  به سمت ۱ میل می کند پیدا کنید:

حل - این کسر به صورت مبهم  $\frac{0}{0}$  در می آید، برای رفع ابهام صورت و مخرج کسر را تجزیه

می کنیم، خواهیم داشت :

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{(x-1)(x+1)}$$

عامل مشترك  $x - 1$  را که در صورت و مخرج باعث حالت ابهام می شود حذف می کنیم،

خواهیم داشت:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} = \frac{3}{2}$$

مثال ۴ - حد تابع  $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5} - x$  را وقتی که  $x$  به سمت  $+\infty$  میل

می کند پیدا کنید:

حل - ملاحظه می کنیم که تابع در این صورت مبهم است و به حالت  $\infty - \infty$  در می آید.

برای رفع ابهام تابع و پیدا کردن حد آن به روش زیر عمل می کنیم :

صورت و مخرج کسر را در مزدوج صورت ضرب می کنیم، خواهیم داشت :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x}{1} \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x][\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x]}{[\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x]} \end{aligned}$$



$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 5 - x^2}{x \left[ \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1 \right]} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 5}{x \left[ \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1 \right]} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x} = 1$$

در تساوی ماقبل آخر از این مطلب که  $(2x+5) \sim 2x$  و  $x \left( \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1 \right) \sim 2x$  استفاده شده است. وقتی  $x \rightarrow +\infty$

مثال ۵ - حد تابع  $f(x) = x + \frac{\sqrt{x^2}}{x}$  را وقتی که  $x$  به سمت صفر میل می کند در صورت

وجود تعیین کنید:

حل - وقتی  $x$  به سمت صفر میل می کند  $f(x)$  به صورت مبهم  $\frac{0}{0}$  درمی آید. برای رفع

ابهام تابع را چنین می نویسیم:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x > 0 \\ x-1 & x < 0 \end{cases}$$

حد چپ تابع ۱ - و حد راست آن ۱ + است، پس این تابع حد ندارد.

مثال ۶ - حد تابع  $f(x) = \frac{\sin 3x}{\Delta x}$  را وقتی که  $x$  به سمت صفر میل می کند تعیین کنید:

حل - وقتی  $x$  به سمت صفر میل می کند تابع به صورت مبهم  $\frac{0}{0}$  درمی آید. برای رفع ابهام

دو روش داریم:

روش اول - استفاده از قانون هسپیتال.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin 3x}{\Delta x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{3 \cos 3x}{\Delta} \right) = \frac{3}{\Delta}$$

روش دوم - استفاده از توابع هم ارز - داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\Delta x} = \frac{3}{\Delta}$$

مثال ۷ - حد تابع  $f(x) = x \cot x$  را وقتی  $x$  به سمت صفر میل می کند تعیین کنید:

حل - وقتی  $x$  به سمت صفر میل کند این تابع به صورت مبهم  $\infty \times 0$  درمی آید. برای رفع

ابهام چنین عمل می کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cot x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cos x =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \times 1 = 1$$

تصریح :

حد تابعهای زیر را در نقاط داده شده پیدا کنید

$$1- f: x \mapsto \frac{x^2 + 3x^2 - 4}{x^2 - 1} \quad , \quad x \rightarrow 1$$

$$2- f: x \mapsto \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 - 5x + 4} \quad , \quad x \rightarrow 1$$

$$3- f: x \mapsto \frac{x^2 - 2x^2 + 1}{x^2 - 5x + 4} \quad , \quad x \rightarrow 1$$

$$4- f: x \mapsto \frac{\sqrt{x} - 2}{x^2 - 5x + 4} \quad , \quad x \rightarrow 4$$

$$5- f: x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{x+1}{\sqrt{x}} \quad , \quad x \rightarrow 0^+$$

$$6- f: x \mapsto \frac{1}{x(x+1)} - \frac{1}{x} \quad , \quad x \rightarrow 0$$

$$7- f: x \mapsto \frac{x^n - a^n}{a^p - x^p} \quad , \quad n, p \in \mathbb{N} \quad , \quad x \rightarrow a$$

$$8- f: x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2} - 1} \quad , \quad x \rightarrow 0$$

$$9- f: x \mapsto \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x-4} \quad , \quad x \rightarrow 4$$

$$10- f: x \mapsto \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{x+7} - 3} \quad , \quad x \rightarrow 2$$

$$11- f: x \mapsto \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{\sqrt[3]{x+19} - 3} \quad , \quad x \rightarrow 8$$

$$12- f: x \mapsto \frac{\sqrt{x} - 1}{x-1} \quad , \quad x \rightarrow 1$$

$$13- f: x \mapsto \frac{\sqrt{x+4} - \sqrt{3x+2}}{\sqrt{x+1} - 1} \quad , \quad x \rightarrow 0$$

$$14- f: x \mapsto \frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x-1} \quad , \quad x \rightarrow 1$$

$$15- f: x \mapsto \frac{x - \sqrt{x+2}}{\sqrt{4x+1} - 3} \quad , \quad x \rightarrow 2$$

۱۶-	$f: x \rightarrow \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$	$a > 0$	$x \rightarrow a$
۱۷-	$f: x \rightarrow \frac{\sin^2 x}{\sin \Delta x}$		$x \rightarrow 0$
۱۸-	$f: x \rightarrow \frac{\sin^2 x}{\operatorname{tg} \Delta x}$		$x \rightarrow 0$
۱۹-	$f: x \rightarrow \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$		$x \rightarrow 0$
۲۰-	$f: x \rightarrow \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x}$		$x \rightarrow 0$
۲۱-	$f: x \rightarrow \frac{\sin^2 x}{\operatorname{tg}^2 x}$		$x \rightarrow 0$
۲۲-	$f: x \rightarrow (1 + \cos x) \operatorname{tg} \frac{x}{2}$		$x \rightarrow \pi$
۲۳-	$f: x \rightarrow \frac{\sin^2 x}{\sqrt{1 - \cos x}}$		$x \rightarrow 0$
۲۴-	$f: x \rightarrow (\sin x - 1) \operatorname{tg}^2 x$		$x \rightarrow \frac{\pi}{2}$
۲۵-	$f: x \rightarrow \frac{\cos x - \cos a}{\sin x - \sin a}$		$x \rightarrow a$

حد نوابع زیر را در صورتی که  $x$  به سمت  $+\infty$  یا  $-\infty$  میل کند به دست آورید.

۲۶-	$f: x \rightarrow \frac{x^2 - \Delta x + 1}{x^2 + 2}$
۲۷-	$f: x \rightarrow \frac{x^4 + 2x - 5}{x^4 - 7}$
۲۸-	$f: x \rightarrow \frac{x^2 - 7x + 1}{2x^2 - 4}$
۲۹-	$f: x \rightarrow \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$
۳۰-	$f: x \rightarrow \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}$
۳۱-	$f: x \rightarrow \sqrt{x^2 + x} - x$
۳۲-	$f: x \rightarrow \sqrt{x^2 + ax + b} - x$

$$۳۳- f: x \rightarrow \sqrt{x^2+2x}-\sqrt{x^2+2}$$

$$۳۴- f: x \rightarrow \sqrt{x^2+2x}-x^2$$

$$۳۵- f: x \rightarrow \sqrt{x^2+2}-\sqrt{x+1}$$

$$۳۶- f: x \rightarrow \frac{x+\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2-5x+1}}$$

$$۳۷- f: x \rightarrow \frac{x-\sqrt{x^2+1}}{x^2-\sqrt{x^2+1}}$$

$$۳۸- f: x \rightarrow \frac{x-\sqrt{x^2+x+1}}{2x-\sqrt{4x^2+x}}$$

$$۳۹- f: x \rightarrow \frac{x}{\sqrt{x+1}} - \frac{x}{\sqrt{x+2}}$$

$$۴۰- f: x \rightarrow \sqrt{x^2+x-2}-(x^2-1)$$

$$۴۱- f: x \rightarrow \sqrt{x^2+ax+1}-(ax+b) \rightarrow (\text{بحث})$$

### پیوستگی تابع

۱ - ۲۲ - پیوستگی تابع در يك نقطه - موضوع پیوستگی تابع را در سال سوم دیده اید .

اینک آن را یاد آوری می کنیم .

تعریف - تابع  $f$  را در نقطه  $x_0$  پیوسته گویند هر گاه سه شرط زیر برقرار باشد:

۱-  $f$  در  $x_0$  تعریف شده باشد یا به عبارت دیگر  $x_0 \in D_f$

۲- وقتی  $x$  به سمت  $x_0$  میل کند تابع  $f$  حد داشته باشد

۳- این حد برابر مقدار تابع در  $x_0$  باشد یعنی  $f(x) = f(x_0)$  حد  $x \rightarrow x_0$

اگر تابعی در يك نقطه پیوسته نباشد آن را در آن نقطه گسسته یا منفصل گویند . همانطور که

در مورد توابع حد از سمت چپ و حد از سمت راست را در يك نقطه تعریف کردیم می توان

بطور مشابه پیوستگی از سمت چپ و پیوستگی از سمت راست را در يك نقطه تعریف کرد . برای

این منظور کافیست که در تعریف فوق ، همه جا بجای حد به ترتیب حد از سمت چپ و حد از سمت

راست را قرار دهیم .

تابع  $f$  را در يك فاصله پیوسته گویند هر گاه در هر يك از نقاط آن فاصله پیوسته باشد . چنانچه

این فاصله شامل نقاط انتهائی اش باشد منظور از پیوستگی در این نقاط پیوستگی از سمت چپ با از سمت راست (بر حسب مورد) است.

تبصره ۱ - مرسوم است که سه شرط ۱ و ۲ و ۳ در تعریف پیوستگی را یکجا با نوشتن

$$f(x) = f(x_0) \quad x \rightarrow x_0$$

تعریف برقرار است.

تبصره ۲ - با توجه به تعریف حد می توان تعریف پیوستگی را بر حسب نمادهای  $\beta$  و  $\alpha$  چنین

بیان داشت:

$$\forall \beta > 0 \exists \alpha > 0 \ni |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \beta$$

توجه کنید که در اینجا شرط  $|x - x_0| < \alpha$  حذف شده است زیرا اولاً  $f$  در  $x_0$  تعریف

شده و ثانیاً طرف دوم استلزام فوق به ازای  $x = x_0$  به صورت  $|f(x_0) - f(x_0)| < \beta$  درمی آید که یک نامساوی درست است.

مثال ۱ - تابع  $f(x) = x^2$  در نقطه  $x = 0$  به طول صفر پیوسته است زیرا که:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 = f(0)$$

مثال ۲ - تابع  $f(x) = \sqrt{x}$  در نقطه  $x = 0$  به طول صفر گسسته است زیرا که در صفر حد چپ

ندارد و در نتیجه دارای حد نیست. امل این تابع در نقطه صفر از سمت راست پیوسته است زیرا:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 = f(0)$$

مثال ۳ - تابع

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{اگر } x \neq 2 \\ 4 & \text{اگر } x = 2 \end{cases}$$

در نقطه  $x = 2$  به طول ۲ پیوسته نیست و گسسته است زیرا که:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \neq 4 = f(2)$$

۱ - ۲۳ - قضایای پیوستگی - فرض کنیم  $x_0$  و  $\lambda$  دو مقدار حقیقی و  $f$  و  $g$  توابعی پیوسته در

$x_0$  باشند، قضایای زیر را بدون اثبات بیان می کنیم:

قضیه اول - تابع  $\lambda f$  در نقطه  $x_0$  پیوسته خواهد بود؛

قضیه دوم - تابع  $f + g$  در نقطه  $x_0$  پیوسته خواهد بود؛

قضیه سوم - تابع  $f - g$  در نقطه  $x_0$  پیوسته خواهد بود؛

قضیه چهارم - تابع  $f \cdot g$  در نقطه  $x_0$  پیوسته خواهد بود؛

قضیه پنجم - تابع  $\frac{f}{g}$  به شرط  $g(x_0) \neq 0$  در نقطه  $x_0$  پیوسته خواهد بود.

مثال ۱ - تابع  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow x \rightarrow$  در تمام نقاط به استثنای صفر پیوسته است.

مثال ۲ - تابع  $tg x \rightarrow x \rightarrow$  در دامنه تعریفش پیوسته است

مثال ۳ - تابع  $x \rightarrow 4x^2 + 2x + 3$  در تمام نقاط پیوسته است. برای اینکه از جمع

سه تابع پیوسته به وجود آمده است.

مثال ۴ - تابع  $x \rightarrow \frac{2x^2 + 2x + 1}{x - 1}$  به ازای هر  $x \neq 1$  پیوسته است.

مثال ۵ - تابع  $x \rightarrow x^2 - 1$  پیوسته است.

مثال ۶ - همانطور که در کتاب حساب و جبر سال سوم دیده اید حد هر چند جمله‌ای در هر

نقطه برابر است با مقدار آن چند جمله‌ای در آن نقطه بنابراین هر تابع چند جمله‌ای در تمام نقاط پیوسته است.

مثال ۷ - اگر  $p(x)$  و  $q(x)$  دو چند جمله‌ای باشند خارج قسمت آنها  $\frac{p(x)}{q(x)}$  در هر نقطه

که به ازای آن  $q(x) \neq 0$  پیوسته است (بنا به قضیه ۵ و مثال ۶ فوق).

۱-۴۴ - نمایش حد و پیوستگی به وسیله شکل - بدو توجه می‌کنیم که اگر  $a$  عددی

مثبت باشد آنوقت :

$$|t| < a \iff -a < t < a$$

یک راه ساده برای اثبات مطلب فوق چنین است :

قدر مطلق  $t$  فاصله نقطه  $t$  را تا نقطه صفر نشان می‌دهد و  $|t| < a$  بیان می‌کند که فاصله

$t$  از صفر کمتر از  $a$  می‌باشد. چنانچه مطلب اخیر را روی محور اعداد حقیقی تعبیر کنیم معلوم میشود

که  $t$  عددی بین  $-a$  و  $a$  می‌باشد یعنی  $-a < t < a$  و به عکس اگر  $t$  بین  $-a$  و  $a$  باشد

آنوقت فاصله‌اش از صفر کمتر از  $a$  بوده و در نتیجه  $|t| < a$ .

حال فرض کنید  $a$  و  $\beta$  اعدادی مثبت باشند، از آنچه گذشت نتیجه میشود که :

$$0 < |x - x_0| < \alpha \iff -\alpha < x - x_0 < \alpha \text{ و } x \neq x_0$$

یا

$$0 < |x - x_0| < \alpha \iff x_0 - \alpha < x < x_0 + \alpha \text{ و } x \neq x_0$$

و یا

$$0 < |x - x_0| < \alpha \iff x \in ]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[ - \{x_0\}$$

وهمینطور

$$|f(x) - L| < \beta \Leftrightarrow -\beta < f(x) - L < \beta$$

یا

$$|f(x) - L| < \beta \Leftrightarrow L - \beta < f(x) < L + \beta$$

و یا

$$|f(x) - L| < \beta \Leftrightarrow f(x) \in ]L - \beta, L + \beta[$$

باتوجه به مطالب فوق تعریف حد و پیوستگی را به ترتیب می‌توان به صورتهای زیر بیان کرد:

**الف- حد**

$$\forall \beta > 0 \exists \alpha > 0 \exists x \in ]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[ - \{x_0\} \Rightarrow f(x) \in ]L - \beta, L + \beta[$$

یعنی به ازای هر فاصله باز به شکل  $]L - \beta, L + \beta[$  که حول  $L$  در نظر بگیریم یک فاصله باز بدون مرکز  $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$  حول  $x_0$  موجود است به قسمی که اگر  $x$  از فاصله اخیر انتخاب شود  $f(x)$  متعلق به فاصله اول باشد.


**ب- پیوستگی**

$$\forall \beta > 0 \exists \alpha > 0 \exists x \in ]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[ \Rightarrow f(x) \in ]f(x_0) - \beta, f(x_0) + \beta[$$

یعنی به ازای هر فاصله باز به شکل  $]f(x_0) - \beta, f(x_0) + \beta[$  حول  $f(x_0)$  یک فاصله باز مانند  $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$  حول  $x_0$  موجود است به قسمی که اگر  $x$  در فاصله اخیر انتخاب شود  $f(x)$  متعلق به فاصله اول باشد.

نظیر این مطالب را می‌توان در مورد حد چپ و حد راست و پیوستگی از چپ و پیوستگی از راست نیز بیان کرد که مادر اینجا از بیان آنها خودداری می‌کنیم. شکلهای زیر مطالب فوق را مجسم می‌کنند.


حد در حالت‌های سه‌گانه  
این شکل حد را نشان می‌دهد



$$x \in ]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[ - \{x_0\} \Rightarrow f(x) \in ]L - \beta, L + \beta[$$

$$x \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x) \rightarrow L$$

این شکل حد راست را نشان می‌دهد




$$x \in ]x_0, x_0 + \alpha[ \Rightarrow f(x) \in ]L - \beta, L + \beta[$$

$$x \rightarrow x_0^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow L$$



این شکل حد چپ را نشان می‌دهد




$$x \in ]x_0 - \alpha, x_0[ \Rightarrow f(x) \in ]L - \beta, L + \beta[$$

$$x \rightarrow \bar{x}_0 \Rightarrow f(x) \rightarrow L$$

پیوستگی در حالت‌های سه‌گانه


این شکل پیوستگی را نشان می‌دهد



$$x \in ]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[ \Rightarrow f(x) \in ]f(x_0) - \beta, f(x_0) + \beta[$$

$$x \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x) \rightarrow f(x_0)$$


این شکل پیوستگی راست را نشان می‌دهد



$$x \in [x_0, x_0 + \alpha] \Rightarrow f(x) \in [f(x_0) - \beta, f(x_0) + \beta]$$

$$x \rightarrow x_0^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow f(x_0)$$

این شکل پیوستگی چپ را نشان می‌دهد



$$x \in [x_0 - \alpha, x_0] \Rightarrow f(x) \in [f(x_0) - \beta, f(x_0) + \beta]$$

$$x \rightarrow x_0^- \Rightarrow f(x) \rightarrow f(x_0)$$

۱۱۱ - پیوستگی : مسائل زیر را با مراجعه به تعریف شماره ۱-۲۲ ( بدون استفاده از بحث  $\epsilon$  ) حل کنید.

- ۱- ثابت کنید که تابع  $f: X \rightarrow \frac{x+3}{x-2}$  در نقطه  $x_0 = 1$  پیوسته است
- ۲- ثابت کنید که تابع  $f: X \rightarrow x^2 + 2x - 3$  در نقطه  $x_0 = 2$  پیوسته است
- ۳- ثابت کنید که تابع  $f: X \rightarrow \frac{2}{(x+1)^2}$  در نقطه  $x_0 = 0$  پیوسته است
- ۴- ثابت کنید که تابع  $f: X \rightarrow \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$  در نقطه  $x_0 = 2$  پیوسته است
- ۵- ثابت کنید که تابع  $f: X \rightarrow (x-1)(x+5)$  در نقطه  $x_0 = 1$  پیوسته است.
- ۶- ثابت کنید که تابع  $f: X \rightarrow \sqrt{1+x}$  در نقطه  $x_0 = 2$  پیوسته است
- ۷- تابع  $f$  به وسیله دستور زیر داده شده است:

$$f(x) = \begin{cases} |x-2| & \text{اگر } x \neq 2 \\ 1 & \text{اگر } x = 2 \end{cases}$$

ثابت کنید که تابع  $f$  در نقطه  $x_0 = 2$  ناپیوسته است. آیا در نقطه مزبور پیوستگی راست یا چپ دارد؟

۸- تابع  $f$  به وسیله دستور زیر داده شده است :

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & \text{اگر } x < 0 \\ x^2 & \text{اگر } x \geq 0 \end{cases}$$

ثابت کنید که تابع  $f$  در نقطه  $x_0 = 0$  ناپیوسته است. آیا در نقطه مزبور پیوستگی راست یا چپ دارد؟

۹- تابع  $f$  به وسیله دستور زیر داده شده است :

$$f(x) = \begin{cases} 2x+2 & \text{اگر } x > 1 \\ 2x-2 & \text{اگر } x < 1 \\ 0 & \text{اگر } x = 1 \end{cases}$$

ثابت کنید که این تابع در نقطه  $x_0 = 1$  ناپیوسته است. آیا در نقطه مزبور پیوستگی راست یا چپ دارد؟

۱۰- تابع  $f$  به وسیله دستور  $f(x) = 3x + \frac{|2x|}{x}$  و  $f(0) = 2$  داده شده است.

پیوستگی آنرا در نقطه  $x_0 = 0$  بررسی کرده و نمودار آنرا در صفحه محورهای قائم رسم کنید.

۱۱- همان سؤال مسئله ۱۰ برای تابع  $g$  با دستور:  $g(x) = 3x + \frac{|2x|}{|x|}$

۱۲- تابع  $f$  با دستور زیر داده شده است:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - \frac{\sqrt{(x-1)^2}}{x-1} & \text{اگر } x \neq 1 \\ 2 & \text{اگر } x = 1 \end{cases}$$

پیوستگی تابع را در نقطه  $x_0 = 1$  بررسی کرده و نمودار آن را در صفحه مختصات قائم رسم کنید.

۱۳- تابع  $f: x \rightarrow (-1)^{[x]}(x - [x])$  بزرگترین عدد درست کوچکتر یا مساوی  $x$  است مفروض است:

پیوستگی این تابع را در هر نقطه از دامنه تعریفش بررسی کنید و در فاصله  $[-3, 3]$  نمودار آن را رسم کنید.

۱۴- همان سؤال برای تابع:

$$f: x \rightarrow \frac{x}{1 + [x]}$$

۱۵- همان سؤال برای تابع:

$$f: x \rightarrow [x] + [-x]$$

ب- حد: مسائل زیر را با مراجعه به تعریف حد حل کنید.

۱۶- ثابت کنید که:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$

۱۷- ثابت کنید که:

حد  $\lim_{x \rightarrow 0} (x - 1 + |x - 2|) = 1$

۱۸- حد  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{|x| - 2}{x^2 - 4} = \frac{1}{4}$

۱۹- حد  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{|x - 1|} = 0$

پ - حد راست یا چپ: با استفاده از قضایای حد نشان دهید که:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 + 8}{|x + 2|} = 12 \quad -20$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2 + 8}{|x + 2|} = -12 \quad -21$$

ت - حدهای بینهایت: با استفاده از قضایای حد نشان دهید که:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = +\infty \quad -22$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2}{(x-1)^2} = -\infty \quad -23$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2} = 0 \quad -24$$


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1 \quad -25$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x-2} = +\infty \quad -26$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 + x^2} = +\infty \quad -27$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x}{-x-1} = +\infty \quad -28$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-4x+1}{x^2} = +\infty \quad -29$$

۲۹: 

۱-۲۵- تابع مرکب - فرض کنید  $f$  و  $g$  توابعی با دامنه‌های  $D_f$  و  $D_g$  و بردهای  $R_f$  و  $R_g$

باشند. منظور از ترکیب  $f \circ g$  که آن را با  $f \circ g$  (بخوانید  $f$  یا  $g$  یا  $f$  دایره  $g$ ) نشان می‌دهند تابعی است که دامنه آن:

$$D_{f \circ g} = \{ x \in D_g \mid g(x) \in D_f \}$$

و به صورت زیر تعریف شده است:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad \forall x \in D_{f \circ g}$$

تابع  $f \circ g$  را یک تابع مرکب یا تابع تابع نیز می‌نامند


مثال - تابع های  $f(x) = 2x - 1$  و  $g(x) = x^2 + 1$  داده شده اند  $f \circ g$  و  $g \circ f$  را تعیین کنید .

حل : میدانیم  $D_f = \mathbb{R}$  و  $D_g = \mathbb{R}$  پس  $D_{f \circ g} = \mathbb{R}$  و  $D_{g \circ f} = \mathbb{R}$  داریم :


$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = 2(x^2 + 1) - 1 = 2x^2 + 1$$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = (2x - 1)^2 + 1 = 4x^2 - 4x + 2$$

شکل های زیر در درک بیشتر مفهوم تابع تابع به ما کمک می کنند



$$x \xrightarrow{g} y \xrightarrow{f} z = f[g(x)] = (f \circ g)(x)$$



$$x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{g} z = g[f(x)] = (g \circ f)(x)$$

می توان ترکیب بیش از دو تابع را نیز در نظر گرفت

مثال : تابع های  $f(x) = 3x - 1$  و  $g(x) = 2x + 1$  و  $h(x) = 5x + 2$  داده شده اند .

مطلوب است تعیین تابع های مرکب :  $h \circ (g \circ f)$  و  $(h \circ g) \circ f$  . آیا این دو تابع مساوی اند ؟

حل - دامنه های همه توابع مجموعه  $\mathbb{R}$  است و داریم :

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = 2(3x - 1) + 1 = 6x - 1 = z(x)$$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h[z(x)] = 5(6x - 1) + 2 = 30x - 3$$

$$(h \circ g)(x) = h[g(x)] = 5(2x + 1) + 2 = 10x + 7 = z_1(x)$$

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (z_1 \circ f)(x) = z_1[f(x)] = 10(3x - 1) + 7 = 30x - 3$$

پس  $h \circ (g \circ f)$  و  $(h \circ g) \circ f$  با یکدیگر مساوی اند .

۱-۲۶- مشتق تابع مرکب- توابع مشتق پذیر  $f$  و  $g$  را در نظر می گیریم . می خواهیم

ثابت کنیم که تابع مرکب  $f \circ g$  مشتق پذیر است و مشتق آن را بدست آوریم .

برای رعایت اختصار فرض می‌کنیم

$$g(x) = y \text{ و } f(g(x)) = f(y) = z$$

ملاحظه می‌شود که تابع  $z$  در عین حال تابع  $x$  و تابع  $y$  است و ضمناً همانطور که در کتاب حساب وجیر سال سوم دیده‌اید هر تابع مشتق پذیر پیوسته است لذا  $g$  پیوسته بوده و  $\Delta y \rightarrow 0$  هر گاه  $\Delta x \rightarrow 0$  پس :

$$z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta z}{\Delta x} \right] = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left[ \frac{\Delta z}{\Delta y} \times \frac{\Delta y}{\Delta x} \right] = \left( \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta y} \right) \left( \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \right)$$

یعنی داریم :

$$z'_x = z'_y \times y'_x$$

به عبارت ساده‌تر:

$$[(f \circ g)(x)]'_x = f'(g(x)) \cdot g'(x) = f'_y \cdot g'_x$$

$$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$$

**مثال ۱-** توابع  $f$  و  $g$  در زیر داده شده‌اند مشتق تابع مرکب  $g \circ f$  را تعیین کنید و حاصل مشتق را به ازای  $x = 2$  بدست آورید.

$$f(x) = 2x - 5 \text{ و } g(x) = 2x^2 - 1$$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

$$f(x) = 2x - 5 = y \text{ و } f'(x) = 2$$

$$g(y) = 2y^2 + 1 \text{ و } g'_y = 4y$$

$$[(g \circ f)(x)]' = g'_y \cdot f'_x = 2 \times 4y = 8y = 8(2x - 5)$$

$$[(g \circ f)(x)]' = 8 : x = 2 \text{ به ازای}$$

**مثال ۲-** تابع  $y = f(x) = \sqrt{2x+1}$  و  $z = g(y) = \frac{y-1}{y}$  داده شده‌اند.

مشتق  $z$  را نسبت به  $x$  تعیین و به ازای  $x=0$  آنرا حساب کنید.

$$z = (g \circ f)(x)$$

$$z'_x = z'_y \times y'_x = g'_y \times f'_x \text{ و } y'_x = \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \text{ و } z'_y = \frac{1}{y^2}$$

$$z'_x = \frac{1}{y^2} \times \frac{1}{\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{(2x+1)\sqrt{2x+1}} \text{ و } z'(0) = 1$$

مثال ۳- تابع‌های  $f$  و  $g$  به ترتیب زیر داده شده‌اند :

$$f: x \mapsto -3x + 2 = f(x) \quad \text{و} \quad g: x \mapsto -x^2 + 1 = g(x)$$

الف- مشتق‌های تابعهای  $z = (g \circ f)(x)$  و  $T = (f \circ g)(x)$  را تعیین و به ازاء  $x = 1$  مقدار هر یک را حساب کنید.

ب- تابعهای مرکب  $z = (g \circ f)(x)$  و  $T = (f \circ g)(x)$  را تعیین و با تعیین مشتق هر کدام درستی فرض الف را که حل کرده‌اید امتحان کنید.

حل: الف

$$z = (g \circ f)(x) \quad \text{و} \quad z'_x = g'_y \times f'_x$$

$$y = f(x) = -3x + 2 \quad \text{و} \quad f'_x = -3$$

$$g(y) = -y^2 + 1 \quad \text{و} \quad g'_y = -2y$$

$$z'_x = -2y \times -3 = 6y$$

پس داریم:

$$z'_x = 6(-3x + 2) = -18x + 12 \quad \text{و} \quad z'(1) = -6$$

$$T = (f \circ g)(x) \quad \text{و} \quad T'_x = f'_y \cdot g'_x$$

$$f(y) = -2y + 2 \quad \text{و} \quad f'_y = -2$$

$$g(x) = -x^2 + 1 \quad \text{و} \quad g'_x = -2x$$

$$T'_x = -2 \times -2x = 4x \quad \text{و} \quad T'(1) = 4$$

حل: ب

$$z = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = -(-3x + 2)^2 + 1 = -9x^2 + 12x - 3$$

$$z' = -18x + 12 \quad \text{و} \quad z'(1) = -6$$

$$T = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = -2(-x^2 + 1) + 2 = 2x^2 - 1$$

$$T' = 4x \quad \text{و} \quad T'(1) = 4$$

تمرین

۱- دو تابع  $f$  و  $g$  به ترتیب زیر تعریف شده‌اند :

$$f(x) = \frac{1}{4x - 3} \quad \text{و} \quad g(x) = 3x^2 - 4$$

الف: هر یک از تابعهای مرکب  $f \circ g$  و  $g \circ f$  را تعیین کنید

ب: مشتق آنها را هم مستقیماً و هم با استفاده از فرض الف تعیین کنید.

۲- تابع‌های  $f$  و  $g$  به صورت زیر داده شده‌اند :

$$f(x) = \sin x + \cos x \quad \text{و} \quad g(x) = x^2 - x$$



مشتق هریک از تابع‌های مرکب  $f \circ g$  و  $g \circ f$  را تعیین کنید.

۳- به فرض اینکه تابع  $f$  مشتق داشته باشد، مشتق اول و دوم هریک از تابعهای  $f(x^2)$  و

$$f(x^2) \text{ و } f\left(\frac{1}{x}\right) \text{ را حساب کنید.}$$

$$۴- \text{ توابع } f(t) = \sqrt{2t^2 + 1} \text{ و } g(t) = t^3 + 1 \text{ داده شده‌اند}$$

مطلوبست تعیین تابعهای مرکب  $f \circ g$  و  $g \circ f$  و سپس مشتق هریک از آنها را به ازای

$$t = 1 \text{ حساب کنید.}$$

۵- تابعهای  $f$  و  $g$  به صورت زیر تعریف شده‌اند:

$$f: x \mapsto f(x) = \frac{x}{1 + |x|} = y$$

$$g: y \mapsto g(y) = \frac{y}{1 - |y|} = z$$

الف- دامنه تعریف و برد هریک از دو تابع را بدست آورید

ب- تابع مرکب  $h = g \circ f$  را تعیین کنید.

ج- مشتق تابع  $h = g \circ f$  را بدست آورید.

$$۶- \text{ دو تابع } f(x) = -3x + 2 \text{ و } g(y) = -2y^2 + y \text{ داده شده‌اند.}$$

مطلوبست تابعهای مرکب  $f \circ g$  و  $g \circ f$  و محاسبه مشتق هریک

۷- توابع زیر مفروض‌اند:

$$f(x) = \frac{2x}{x+1} \text{ و } g(x) = x+2 \text{ و } h(x) = 4x-1$$

مطلوبست تعیین تابعهای مرکب  $z_1 = [(g \circ f) \circ h](x)$  و  $z_2 = [g \circ (f \circ h)](x)$

تحقیق اینکه  $z_1 = z_2$  است.

۸- دو تابع  $T$  و  $h$  به صورت‌های زیر داده شده‌اند

$$T(x) = 4x - \frac{\pi}{3} \text{ و } h(x) = \sin 2x + \cos 2x + 1$$

الف- مطلوبست تعیین تابعهای مرکب  $T \circ h$  و  $h \circ T$

ب- مشتق هریک از این دو تابع مرکب را تعیین و حاصل هریک را به ازای  $x = \frac{\pi}{12}$  رادیان

تعیین کنید.

## تابع ضمنی

۱-۲۷- تعریف: رابطه  $f(x, y) = 0$  را در نظر می‌گیریم. در برخی از موارد نمی‌توان

از این تساوی  $y$  را صریحاً بر حسب  $x$  بیان نمود ولی امکان دارد یک یا چند تابع به صورت  $y = g(x)$  موجود باشند به قسمی که تساوی  $f(x, g(x)) = 0$  به ازای تمام  $x$  های واقع در دامنه  $g$  برقرار باشد. در این صورت می‌گویند که تابع  $g$  بطور ضمنی بوسیله رابطه  $f(x, y) = 0$  تعریف شده و یا بطور خلاصه  $y$  تابعی ضمنی از  $x$  است که ضمن رابطه  $f(x, y) = 0$  بیان شده است.

مثال - روابط زیر را در نظر می‌گیریم:

$$2y - 3x + 2 = 0$$

$$xy - 2y + x - 3 = 0$$

$$y^2 - x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$$

سه رابطه اول هر کدام یک تابع ضمنی از  $x$  ولی رابطه چهارم دو تابع ضمنی از  $x$  ( هر

تابع یک نیمه‌دایره ) را تعریف می‌کنند

۱-۲۸- مشتق تابع ضمنی - برای محاسبه مشتق تابعهای ضمنی ای که به صورت  $f(x, y) = 0$

تعریف شده‌اند ضرورتی به حل معادله و تعیین تابع  $y = F(x)$  نیست. زیرا علاوه بر آنکه راه محاسبه طولانی‌تر است، در بعضی موارد امکان پیدا کردن  $y$  نیز نیست. بنا بر این برای تعیین  $y'$  مشتق تابع به یکی از دو روش زیر عمل می‌کنیم:

روش اول- در این روش از طرفین معادله  $f(x, y) = 0$  جمله به جمله با رعایت دستورهای

مشتق وقواعد مشتق گیری توابع مرکب که قبلاً دیده‌اید مشتق می‌گیریم و از معادله حاصل  $y'$  را تعیین می‌کنیم.

مثال ۱- مشتق تابع ضمنی تعریف شده بوسیله رابطه  $2y - 3x + 2 = 0$  را تعیین کنید.

حل:

$$2y' - 3 = 0 \quad \text{و از آنجا} \quad y' = \frac{3}{2}$$

مثال ۲- مشتق تابعی را که بوسیله رابطه  $xy - 2y + x - 3 = 0$  داده شده است

تعیین کنید:

حل:

$$y + y'x - 2y' + 1 = 0$$

$$y'(x - 2) + y + 1 = 0 \implies y' = -\frac{y + 1}{x - 2}$$

دوش دوم - فرض کنید  $f'_x(x, y)$  و  $f'_y(x, y)$  به ترتیب مشتقات عبارت  $f(x, y)$  نسبت به  $x$  (بافرض آنکه  $y$  مقداری ثابت است) و نسبت به  $y$  (بافرض آنکه  $x$  مقداری ثابت باشد) باشند. ثابت می‌کنند که مشتق (نسبت به  $x$ ) تابع ضمنی  $y$  که توسط رابطه  $f(x, y) = 0$  مشخص شده است به صورت

$$(1) \quad y'_x = -\frac{f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)} \quad \text{و} \quad f'_y(x, y) \neq 0$$

همینطور اگر  $x$  تابعی ضمنی از  $y$  باشد که ضمن رابطه  $f(x, y) = 0$  تعریف شده باشد مشتق  $x$  نسبت به  $y$  را می‌توان به صورت زیر محاسبه کرد

$$(2) \quad x'_y = -\frac{f'_y(x, y)}{f'_x(x, y)} \quad \text{و} \quad f'_x(x, y) \neq 0$$

اگر هر دوی  $f'_x(x, y)$  و  $f'_y(x, y)$  مخالف صفر باشند آنوقت از روابط (1) و (2) دیده میشود که:

$$y'_x \cdot x'_y = 1$$

مثال 3 - مشتق تابع ضمنی  $y$  را که بوسیله رابطه  $y^2 - x^2 + 3x - 2 = 0$  تعریف شده است تعیین کنید ( $x$  مطابق معمول متغیر مستقل است)

حل با روش اول - جمله به جمله مشتق می‌گیریم، با توجه به اینکه  $y$  تابع  $x$  است:

$$2y^2 y' - 2x^2 + 3 = 0$$

$$y' = \frac{x^2 - 1}{y^2} \quad \text{و از آنجا:}$$

روش دوم: یکدفعه  $x$  را متغیر و  $y$  را ثابت و دفعه دیگر  $y$  را متغیر و  $x$  را ثابت می‌گیریم:

$$f'_x = -2x^2 + 3$$

$$f'_y = 2y^2$$

$$y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y} = -\frac{-2x^2 + 3}{2y^2} \Rightarrow y' = \frac{x^2 - 1}{y^2}$$

مثال 4 - مشتق تابع ضمنی  $y$  را که بوسیله دستور زیر داده شده است تعیین کنید:

$$x^2 - xy + 2x - 2y - 8 = 0$$

روش اول: جمله به جمله مشتق می‌گیریم:

$$2x - (y + y'_x) + 2 - 2y' = 0$$

$$-y'(x + 2) = -2x + y - 2 \Rightarrow y' = \frac{2x - y + 2}{x + 2}$$

روش دوم:  $y$  را ثابت و  $x$  را متغیر می‌گیریم:

$$f'_x = 2x - y + 2$$

$x$  را ثابت و  $y$  را متغیر می‌گیریم:

$$f'_y = -x - 2$$

$$y' = -\frac{2x - y + 2}{-x - 2} \Rightarrow y' = \frac{2x - y + 2}{x + 2}$$

مثال ۵-  $y$  تابع ضمنی از  $x$  است که به صورت  $x^2y - 2y - 3x + 5 = 0$  داده شده است. از نقطه  $A$  به طول ۱ واقع بر منحنی نمایش آن مماسی بر منحنی رسم شده است. معادله خط مماس را بنویسید:

حل- چون طول  $A$  برابر ۱ است در معادله قرار می‌دهیم تا عرض آن ۲ بدست آید چون ضریب زاویه‌ای مماس برابر مشتق به ازای مختصات آن نقطه است، مشتق را از یکی از دو راه به دلخواه تعیین می‌کنیم:

$$2xy + y'x^2 - 2y' - 3 = 0$$

$$y'(x^2 - 2) = -2xy + 3 \quad \text{یا} \quad y' = \frac{-2xy + 3}{x^2 - 2}$$

در مشتق به جای  $x$  مقدار ۱ و به جای  $y$  عدد ۲ قرار می‌دهیم:

$$m = \frac{-2 \times 2 + 3}{1 - 2} = 1$$

معادله مماس:

$$y - 2 = 1(x - 1) \Rightarrow y = x + 1$$

## تمرین

مشتق اول  $y'$  و مشتق دوم  $y''$  هر یک از تابعهای ضمنی زیر را تعیین کنید (به یکی از دوراه

به دلخواه)

(۱)  $x^2 + y^2 = R^2$

(۲)  $x^2 - y^2 = a^2$

(۳)  $x^2y = a^2$

(۴)  $xy - y^2 - 6 = 0$

(۵)  $x^2 + y^2 + xy = 2$

(۶)  $y^2 + 2y - x^2 = 0$

(۷)  $x^2 - y^2 = 1$

(۸)  $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$

$y'$  را برای هر يك از تابعهای ضمنی زیر در نقاط داده شده تعیین کنید

$$(9) \quad x^2 + 2y^2 - xy - 5 = 0 \quad (-1, 1)$$

$$(10) \quad x + x^2 y^2 + y - 3 = 0 \quad (1, -2)$$

$$(11) \quad x^2 - y^2 = 16 \quad (5, -3)$$

۱۲- در نقطه‌ای به عرض ۱ از منحنی نمایش  $y^2 - x^2 = 9$  خطی بر منحنی مماس شده است. معادله خط مماس را بنویسید.

۱۳- در نقطه  $A(-1, -1)$  از منحنی نمایش  $y^2 x^2 + x - y - 1 = 0$  خطی قائم بر منحنی رسم شده است. معادله این خط قائم را بنویسید.

۱۴- تابع ضمنی  $y$  به صورت زیر داده شده است. تحقیق کنید خط مماس بر منحنی نمایش این تابع در نقطه برخورد آن با محور  $y$ ها به صورت  $y = x - 1$  می‌باشد.

$$y \cos x + x \sin x + 2y - 3 \sin x + 3 = 0$$

۱۵- تابع ضمنی  $\frac{2}{x^3} + \frac{2}{y^3} = a^{\frac{2}{3}}$  مفروض است از نقطه  $A$  واقع بر منحنی با طول عرض برابر واقع در ربع اول خطی بر منحنی مماس شده است. معادله خط مماس را بنویسید.  
( $a$  مقدار معلومی است)

۱-۲۹- تابع معکوس - فرض کنید که  $f$  تابعی يك به يك با دامنه  $D_f$  و برد  $R_f$  باشد در اینصورت  $f$  زیر مجموعه‌ایست از  $D_f \times R_f$  به طوری که اولاً به ازای هر  $x \in D_f$  تنها يك  $y \in R_f$  موجود است به قسمی که  $(x, y) \in f$  و ثانیاً به ازای هر  $y \in R_f$  تنها يك  $x \in D_f$  موجود است به قسمی که  $(x, y) \in f$ . حال اگر

$$g = \{(y, x) \mid (x, y) \in f\} \subseteq R_f \times D_f$$

آنگاه بنا به قسمت ثانیاً فوق  $g$  يك تابع است و دامنه تعریف  $g$  برد  $f$  و برد  $g$  دامنه تعریف  $f$  است یعنی:

$$D_g = R_f \text{ و } R_g = D_f$$

تابع  $g$  را تابع معکوس  $f$  می‌خوانند و معمولاً آن را با  $f^{-1}$  نشان میدهند.  
بنابراین داریم:

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$$

توجه کنید که اگر  $g$  معکوس  $f$  باشد، آنگاه  $f$  نیز معکوس  $g$  خواهد بود. پس:

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

فرض کنید که  $I_S$  تابع همانی روی مجموعه  $S$  باشد یعنی

$$I_S(x) = x \quad \forall x \in S$$



$$f \circ f^{-1} = I_{D_f} \quad \text{و} \quad f \circ f^{-1} = I_{R_f} \quad \text{به آسانی می توان دید که}$$

در حقیقت اگر  $y = f(x)$  آنگاه  $x = f^{-1}(y)$  و از آنجا

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y = I_{R_f}(y) \quad \forall y \in R_f$$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x = I_{D_f}(x) \quad \forall x \in D_f$$

مثال ۱ - هرگاه تابع  $y = f(x)$  در فاصله  $[a, b]$  معین و پیوسته و یکنوا یعنی در فاصله مذکور فقط صعودی یا فقط نزولی باشد، آنگاه  $f$  یک به یک بوده و به ازای هر مقدار از  $x$  در فاصله  $[a, b]$  مانند  $x$  یک مقدار  $y$  برای  $y$  در فاصله  $[f(a), f(b)]$  یا  $[f(b), f(a)]$  (بر حسب آنکه  $f$  صعودی باشد یا نزولی) بدست می آید، و همچنین به ازای هر مقدار  $y$  در فاصله  $[f(a), f(b)]$  یا  $[f(b), f(a)]$  (بر حسب آنکه  $f$  صعودی باشد یا نزولی) یک مقدار و فقط یک مقدار برای  $x$  مانند  $x$  در فاصله  $[a, b]$  بدست می آید. به عبارت دیگر دارای معکوس با دامنه  $[f(a), f(b)]$  یا  $[f(b), f(a)]$  (بر حسب آنکه  $f$  صعودی باشد یا نزولی) و برد  $[a, b]$  است. این یکی از حالاتی است که زیاد با آن سروکار خواهیم داشت. شکلهای زیر بحث فوق را مجسم می کنند.




مثال ۲ - تابع  $y = 2x - 4$  (۱) مفروض است. می دانیم تابع به ازای جميع مقادیر  $x$  از

$-\infty$  تا  $+\infty$  معین و پیوسته و صعودی است. بنابراین به ازای هر مقدار  $y$  از  $y$  می توان

يك مقدار  $x_0$  و فقط يك مقدار برای  $x$  پیدا کرد به قسمی که  $y_0 = 2x_0$ . بنابراین  $x$  تابعی است از  $y$  و خواهیم داشت  $x_0 = \frac{1}{2}y_0 + 2$ . تابع  $x = \frac{1}{2}y + 2$  را که در آن  $y$  متغیر مستقل و  $x$  متغیر تابع می باشد، معکوس تابع (۱) می گویند. هرگاه مطابق معمول متغیر مستقل را به

$x$  و متغیر تابع را به  $y$  نشان دهیم معکوس تابع (۱) چنین خواهد بود:  $y = \frac{1}{2}x + 2$

تصوره - همانطور که در بالا گفته شد. هرگاه جفت مرتب  $(x_1, y_1)$  متعلق به  $f$  باشد (یعنی نقطه به مختصات  $(x_1, y_1)$  به نمودار  $f$  متعلق باشد) آنگاه جفت مرتب  $(y_1, x_1)$  به تابع  $f^{-1}$  متعلق است (یعنی نقطه به مختصات  $(y_1, x_1)$  بر نمودار  $f^{-1}$  واقع است) بنابراین هرگاه منحنی نمایش دو تابع را که معکوس یکدیگرند در یک دستگاه مختصات عمود برهم رسم کنیم نسبت به نیمساز ربع اول و سوم محورها قرینه اند.



۱ - ۳۰ - نکات قابل توجه - برای تعیین معکوس يك تابع به نکته های ذیل توجه

داشته باشید.

الف : معکوس تابعی که يك به يك نباشد تعریف نشده است.

ب : برای پیدا کردن دستور  $f^{-1}$  ( معکوس تابع  $f$  ) در دستور  $y = f(x)$  مقدار  $x$  را

بر حسب  $y$  تعیین کنید تا  $x = g(y)$  بدست آید، و چون در تابع اخیر  $y$  متغیر مستقل و  $x$  متغیر

تابع است مطابق معمول متغیر مستقل را به  $x$  و متغیر تابع را  $y$  نمایش می دهیم جای  $x$  و  $y$  را

عوض می‌کنیم بنابراین تابع معکوس را به صورت  $y = g(x)$  می‌نویسیم ، پس

$$f^{-1}(x) = g(x)$$


ج : در دو تابع  $y = f(x)$  و  $y = g(x)$  که معکوس یکدیگرند دامنهٔ تعریف یکی برد دیگری است و بالعکس .

مثال ۱ - تابع  $y = f(x) = -3x + 6$  مفروض است . تابع  $f^{-1}$  را تعیین و نمودار هر دو را در يك دستگاه محورهای مختصات رسم کنید .

حل : چون تابع  $f$  با دستور  $y = -3x + 6$  به ازای جميع مقادیر  $x$  نزولی است پس

يك به يك بوده و معکوس دارد. داریم :  $x = -\frac{y}{3} + 2$  (  $y$  متغیر مستقل و  $x$  متغیر تابع است).

پس می‌نویسیم :  $y = f^{-1}(x) = -\frac{x}{3} + 2$  که تابع معکوس  $f$  است .



نمودارهای دو تابع مطابق با شکل است که روی آنها دو نقطه  $A(0, 6)$  و  $B(2, 0)$  از تابع اول و متناظر آنها دو نقطه  $A'(6, 0)$  و  $B'(0, 2)$  از تابع دوم نموده شده است.

مثال ۲ - تابع  $y = f(x) = 2x - 2$  مفروض است . هرگاه  $x$  در فاصله  $[0, 3]$  تغییر کند :

الف : تابع معکوس تابع  $f$  را تعیین و دامنهٔ تعریف و برد آنرا بدست آورید .

ب : نمودار دو تابع را در يك دستگاه مختصات رسم کنید :




حل:  $f$  تابعی است صعودی و پیوسته و چون  $D_f = [0, 3]$  پس داریم:

$$R_f = [f(0) \text{ و } f(3)] = [-2 \text{ و } 2]$$

با اندکی محاسبه معلوم میشود که  $y = f^{-1}(x) = \frac{x}{4} + 2$  معکوس تابع  $f$  است و داریم:

$$D_{f^{-1}} = R_f = [-2 \text{ و } 2] \text{ و } R_{f^{-1}} = D_f = [0 \text{ و } 3]$$

در نمودار زیر دو نقطه  $A(0, -2)$  و  $B(3, 2)$  از خط اول و دو نقطه متناظر آنها  $A'(-2, 0)$  و  $B'(2, 3)$  از خط دوم اختیار شده‌اند.



مثال ۳ - تابع  $f$  به صورت  $y = x^2$  برای  $x$  در فاصله  $[0, 2]$  تعریف شده است.

تابع  $f^{-1}$  را تعیین و نمودار دو تابع را در یک دستگاه محورهای مختصات رسم کنید.

حل: مشتق تابع مفروض  $y' = 2x$  به ازای  $x > 0$  مثبت است پس تابع در فاصله مذکور


صعودی است بنابراین معکوس دارد و از آنجائیکه تابع در این فاصله پیوسته نیز می‌باشد پس

برد آن فاصله  $[0, 4]$  و دامنه و برد تابع معکوس آن به ترتیب  $[0, 2]$  و  $[0, 4]$  می‌باشد. برای

بلست آوردن تابع معکوس،  $x$  را بر حسب  $y$  حل می‌کنیم خواهیم داشت:

$$x = \sqrt{y} \text{ و } y \in [0, 4]$$

و یا با تعویض  $x$  و  $y$  داریم:  $y = f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  و  $x \in [0, 4]$



$O(0,0)$  و  $A(1,1)$  و  $B(2,4)$  سه نقطه از نمودار  $f$

$O(0,0)$  و  $A(1,1)$  و  $B'(4,2)$  سه نقطه از نمودار  $f^{-1}$

۱-۳۱- مشتق تابع معکوس - فرض کنید که تابع  $f$  در فاصله باز  $[a, b]$  دارای مشتق

مثبت باشد. بنا به آنچه که در کتاب حساب و جبر سال سوم دیدیم  $f$  در فاصله  $[a, b]$  صعودی است و در نتیجه یک به یک می باشد. از این روی  $f$  در این فاصله دارای معکوس است. فرض کنید  $g$  تابع معکوس  $f$  باشد ثابت می کنند که  $g$  نیز در فاصله  $[f(a), f(b)]$  مشتق پذیر است. با قبول این مطلب می خواهیم مشتق  $g$  را در نقطه ای مانند  $f(a)$  و  $f(b)$  بدست آوریم. دیده ایم که:

$$(1) \quad f(g(y)) = y \quad \forall y \in [f(a), f(b)]$$

اگر از طرفین رابطه (۱) نسبت به  $y$  مشتق بگیریم و دستور مشتق تابع تابع را بکار ببریم

خواهیم داشت:

$$f'(g(y)) \cdot g'(y) = 1 \quad \forall y \in [f(a), f(b)]$$

و یا با فرض  $x = g(y)$  (یا  $y = f(x)$ ) داریم:

$$(2) \quad \boxed{g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))} = \frac{1}{f'(x)}}$$

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

اگر نماد  $\frac{dy}{dx}$  را برای مشتق  $y$  نسبت به  $x$  (یعنی  $f'(x)$ ) و نماد  $\frac{dx}{dy}$  را برای مشتق

$x$  نسبت به  $y$  (یعنی  $g'(y)$ ) به کار ببریم رابطه (۲) را می توان به صورت ساده زیر نوشت:

$$(3) \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

رابطه (۳) بیان می کند که مشتق تابع معکوس برابر معکوس مشتق تابع اول است

لبصره- در مطالب فوق فرض کرده بودیم که مشتق  $f$  مثبت باشد.

در حالتی که مشتق  $f$  در  $[a, b]$  منفی باشد نیز نتیجه فوق درست است و دستورهایی (۲) و (۳) صادق اند. اگر  $f$  در فاصله  $[a, b]$  یکنوا و مشتق پذیر باشد آنگاه طبق آنچه در کتاب حساب و جبر سال سوم دیده اید  $f'(x)$  یا همواره غیر منفی و یا همواره غیر مثبت است. در این حالت نیز دستورهایی (۲) و (۳) در هر نقطه که مشتق  $f$  مخالف صفر باشد صادق هستند. باز بودن فاصله  $[a, b]$  هیچ نقشی در صحت مطالب فوق ندارد، به عبارت دیگر می توان فاصله مورد بحث را فاصله بسته یا نیم بسته و یا بی پایان اختیار کرد.

مثال ۱- تابع  $f(x) = x^2 + 1$  با شرط  $x \geq 0$  مفروض است. تابع معکوس  $f$  را نوشته

و صحت تساوی  $(f^{-1})' = \frac{1}{f'}$  را در نقاطی که  $f'(x) \neq 0$  تحقیق کنید.

حل - دستور تابع  $f^{-1}$  از روی دستور  $f$  چنین است  $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$  دامنه تعریف  $f$  برد  $f$  یعنی فاصله های  $[0, \infty)$  و  $[1, \infty)$  به ترتیب برد و دامنه تعریف  $f^{-1}$  خواهند بود از هر دو تابع مشتق میگیریم.

$$f(x) = x^2 + 1 \Rightarrow f'_x = 2x$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \Rightarrow (f^{-1}(x))' = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \Rightarrow$$

$$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{2\sqrt{y-1}} = \frac{1}{2\sqrt{(x^2+1)-1}} = \frac{1}{2|x|} = \frac{1}{2x} = \frac{1}{f'(x)} \text{ و } x > 0$$

یعنی :

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'} \text{ یا } f' \cdot (f^{-1})' = 1 \text{ و } x > 0$$

مثال ۲ - تابع  $y = x^2$  مفروض است .

الف: از نقطه  $B$  به طول ۲ واقع بر منحنی  $(C)$  نمایش تابع فوق خطی بر منحنی مماس شده است. معادله خط مماس را بنویسید.

ب: از نقطه  $B'$  متناظر نقطه  $B$  روی منحنی  $(C')$  نمایش تابع معکوس تابع فوق خطی بر منحنی  $(C')$  مماس شده است. معادله مماس را بنویسید.

ج: معادله تابع معکوس تابع فوق را تعیین و نمودار دو منحنی را در فاصله  $[0, 2]$  (دامنه تابع اول) رسم کنید:

حل الف: داریم  $B(2, 8)$  چون  $y' = 2x$  پس ضریب زاویه ای مماس بر منحنی  $(C)$  در  $B$  خواهد بود.

$$m = y'_B = 4$$

پس معادله مماس در  $B$  خواهد بود:

$$y - 8 = 4(x - 2) \text{ یا } y = 4x - 0$$

$$\text{ب: داریم } B'(2, 8) \text{ و همچنین } y'_B = \frac{1}{y'_B} = \frac{1}{4} \text{ یا } m = \frac{1}{4} \text{ مماس در } B'$$


پس معادله مماس در  $B'$  بر منحنی تابع معکوس که قرینه مماس اولی نسبت به نیمساز

$$\text{ربع اول می باشد چنین است: } y - 8 = \frac{1}{4}(x - 2) \text{ یا } y = \frac{1}{4}x + \frac{31}{4}$$

ج:  $y' = 3x^2$  بنابراین  $y' \geq 0$  یعنی تابع فوق به ازای جميع مقادير  $x$  صعودی است  
 بنابراین معکوس دارد و معادله تابع معکوس خواهد بود:  $x = \sqrt[3]{y}$  متغیر مستقل و  $x$  متغیر  
 تابع ( پس):  $y = \sqrt[3]{x}$

در شکل زیر منحنی هر دو تابع را در يك دستگاه مختصات رسم کرده ایم.

$$y = x^2, 0 < x < 2 \text{ و } 0 < y < 4$$



سه نقطه از منحنی  $f$ :  $O(0,0)$  و  $A(1,1)$  و  $B(2,4)$

سه نقطه از منحنی  $f^{-1}$ :  $O(0,0)$  و  $A(1,1)$  و  $B'(8,2)$

دو منحنی نسبت به نیمساز ربع اول قرینه اند

مثال ۳ - تابع  $f$  به صورت زیر داده شده است:

$$y = f(x) = \text{Arcsin } x, -1 \leq x \leq 1 \text{ و } -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

الف - مشتق تابع فوق را به کمک مشتق تابع معکوس و همچنین به وسیله مشتق تابع ضمنی تعیین کنید.

ب- معادله تابع معکوس را بنویسید و دو منحنی را در يك دستگاه مختصات رسم کنید.

حل- الف:

تابع داده شده در فاصله  $[-1, 1]$  پیوسته و صعودی است پس معکوس دارد و تابع معکوس

آن  $x = \sin y$  است که در آن  $y$  متغیر مستقل و  $x$  متغیر تابع است یعنی:

$$x = \sin y, -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \text{ و } -1 < x < 1$$

می دانیم  $y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{\cos y}$  با فرض  $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ ، چون  $\cos y$  مثبت است بنابراین:

$$\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$$

و در نتیجه:  $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  یعنی:

$$\begin{cases} y = \text{Arcsin} x \\ y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{و} \quad x \neq \pm 1 \end{cases}$$


به کمک مشتق تابع ضمنی نیز می توان  $y'$  را بدست آورد:

$$y = \text{Arcsin} x \Rightarrow \sin y = x$$

از دو طرف با توجه به اینکه  $y$  تابع  $x$  متغیر است مشتق می گیریم:

$$y' \cos y = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos y} \quad \text{و} \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{و} \quad x \neq \pm 1$$



دستور  $f$ :

$$y = \text{Arcsin } x, \quad -1 < x < 1 \quad \text{و} \quad \frac{-\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

دستور  $f^{-1}$ :

$$y = \sin x, \quad \frac{-\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{و} \quad -1 < y < 1$$

سه نقطه از تابع اول:

$$A\left(-1, \frac{-\pi}{2}\right) \quad \text{و} \quad O(0, 0) \quad \text{و} \quad B\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$$

نقطه‌های متناظر از تابع دوم:

$$A'\left(-\frac{\pi}{2}, -1\right) \quad \text{و} \quad O(0, 0) \quad \text{و} \quad B'\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$$

منحنی  $AOB$  نمودار  $y = \text{Arcsin } x$

منحنی  $A'O'B'$  نمودار  $y = \sin x$

دو منحنی نسبت به نیمساز ربع اول و سوم قرینه و در مبدأ مختصات برهم مماس و مماس مشترکشان نیمساز ربع اول و سوم است.

مثال ۴- مشتق تابع  $y = \text{Arccos } x$  را به کمک تابع معکوس و همچنین تابع ضمنی تعیین و منحنی نمایش دو تابع را در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

حل: تابع داده شده در فاصله  $[-1, 1]$  پیوسته و همواره نزولی است:

$$y = \text{Arccos } x, \quad -1 < x < 1 \quad \text{و} \quad 0 < y < \pi$$

پس تابع معکوس دارد:

$$x = \cos y, \quad 0 < y < \pi \quad \text{و} \quad -1 < x < 1$$

می‌دانیم  $y' = \frac{1}{x'}$  و چون  $x' = -\sin y$  و  $0 < y < \pi$  است پس  $\sin y > 0$  و داریم:

$$\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$$

بنابراین:

$$y = \text{Arccos } x$$

$$y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad -1 < x < 1$$

راه دیگر برای محاسبه مشتق: می‌دانیم

$$\frac{\pi}{2} = \text{Arcsin } x + \text{Arccos } x$$

$$0 = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + (\text{Arccos } x)' \quad \text{اگر از دو طرف مشتق بگیریم:}$$

$$y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad -1 < x < 1 \quad \text{یا}$$

تعیین مشتق با استفاده از تابع ضمنی: می‌دانیم که  $\cos y = x$  که  $y$  تابع  $x$  متغیر مستقل است از دو طرف مشتق می‌گیریم:


$$\sin y = \sqrt{1-x^2} \quad \text{یا} \quad \sin y = \sqrt{1-\cos^2 y} \quad \text{و چون} \quad -y' \sin y = 1$$

$$y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad -1 < x < 1 \quad \text{پس:}$$

رسم دو منحنی در یک دستگاه:

دستور  $f: y \in [0, \pi]$  و  $x \in [-1, 1]$  ،  $y = \text{Arccos } x$

دستور  $f^{-1}: y \in [-1, 1]$  و  $x \in [0, \pi]$  ،  $y = \cos x$



سه نقطه از نمودار  $f$ :  $A(-1, \pi)$  و  $B(0, \frac{\pi}{2})$  و  $C(1, 0)$

سه نقطه متناظر از نمودار  $f^{-1}$ :  $A'(\pi, -1)$  و  $B'(\frac{\pi}{2}, 0)$  و  $C'(0, 1)$

نمودارهای دو تابع، یعنی منحنیهای  $ABC$  و  $A'B'C'$  نسبت به نیمساز ربع اول و سوم قرینه‌اند. مماسهای بر نمودار  $f$  در نقاط  $A$  و  $C$  بر محور  $x'x$  عمودند و مماسهای بر نمودار  $f^{-1}$  در نقاط  $A'$  و  $C'$  با محور  $x'x$  موازیند.

مثال ۵ - تابع  $f$  به صورت زیر داده شده است:

$$y = \operatorname{Arctg} x \quad \text{و} \quad -\frac{\pi}{4} < y < \frac{\pi}{4}$$

مشتق تابع را با استفاده از تابع معکوس آن تعیین کنید.

حل - وقتی  $x$  از  $-\infty$  تا  $+\infty$  تغییر کند  $y$  از  $-\frac{\pi}{4}$  تا  $\frac{\pi}{4}$  تغییر می‌کند و تابع همواره معین و صعودی است پس معکوس دارد و معکوس آن  $x = \operatorname{tg} y$  است که در آن  $y$  متغیر مستقل و  $x$  متغیر

$$x' = 1 + \operatorname{tg}^2 y = 1 + x^2 \Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{اما} \quad y' = \frac{1}{x}$$

$$\begin{cases} y = \operatorname{Arctg} x & \text{یا} & y = \operatorname{tg}^{-1} x \\ y' = \frac{1}{1+x^2} \end{cases}$$

مثال ۶ - تابع  $f$  به صورت زیر داده شده است:

$$y = \operatorname{Arccotg} x, \quad 0 < y < \pi$$

مشتق آنرا با استفاده از تابع معکوس آن بدست آورید.

حل: وقتی که  $x$  از  $-\infty$  تا  $+\infty$  تغییر کند  $y$  از  $\pi$  تا صفر نزول می‌کند و تابع همواره معین و پیوسته و نزولی است پس معکوس دارد و تابع معکوس آن  $x = \operatorname{cotg} y$  است ( $y$  متغیر مستقل). می‌دانیم  $y' = \frac{1}{x}$  اما:

$$x' = -(1 + \operatorname{cotg}^2 y) = -(1 + x^2)$$

بنابراین:

$$\begin{cases} y = \operatorname{Arccotg} x \\ y' = \frac{-1}{1+x^2} \end{cases}$$

راه دیگر:  $\operatorname{Arctg} x + \operatorname{Arccotg} x = \frac{\pi}{4}$  بنابراین:

$$\frac{1}{1+x^2} + [\operatorname{Arccotg} x]' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{1}{1+x^2}$$



تابع‌های معکوس تابع‌های با ضابطه داده شده در زیر را تعیین کنید.

۱)  $y = 3x + 5$

۲)  $y = -5x + 1$

۳)  $y = \frac{2x+1}{x-2}$

۴)  $y = \frac{1}{x}$

۵)  $y = |x+1|$  و  $x \leq -1$     ۶)  $y = \frac{ax+b}{a'x+b'}$  و  $ab' - ba' \neq 0$

۷)  $y = 3x + |x|$   $x > 0$     ۸)  $y = |x| - 2$  و  $x < -1$

۹)  $x^2 + y^2 = 4$ ،  $x > 0$  و  $y > 0$     ۱۰)  $y = x^2 - 2x$ ،  $x > 1$

۱۱) دامنه تعریف و برد تابع  $4x^2 + y^2 = 16$ ،  $y < 0$  و  $x < 0$

را بدست آورده و تابع معکوس آنرا تعیین کنید.

تابعهای زیر داده شده‌اند. مشتق آنها را تعیین کنید.

۱۲)  $y = \text{Arcsin } 2x$

۱۳)  $y = \text{Arccos } 2x$

۱۴)  $y = \text{Arctg } 2x$

۱۵)  $y = \text{Arctg } 2x$

۱۶)  $y = \text{Arcsin } ax$

۱۷)  $y = \text{Arcsin } ax + \text{Arccos } ax$

۱۸)  $y = \text{Arctg } mx + \text{Arctg } nx$     ۱۹)  $y = (\text{Arcsin } x)^2$

۲۰- مشتق تابع با ضابطه  $y = (\text{Arctg } x)^2$  را به ازای  $x = 1$  تعیین کنید.

۲۱- معادله مماس بر منحنی نمایش تابع  $y = \text{Arctg } 3x$  را در نقطه‌ای از منحنی به

طول  $\frac{1}{3}$  بنویسید.

۲۲- تابع با ضابطه  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  داده شده است؛

الف - مطلوبست تعیین دامنه تعریف و برد آن

ب - تابع معکوس و مشتق آنرا تعیین کنید

ج - معادله خط مماس بر منحنی فوق را در نقطه  $A$  به طول ۲ و همچنین معادله خط قائم

بر منحنی نمایش تابع معکوس را در نقطه  $A'$  متناظر  $A$  تعیین کنید. آیا دوخط نسبت بهم

چه وضعی دارند.

۲۳- تابع با ضابطه  $y = x + \frac{1}{x}$  مفروض است. در هر يك از حالات  $x > 1$  و  $x < -1$  مع

معکوس و مشتق آنرا تعیین کنید.

۲۴- تابع با ضابطه  $y = \frac{x+2}{2x-3}$  داده شده است. نمودار این تابع و نمودار معکوس آنرا در يك دستگاه مختصات رسم کنید.

۲۵- تابع با ضابطه  $y = \frac{x+1}{x-1}$  مفروض است. نمودار این تابع و معکوس آنرا در يك دستگاه مختصات رسم کنید.

۲۶- تابع با ضابطه  $y = \frac{1}{x^2}$  که در آن  $x > 0$  داده شده است. نمودار این تابع و معکوس آنرا رسم کنید.

۱-۳۲- کاربرد مشتق در مسائل عملی ماکزیم و می نیم - در بررسی مشتق و اکسترم (ماکزیم و می نیموم)، که قبلا دیده اید گفته شده است که مشتق در موضوع سرعت در مکانیک و فیزیک و مسائل مختلف درهندسه و اقتصاد و آمار و سایر دانش ها کاربرد فراوان دارد.

علاوه بر ماکزیم و می نیموم نسبی ماکزیم و می نیموم مطلق نیز مورد بحث واقع می شود. همانطور که در سال سوم دیده اید برای تعیین ماکزیم و می نیم نسبی يك تابع مشتق پذیر باید مشتق تابع را نسبت به متغیر مستقل حساب کرده و نقاط تغییر علامت آنرا تعیین کنیم. در مورد ماکزیم و می نیموم مطلق باید حداکثر و حداقل تابع مطلوب را در فاصله تغییرات متغیر مشخص کنیم. گاهی ممکن است ماکزیم و می نیموم نسبی ماکزیم و می نیموم مطلق نیز باشد در زیرچند مثال برای نشان دادن موضوع می آوریم.

مسئله اول- مجموع دو عدد مثبت مقدار ثابت  $2a$  است. حاصل ضرب آنها درچه صورت

ماکزیم است.

حل: اگر یکی از دو عدد  $x$  فرض شود دیگری  $2a - x$  خواهد بود. اگر حاصل ضرب

آنها را  $P$  بنامیم خواهیم داشت:

$$P = x(2a - x) = -x^2 + 2ax \quad \text{و} \quad 0 < x < 2a$$

مشتق تابع  $P' = -2x + 2a$  به ازای  $x = a$  صفر شده و تغییر علامت می دهد یعنی

به ازای  $x < a$  داریم  $P' > 0$  و به ازای  $x > a$  داریم  $P' < 0$ . بنابراین تابع فوق به ازای

$x = a$  دارای ماکزیم  $P = a^2$  خواهد بود. یعنی در صورتی حاصل ضرب  $P$  ماکزیم است که دو عدد برابر باشند.

مسئله دوم - حاصل ضرب دو عدد مثبت مقدار ثابت  $k^2$  است ( $k > 0$ ). درچه صورت

مجموع آن دو عدد می نیموم است.

حل- اگر یکی از دو عدد  $x$  باشد دیگری  $\frac{k^2}{x}$  است و اگر مجموع آن دو عدد را  $S$  بنامیم

داریم:  $S = x + \frac{k^2}{x}$  ، که در آن  $0 < x < k^2$  . حال اگر مشتق  $S$  را حساب کنیم خواهیم داشت :

$$S' = 1 - \frac{k^2}{x^2} = \frac{x^2 - k^2}{x^2}$$

چنانکه دیده می شود به ازاء  $x = k > 0$  تابع دارای می نیموم  $S = 2k$  خواهد بود و در این حال دو عدد برابر می باشند.

**مسئله سوم** - مثلث متساوی الاضلاع  $ABC$  به ضلع  $a$  مفروض است و  $AH$  ارتفاع آن است . مربع مستطیل  $MNPQ$  را به قسمی در مثلث محاط کرده ایم که  $MN$  روی  $BC$  قرار دارد . معلوم کنید در چه صورت مساحت مستطیل ماکزیمم است.

**حل** -  $HM = HN$  را  $x$  فرض می کنیم.

بنابراین اضلاع مستطیل چنین خواهند بود:

$$MN = 2HM = 2x$$

$$MQ = MB \operatorname{tg} 60^\circ = \frac{(a - 2x)\sqrt{3}}{2} \quad \text{و}$$

اگر مساحت مستطیل را  $S$  بنامیم داریم:

$$S = MQ \times MN$$

$$S = x(a - 2x)\sqrt{3} \Rightarrow$$

$$S = \sqrt{3}(-2x^2 + ax) \quad \text{و} \quad 0 < x < \frac{a}{2}$$

و  $S' = \sqrt{3}(-4x + a)$  به ازاء  $x = \frac{a}{4}$  صفر می شود و به ازاء  $x < \frac{a}{4}$  مثبت و به ازاء

$x > \frac{a}{4}$  منفی است . پس تابع دارای ماکزیمم  $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{8}$  است.

**مسئله چهارم** - نیمدایره به قطر  $AB = 2R$  داده شده است . وتر  $CD$  موازی قطر

$AB$  رسم شده است زاویه  $\angle COB = x$  را چنان تعیین کنید که مساحت ذوزنقه  $ABCD$


ماکزیمم باشد.

**حل:**

$$S = \frac{AB + CD}{2} \times CH$$

$$AB = 2R \quad \text{و} \quad CD = 2CK = 2R \cos x \quad \text{و} \quad CH = R \sin x$$

$$S = \frac{2R + 2R \cos x}{2} \times R \sin x$$



$$S = R^2(1 + \cos x) \cdot \sin x \quad 0 < x < \frac{\pi}{4}$$

$$S' = R^2[-\sin^2 x + \cos^2 x + \cos x] = R^2(\cos 2x + \cos x)$$

$$S' = 0 \Rightarrow \cos 2x = -\cos x = \cos(\pi - x)$$

$$2x = 2k\pi \pm (\pi - x) \Rightarrow x = (2k + 1)\frac{\pi}{3} \text{ یا } x = (2k + 1)\pi$$

چون  $0 < x < \frac{\pi}{4}$  پس  $x = \frac{\pi}{3}$  تنها جواب در این فاصله است. اگر  $0 < x < \frac{\pi}{3}$ ، آنوقت

مشتق مثبت است و اگر  $\frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{4}$ ، آنوقت مشتق منفی است پس S در نقطه  $\frac{\pi}{3}$  دارای ماکزیمی

برابر  $\frac{2R^2\sqrt{3}}{3}$  می باشد.

### تمرین

۱- نقطه A به طول a روی محور Ox و نقطه B به عرض b روی محور Oy و خط

D به معادله  $y = h$  (به فرض  $0 < b < a < b < 0$ ) داده شده است. روی خط D نقطه M را

به قسمی تعیین کنید که:

الف:  $MA + MB$  می نیموم باشد.

ب:  $\overline{MA} + \overline{MB}$  می نیموم باشد.

۲- مقوائی مربع شکل به ضلع a سانتیمتر در دست است. از گوشه‌های این مقوا مربعهایی

به ضلع x سانتیمتر جدا می کنیم و با تا کردن مقوا جعبه مکعب مستطیل شکل بدون دری میسازیم.

x را چنان تعیین کنید که حجم جعبه ماکزیمم باشد.

۳- يك ورقه مقوا به شکل مستطیل و به مساحت ثابت  $a^2$  را به چه ابعادی انتخاب کنیم

تا بتوان با آن مکعب مستطیلی به ارتفاع ثابت h بسازیم که دارای حجم ماکزیمم باشد (از هر گوشه

آن ورقه مربعی به ضلع h بریده و آنرا تا کرده ایم).

۴- ثابت کنید بین مستطیلهای محاط در دایره، مربع محاطی، مساحت از مساحت کلاً مستطیلهای بیشتر و همچنین محیطش از محیط کلیه مستطیلهای بیشتر است.

۵- بین مثلثهای متساوی الساقین محاط در دایره، محیط مثلث متساوی الاضلاع از محیط مثلثهای دیگر بیشتر است.

۶- تحقیق کنید بین مثلثهای قائم الزاویه به وتر  $a$ ، مثلثی دارای مساحت ماکزیمم است که اندازه ضلع مجاور به زاویه قائمه آن  $\frac{a}{\sqrt{2}}$  باشد.

۷- تحقیق کنید بین استوانه‌های دوار که در داخل کسره به شعاع  $R$  محاط است آنکه ارتفاعش  $\frac{\sqrt{2}R}{\sqrt{3}}$  است حجمش از دیگر استوانه‌های بیشتر است.

۸- بین مخروطهای دوار محاط در کسره به شعاع  $R$  کدامیک دارای بیشترین حجم است؟  
 ۹- بین دوزنقه‌های متساوی الساقین به مساحت ثابت  $S$  که زاویه ساق و قاعده  $\alpha$  باشد کدامیک محیطش می‌نیموم است.

$$\left( \sqrt{\frac{S}{\sin \alpha}} \text{ جواب طول ساق} \right)$$

۱۰- درون کسره به شعاع  $R$  منشور مثلث القاعده منظمی با حجم ماکزیمم محاط کنید.

$$\left( \frac{\sqrt{2}R}{\sqrt{3}} \text{ جواب ارتفاع منشور} \right)$$

۱۱- مخروطی برنیمکسره به شعاع  $R$  محیط کنید به قسمی که قاعده مخروط منطبق بر صفحه دایره عظیمه نیمکسره باشد و حجم مخروط می‌نیموم باشد.

$$\left( R\sqrt{3} \text{ جواب ارتفاع} \right)$$

۱۲- مخروط دواری بر استوانه به شعاع قاعده  $R$  محیط کنید که قاعده مخروط بر صفحه قاعده استوانه منطبق و مرکز دایره قاعده آنها مشترک باشد. در چه صورت حجم مخروط می‌نیموم است.

$$\left( R_1 = \frac{\sqrt{2}R}{\sqrt{3}} \text{ جواب} \right)$$

۱۳- از نقطه  $A(a, b)$  واقع در ربع اول محورهای مختصات عمود برهم خطی چنان مرور دهید که اگر  $Ox$  را در  $C$  و  $Oy$  را در  $D$  قطع کند مساحت مثلث  $OCD$  می‌نیموم باشد.

$$\left( \frac{x}{2a} + \frac{y}{2b} = 1 \text{ جواب معادله خط} \right)$$

۱۴- ۱۲ پیل مشابه را که نیروی محرك هر کدام  $\frac{1}{8}$  ولت و مقاومت داخلی هر یک

$\frac{1}{10}$  اهم است به چه ترتیب بایسد پیوندید تا حداکثر شدت جریان از مقاومت خارجی

$$R = \frac{1}{30} \text{ اهمی بگذرد.}$$

$$I = \frac{p \cdot q \cdot E}{pR + qr} \text{ (شدت جریان بر حسب آمپر، } E \text{ نیروی محرك هرپیل، } r \text{ راهنمایی)}$$

مقاومت داخلی،  $q$  تعداد ردیف‌ها و  $pq = 12$ .

(جواب ۲ ردیف ۶ تایی)

خط مجانب

۳۳-۱ - شاخه بی نهایت منحنی - گوئیم منحنی نمایش تابع  $y = f(x)$  دارای شاخه بی نهایت است هرگاه نقطه یا نقاطی روی منحنی وجود داشته باشد که لااقل یکی از مختصات آن (طول یا عرض یا هر دو) به سمت بی نهایت میل کند.

مثال ۱ - منحنی نمایش  $y = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$  دارای شاخه بی نهایت است زیرا:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{x+1} = 0$$

مثال ۲ - منحنی نمایش  $y = \frac{1}{(x-2)^2} + 1$  دارای شاخه‌های بی نهایت است زیرا داریم:

$$\begin{cases} x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow +\infty \end{cases} \text{ و } \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 1 \end{cases} \text{ و } \begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow 1 \end{cases}$$


مثال ۳ - منحنی نمایش  $y = x + \frac{1}{x^2+1}$  دارای شاخه‌های بی نهایت است زیرا:

$$\begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty \end{cases} \text{ و } \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

۳۴-۱ - تعریف خط مجانب: هرگاه منحنی (C) نمایش تابع  $y = f(x)$  دارای شاخه بی نهایت باشد خط (D) را مجانب آن شاخه گوئیم در صورتی که فاصله نقطه متغیر M از آن شاخه تا آن خط وقتی که نقطه روی آن شاخه بی نهایت دور شود به سمت صفر میل کند.

در شکل‌های صفحه بعد هر يك از منحنیها دارای شاخه بی نهایت است و حالت‌های مختلف مجانب را نشان می‌دهند.

خط مجانب منحنی، ممکن است موازی محور  $y$  ها باشد که در این صورت آنرا اصطلاحاً مجانب قائم گویند شکل (a)، و ممکن است موازی محور  $x$  ها باشد، که در این صورت



اصطلاحاً آنرا مجانب افقی گویند شکل (b) ، و ممکن است محورهای مختصات را قطع کند که در این صورت اصطلاحاً آنرا مجانب مایل گویند شکل (c). خط مجانب منحنی ممکن است منحنی را در یک یا چند نقطه قطع کند شکلهای (b) و (c).

۱-۳۵-۱ قضیه I- اگر در تابع  $y = f(x)$  داشته باشیم:

$$\begin{cases} x \rightarrow a \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} x \rightarrow a^- \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} x \rightarrow a^+ \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases}$$


خط D به معادله  $x = a$  مجانب قائم منحنی است.

اثبات- فاصله نقطه دلخواه  $M(x, y)$  از منحنی تا خط (D) عبارتست از:

$$MP = |x - a|, \text{ حال اگر نقطه } M \text{ روی منحنی بی نهایت دور شود یعنی } y = f(x) \rightarrow +\infty$$

یا  $y \rightarrow -\infty$  بنا به فرض داریم  $x \rightarrow a$  یا  $|x - a| \rightarrow 0$  یعنی فاصله MP به سمت صفر میل

کند و خط D مجانب منحنی خواهد بود. اثبات حالت‌های  $x \rightarrow a^+$  و  $x \rightarrow a^-$  مشابه اثبات فوق است.



از آنچه گفته شد نتیجه می شود:

برای تعیین معادلهٔ مجانب قائم منحنی تابع  $y = f(x)$  باید  $a$  را چنان

اختیار کنیم که داشته باشیم:

$$\begin{cases} x \rightarrow a \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} x \rightarrow a^- \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} x \rightarrow a^+ \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases}$$

نتیجه - محور  $y$ ها وقتی مجانب قائم است که داشته باشیم:

$$\begin{cases} x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} x \rightarrow 0^- \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow +\infty (-\infty \text{ یا}) \end{cases}$$

مثال ۱- منحنی نمایش تابع با ضابطه  $y = \frac{x+1}{\sqrt{x-1}}$  دارای مجانب قائم  $x=1$  است زیرا:

$$\begin{cases} x \rightarrow 1^+ \\ y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

مثال ۲- منحنی نمایش تابع با ضابطه  $y = \frac{x}{\sqrt{2-x}}$  مجانب قائم  $x=2$  دارد زیرا:

$$\begin{cases} x \rightarrow 2^- \\ y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

مثال ۳- خط مجانب قائم منحنی تابع  $y = \frac{x-4}{(x-3)^2}$  به معادله  $x=3$  است زیرا:

$$\begin{cases} x \rightarrow 3 \\ y \rightarrow -\infty \end{cases}$$



مثال ۴- مجانب قائم منحنی تابع  $y = \frac{1}{x}$  خط  $x = 0$  (محور  $y$ ) است:

$$\left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow 0^- \\ y \rightarrow -\infty \end{array} \right. \quad \text{و} \quad \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow +\infty \end{array} \right.$$

مثال ۵- منحنی نمایش تابع  $y = \frac{-2}{(x-4)(x+1)^2}$  دو مجانب قائم به معادله‌های  $x = 4$

و  $x = -1$  دارد. زیرا:

$$\left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow 4^- \\ y \rightarrow +\infty \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow 4^+ \\ y \rightarrow -\infty \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow +\infty \end{array} \right.$$


۱-۳۶- قضیه II- هر گاه در تابع  $y = f(x)$  وقتی  $x \rightarrow +\infty$  یا  $x \rightarrow -\infty$  داشته

باشیم  $y \rightarrow b$  خط  $D$  به معادله  $y = b$  مجانب افقی منحنی است.

اثبات - فاصله نقطه  $M(x, y)$  از منحنی تا خط  $D$  به معادله  $y = b$  عبارتست از:

$MP = |y - b|$ . حال اگر  $M$  روی منحنی بی نهایت دور شود یعنی  $x \rightarrow +\infty$  یا  $x \rightarrow -\infty$

مطابق آنچه در فرض داریم  $f(x) = y \rightarrow b$  پس  $|y - b| \rightarrow 0$  یعنی فاصله  $MP$  به صفر میل می‌کند و خط  $D$  مجانب منحنی خواهد بود.



از آنچه گفته شد نتیجه می‌شود:

برای تعیین مجانب افقی منحنی تابع  $y = f(x)$  باید  $b$  را قسمی اختیار کنیم که

داشته باشیم

$$\left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow b \end{array} \right. \quad \text{یا} \quad \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow b \end{array} \right.$$

نتیجه - محور xها وقتی مجانب منحنی است که داشته باشیم:

$$\begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow 0 \end{cases} \text{ یا } \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 0 \end{cases}$$

مثال ۱- مجانب افقی منحنی تابع با ضابطه  $y = \frac{x^2}{x^2 + 4} + 1$  به معادله  $y = 1$  است زیرا

$$\begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y \rightarrow 1 \end{cases} \quad \text{داریم:}$$

مثال ۲- مجانب های قائم و افقی منحنی تابع  $y = 3 + \frac{1}{\sqrt{1-x}}$  عبارتند از  $x = 1$  و  $y = 3$  چون داریم:

$$\begin{cases} x \rightarrow 1^- \\ y \rightarrow +\infty \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow 3 \end{cases}$$

مثال ۳- منحنی نمایش تابع  $y = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ :

الف - مجانب قائم ندارد، زیرا به ازای هر مقدار حقیقی از  $x$  این تابع پیوسته بوده و دارای حد با پایان است. (توجه کنید که عبارت مخرج تابع صفر نمی شود)

ب- دو مجانب افقی به معادله های  $y = +1$  و  $y = -1$  دارد زیرا:

$$y = \frac{x}{|x| \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}$$

$$x > 0 \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} \Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +1 \end{cases}$$

$$x < 0 \Rightarrow y = \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} \Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -1 \end{cases}$$

۱-۲۷- قضیه III- اگر خط  $D$  به معادله  $Y = mx + h$  مجانب مایل منحنی تابع


$y = f(x)$  باشد داریم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - Y) = 0 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - Y) = 0$$

اثبات - چون خط  $D$  مجانب منحنی است پس  $\lim_{x \rightarrow +\infty} MH = 0$  یا  $\lim_{x \rightarrow -\infty} MH = 0$ .

فرض کنید  $\lim_{x \rightarrow +\infty} MH = 0$  حد اگر  $\alpha$  زاویه خط  $D$  با محور  $Ox$  باشد چون خط  $D$  موازی

$yy'$  نیست  $\alpha \neq \frac{\pi}{4}$  در نتیجه  $\cos \alpha \neq 0$ .



در مثل قائم الزاویه  $MNH$  داریم  $MH = MN \cos \alpha$  چون حد  $MH$  وقتی نقطه  $M$  روی منحنی بی نهایت دور شود صفر است، حد طرف دوم نیز صفر خواهد شد و با توجه به اینکه  $\cos \alpha \neq 0$  پس حد  $MN$  صفر خواهد شد یعنی داریم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} MN = \lim_{x \rightarrow +\infty} |PM - PN| = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - Y) = 0$$

اثبات در حالت  $\lim_{x \rightarrow -\infty} MH = 0$  شبیه به فوق است.

۱-۳۸- عکس قضیه III - هر گاه تابع  $y = f(x)$  و خط  $D$  به معادله  $Y = mx + h$

را داشته باشیم به قسمی که  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - Y) = 0$  یا  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y - Y) = 0$ ، آنگاه خط  $D$  مجانب منحنی است.

اثبات- فرض کنید  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - Y) = 0$  . هر گاه دو نقطه  $M$  و  $N$  را به ترتیب روی منحنی

وخط  $D$  با يك طول انتخاب کنیم داریم:  $NM = |y - Y|$  و چون نقطه روی منحنی می نهایت دور شود با استفاده از فرض داریم:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} |y - Y| = 0$  یعنی  $\lim_{x \rightarrow +\infty} NM = 0$  و با توجه به رابطه

$MH = MN \cdot \cos \alpha$  که طرف دوم آن به سمت صفر میل می کند خواهیم داشت :  
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} MH = 0$  یعنی خط  $D$  مجانب منحنی است.

اثبات در حالتیکه  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y - Y) = 0$  شبیه به حالت فوق است. با توجه به قضیه III و عکس

آن داریم :

شرط لازم و کافی برای اینکه خط  $D$  به معادله  $Y = mx + h$  مجانب مایل منحنی تابع  $y = f(x)$  باشد این است که :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |y - Y| = 0 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |y - Y| = 0$$

نتیجه - تابعهایی که بصورت  $y = mx + h + \frac{F(x)}{G(x)}$  بوده و درجه صورت کسری

$F(x)$  کمتر از درجه محرج یعنی  $G(x)$  باشد دارای مجانب مایل  $Y = mx + h$  می باشند، زیرا داریم :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |y - Y| = 0 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |y - Y| = 0$$

۱-۳۹- روش تعیین مجانب مایل- برای تعیین  $y = mx + h$ ، معادله خط مجانب مایل

منحنی تابع  $y = f(x)$ ، در صورت وجود، کافی است مقادیر  $m$  و  $h$  را تعیین کنیم بدومی که:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - mx - h) = 0 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - mx - h) = 0$$

برای این کار به شرح زیر عمل می کنیم . ( فقط برای حالت  $x \rightarrow +\infty$  بحث را ادامه

می دهیم و حالت  $x \rightarrow -\infty$  شبیه به آن است):

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{y - h}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{y}{x} - \frac{h}{x} \right)$$

هرگاه  $x \rightarrow +\infty$ ، حد  $\frac{h}{x}$  برابر صفر است. بنابراین:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x}$$

پس از تعیین مقدار  $m$  از رابطه  $(y - mx - h) = 0$  حد نتیجه می‌شود:

$$h = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - mx)$$

**بصره ۱-** در موقع تعیین  $m$  و  $h$  اگر  $m = 0$  و  $h$  حد معینی داشته باشد، بجانب حاصل افقی و معادله اش  $y = h$  است.

**بصره ۲-** بجانب مایل  $y = mx + h$  را می‌توان مماس بر منحنی (C) نمایش تابع  $y = f(x)$  دانست که نقطه تماسش در بی‌نهایت باشد: بنابراین اگر معادله‌های:

$$y = f(x) \quad \text{و} \quad y = mx + h$$

را باهم حل کنیم طول نقاط برخورد خط و منحنی از معادله  $f(x) - mx - h = 0$  (۱) بدست می‌آید. حال اگر  $f(x)$  يك عبارت جبری بر حسب  $x$  باشد، چون معادله اخیر باید دارای ریشه مضاعف  $\infty$  باشد باید ضرایب دو جمله بزرگترین درجه معادله (۱) را پس از حذف مخرجها و رادیکالها مساوی صفر قرار داد تا  $m$  و  $h$  بدست آید. (درموقعی که تابع  $y = f(x)$  گنگ و شامل ریشگی زوج است، باید طرفین معادله را به توان زوج رساند تا از صورت گنگی خارج شود، در این صورت باید دقت نمود که مقادیر  $m$  و  $h$  بدست آمده ریشه خارجی نباشد.)

**مثال ۱-** مطلوبست تعیین معادله بجانب مایل منحنی تابع با ضابطه:  $y = x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$

حل: خط  $y = x + 1$  بجانب مایل تابع است زیرا داریم:

$$y - x - 1 = \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - x - 1) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 + 1} = 0$$

**مثال ۲-** مطلوب است تعیین معادلات خطوط بجانب منحنی نمایش تابع  $y = \frac{x^2 - 3}{x + 1}$

حل: خط  $x = -1$  مجانب قائم منحنی تابع است زیرا داریم:

$$\begin{cases} x \rightarrow -1 \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases}$$

هر گاه  $x \rightarrow \pm \infty$  در این صورت  $y \rightarrow \pm \infty$  پس منحنی مجانب افقی ندارد و چون درجه عبارت صورت یک واحد بیش از درجه عبارت مخرج است پس منحنی مجانب مایل دارد. تابع

را می توان به صورت  $y = x - 1 - \frac{2}{x+1}$  نوشت (صورت را بر مخرج تقسیم کردیم)

بنابراین خط  $y = x - 1$  مجانب مایل منحنی تابع است.

مثال ۳- مطلوب است تعیین معادله های مجانبهای منحنی تابع  $y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}$

حل: چون  $x^2 + 1 \neq 0$  پس منحنی مجانب قائم ندارد. همچنین منحنی مجانب افقی

ندارد زیرا:

$$\begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases}$$

برای تعیین معادله مجانب مایل باید  $m$  و  $h$  را پیدا کنیم به قسمی که:

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} \quad \text{یا} \quad m = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - mx) \quad \text{و} \quad h = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - mx) \quad \text{و} \quad h = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x}$$

به ترتیب چنین عمل می کنیم:

$$\frac{y}{x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

$$m_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = 1$$

$$m_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = -1$$

$$h_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x \sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x^2 - x^2}{\sqrt{x^2+1} (x^2 + x \sqrt{x^2+1})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2}{\sqrt{x^2+1}(x^2+x\sqrt{x^2+1})} = 0$$

$$h_v = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y+x) = \dots = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2}{\sqrt{x^2+1}(x^2-x\sqrt{x^2+1})} = 0$$

پس معادله‌های مجانبهای مایل منحنی عبارتند از:

$$y=x \text{ و } y=-x$$

مثال ۴ - مطلوب است تعیین معادله‌های مجانبهای منحنی تابع  $y = \sqrt{x^2 - 2x^2 + 1}$

حل: منحنی مجانب قائم ندارد، مجانب افقی نیز ندارد زیرا:

$$\begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases}$$

اگر معادله مجانب مایل  $y = mx + h$  باشد، از حذف  $y$  بین:

$$y = mx + h \text{ و } y = \sqrt{x^2 - 2x^2 + 1}$$

نتیجه می‌شود:

$$x^2 - 2x^2 + 1 = m^2x^2 + 2m^2hx + 2h^2mx + h^2$$

$$(m^2 - 1)x^2 + 2x^2(m^2h + 2) + \dots = 0$$

دو تا از ضرایب بزرگترین درجه را صفر می‌گیریم:

$$\begin{cases} m^2 - 1 = 0 \\ m^2h + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ h = -2 \end{cases}$$

پس  $y = x - 2$  مجانب مایل منحنی تابع است

لبصره هرگاه دو منحنی  $(C)$  و  $(C')$  نمایش تابعهای  $y_1 = f(x)$  و  $y_2 = g(x)$

باشند داشته باشیم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |y_1 - y_2| = 0 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |y_1 - y_2| = 0$$

دو منحنی را مجانب یکدیگر گوئیم.

مثال - منحنیهای نمایش دو تابع  $y_1 = x^2 + \frac{1}{x+1}$  و  $y_2 = x^2$  مجانب یکدیگرند

زیرا:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} |y_1 - y_2| = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x+1} \right| = 0$$

تمرین

معادلات خطوط مجانب هریک از تابعهای زیر را تعیین کنید.

$$۱) y = \frac{x-2}{x-2}$$

$$۲) y = \frac{2x^2}{x^2-1}$$

$$۳) y = \frac{3x^2+x-1}{x-1}$$

$$۴) y = \frac{x^2-x^2}{x^2-4}$$

$$۵) y = \frac{x^2+x+1}{x^2-9}$$

$$۶) y = \frac{x\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-2}}$$

$$۷) y = \frac{1}{\sqrt{x-2}} + \frac{1}{\sqrt{x-3}} + 2$$

$$۸) y = x-1 + \sqrt{x^2-4x}$$

$$۹) y = x+2 - \sqrt{x^2+2x+3}$$

$$۱۰) y = \sqrt{18x^2-24x^2+x}$$

$$۱۱) y = \frac{\sqrt{x^2+x+1}-x}{x-1}$$

$$۱۲) y = \frac{x + \sqrt{x^2+1}}{x}$$

$$۱۳) y = \sqrt[3]{x^2+x}$$

$$۱۴) y = \frac{2x - \sqrt{x^2+1}}{x-2}$$

$$۱۵) y = \frac{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{4x^2+1}}{x+1}$$

$$۱۶) y = \frac{\sqrt{x^2+1} + 2x^2+1}{x}$$

$$۱۷) y = \frac{\sqrt{x^4+x^2+x^2+1}}{x}$$

$$۱۸) y = x\sqrt{\frac{x-2}{x-2}}$$

$$۱۹) y = \sqrt{\frac{x^2-7}{x-2}}$$

$$۲۰) y = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2-4}}$$

$$۲۱) y = \text{Arctg}x$$

$$۲۲) y = \text{Arccot}g x$$

$$۲۳) y = \text{Arctg}^3 x$$

$$۲۴) y = \frac{2}{\text{Arc} \cos x}$$

۲۵- تحقیق کنید منحنی (C') به معادله  $y_1 = \frac{x^2+1}{x}$  مجانب منحنی (C) به معادله

$y_1 = \frac{x^2+x^2+1}{x(x^2+1)}$  می باشد، ضمناً تحقیق کنید دو منحنی دارای خطوط مجانب مشترکند و

معادلات آن خطوط را تعیین کنید.



۲۶ - تابع با ضابطه  $y_1 = \frac{ax^2 + bx + c}{x + 2c}$  مفروض است:

الف - پارامترهای  $a$  و  $b$  و  $c$  را چنان تعیین کنید که منحنی این تابع دارای مجانبهایی به معادلات  $x + 4 = 0$  و  $y - x + 1 = 0$  باشد.

ب - مجانبهای منحنی تابع  $y = \frac{1}{y_1}$  را به ازاء مقادیر حاصله  $a$  و  $b$  و  $c$  که در فرض الف بدست آمده است تعیین کنید.

۲۷ - تابع زیر مفروض است:

$$y = 2x + a + \sqrt{ax^2 + bx + 3}$$

الف - پارامترهای  $a$  و  $b$  را چنان تعیین کنید که منحنی تابع فوق وقتی  $x \rightarrow +\infty$  دارای مجانب مایلی به معادله  $y = 4x + 3$  باشد.

ب - به ازای مقادیر حاصله  $a$  و  $b$  مجانب دیگر تابع را تعیین کنید.

۲۸ - به فرض اینکه  $t$  از  $-\infty$  تا  $+\infty$  تغییر کند و داشته باشیم:

$$y = \frac{t^2}{t+1} \quad \text{و} \quad x = \frac{t^2}{t^2+1}$$

خواهیم داشت  $y = f(x)$ ، مطلوبست تعیین معادلات خطوط مجانب منحنی تابع  $y = f(x)$

۲۹ - تابع  $y = ax + b + \sqrt{(px+q)^2 + 1}$  (که در آن  $p > 0$ ) مفروض است.

تحقیق کنید منحنی این تابع دارای دو مجانب به معادله‌های ذیل است:

$$\begin{cases} Y_1 = ax + b + (px + q) , & x \rightarrow +\infty \\ Y_2 = ax + b - (px + q) , & x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

(راهنمایی: حد  $|y - Y_i|$  را وقتی که  $x \rightarrow \pm\infty$  تعیین کنید).

۳۰ - تابع  $y = ax + b - \sqrt{(px+q)^2 + 1}$  که در آن  $p > 0$  مفروض است.

تحقیق کنید منحنی این تابع دارای دو مجانب به معادله‌های ذیل است:

$$\begin{cases} Y_1 = ax + b + (px + q) , & x \rightarrow -\infty \\ Y_2 = ax + b - (px + q) , & x \rightarrow +\infty \end{cases}$$

(راهنمایی: مانند مسئله قبل حد  $|y - Y_i|$  را وقتی که  $x \rightarrow \pm\infty$  تعیین کنید).

یادآوری: با استفاده از فرمولهایی که از حل مسائل ۲۹ و ۳۰ برای تعیین مجانبها نمودید

می‌توانید مجانبهای منحنیهای تابعهای  $y = ax + b \pm \sqrt{cx^2 + dx + e}$  را در حالتی که  $c > 0$  است به سهولت تعیین کنید.

۳۱- خطوط مجانب منحنی تابع زیر را تعیین کنید:

$$y = 2x - 2 + \sqrt{x^2 - 2x + 3}$$

حل: با استفاده از فرمولی که در حل مسئله ۲۹ بدست آوردیم مجانبها را تعیین می‌کنیم:

ابتدا ضابطه تابع را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$y = 2x - 2 + \sqrt{(x-1)^2 + 2}$$

$$x \rightarrow +\infty, Y_1 = 2x - 2 + (x-1) \Rightarrow Y_1 = 3x - 3$$

$$x \rightarrow -\infty, Y_2 = 2x - 2 - (x-1) \Rightarrow Y_2 = x - 1$$

۳۲- خطوط مجانب منحنی تابع  $y = x - 3 + \sqrt{x^2 - 4x}$  را به وسیله فرمولی که از حل مسئله ۲۹ فرا گرفتید تعیین کنید.

خطوط مجانب منحنیهای هر یک از توابع ذیل را به کمک دستورهائی که از حل مسئله ۲۹ و ۳۰ یاد گرفتید تعیین کنید.

$$33) y = 2x - 1 - \sqrt{4x^2 - 12x} \quad 34) y = 2x - \sqrt{x^2 - 4x + 3}$$

$$35) y = 2x - \sqrt{9x^2 + 9x - 1} \quad 36) y = 2 + \sqrt{x^2 + 1}$$

$$37) y = \sqrt{x^2 - 4x} \quad 38) y = -x + 2 - \sqrt{x^2 - 1}$$

۳۹- تابع با ضابطه  $y = mx + n + \sqrt{x^2 - 6x}$  مفروض است.

الف-  $m$  و  $n$  را چنان تعیین کنید که منحنی تابع وقتی  $x \rightarrow +\infty$  دارای مجانب مایلی

به معادله  $y = 2x - 2$  باشد. به‌ازاء مقادیر حاصل  $n$  و  $m$  مجانب دیگر منحنی را تعیین کنید.

## بررسی تغییرات توابع

$$f: x \mapsto \frac{ax^2 + bx + c}{a'x^2 + b'x + c'}$$

۱-۲ - کلیات - قبلا نکات کلی و خواص عمومی تابع را مورد مطالعه قرار داده و سپس حالات مختلف آنرا در نظر می‌گیریم:

برای اینکه این تابع کسری هموگرافیک نباشد باید لااقل یکی از ضرایب  $a$  و  $a'$  مخالف صفر باشد.

حالات مخصوص:

۱- اگر  $a = b' = 0$  آنوقت نمودار تابع يك سهمی است که قبلا درباره آن صحبت کرده و تغییرات آنرا تحقیق کرده‌ایم.

۲- اگر  $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = k$ ، در این صورت هرگاه صورت و مخرج تابع ریشه نداشته باشند تابع خط  $y = kx$  می‌باشد. اگر صورت و مخرج هر کدام دارای ریشه‌های متمایز  $x_1$  و  $x_2$  باشند تابع  $y$  به ازای  $x = x_1$  و  $x = x_2$  تعریف نشده است. هرگاه صورت و مخرج هر کدام دارای ریشه مضاعف  $x$  باشند باز تابع  $y$  به ازای  $x = x_0$  تعریف نشده است.

۳- اگر صورت و مخرج فقط دارای يك ریشه مشترك  $x_0$  باشند صورت و مخرج دارای عامل مشترك  $x - x_0$  بوده و نمودار آن با شرط  $a' \neq 0$  يك منحنی هموگرافیک ( به ازای مقادیر  $x \neq x_0$ ) خواهد بود (می‌توان دید که چون صورت و مخرج دارای يك ریشه مشترك بین ضرایب  $a$  و  $b$  و  $c$  و  $a'$  و  $b'$  و  $c'$  رابطه  $(ac' - ca') - (ab' - ba')(bc' - cb') = 0$  برقرار می‌باشد). اگر  $a' = 0$ ، آنوقت منحنی به يك خط مستقیم که فقط نقطه نظیر  $x_0$  از آن برداشته شده است تبدیل می‌شود.

مشق تابع در حالت کلی عبارت است از:

$$y' = \frac{(ab' - ba')x^2 + 2(ac' - ca')x + bc' - cb'}{(a'x^2 + b'x + c')^2}$$

اکنون تغییرات تابع را در حالت‌های مختلف بررسی می‌کنیم:

۲-۲ - حالت اول :  $a' = 0$  و  $a \neq 0$  و  $b' \neq 0$

در این حالت داریم :

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{b'x + c'}$$

که ز تقسیم صورت و مخرج بر  $b'$  داریم :  $y = \frac{\frac{a}{b'}x^2 + \frac{b}{b'}x + \frac{c}{b'}}{x + \frac{c'}{b'}}$  و یا :

$$y = \frac{Ax^2 + Bx + C}{x - d}$$

فرض کنید که  $d$  ریشه صورت کسر نباشد [ زیرا در این صورت تابع به معادله یک خط (به استثنای یک نقطه) تبدیل می شود ] . با تقسیم صورت بر مخرج هر گاه خارج قسمت را  $Ax + h$  و باقیمانده را که مخالف صفر است  $l$  بنامیم داریم :

$$(۱) \quad y = Ax + h + \frac{l}{x - d}$$

چنانکه دیده می شود تابع (۱) به ازای تمام مقادیر  $x$  به استثنای  $x = d$  معین و پیوسته است و منحنی آن دارای مجانب قائم  $x = d$  و مجانب مایل  $Y = Ax + h$  می باشد.

هر گاه محورهای مختصات را به موازات خودوهم جهت با آن به قسمی تغییر دهیم که نقطه  $(d$  و  $Ad + h)$  (محل برخورد دو مجانب) مبدأ جدید مختصات باشد معادله (۱) در دستگاه جدید با توجه به اینکه  $x = X + d$  و  $y = Y + Ad + h$  است چنین خواهد بود :

$$(۲) \quad Y = AX + \frac{l}{X}$$

چنانکه از معادله (۲) دیده می شود نقطه  $\omega$  (مبدأ جدید مختصات که محل برخورد دو مجانب است) مرکز تقارن منحنی است زیرا اگر  $X$  را به  $-X$  تبدیل کنیم  $Y$  به  $-Y$  تبدیل می شود .

مشتق تابع (۲) نسبت به  $X$  به صورت  $Y' = A - \frac{l}{X^2}$  یا  $Y' = \frac{AX^2 - l}{X^2}$  درمی آید. اگر  $A$  و  $l$

متحد علامت باشند مشتق دارای دو ریشه  $X = \pm \sqrt{\frac{l}{A}}$  است که به ازاء آنها صفر شده و تغییر


علامت می دهد . در نتیجه تابع دارای یک ماکزیمم و یک می نیموم است . اگر  $A$  و  $l$  مختلف-

علامت باشند مشتق ریشه ندارد و تابع همواره صعودی یا نزولی است. نتیجه اینکه هر گاه  $R$

مبین سه جمله‌ای صورت مشتق تابع اصلی یعنی مبین سه جمله‌ای صورت کسر :

$$y' = \frac{ab'x^2 + 2ac'x + (bc' - cb')}{(b'x + c')^2}$$

مثبت باشد تابع دارای يك ماكزیمم و می‌نیموم است و اگر  $R < 0$  باشد تابع ماكزیمم و می‌نیموم ندارد منحنی همواره نسبت به نقطه  $\omega$  محل برخورد مجانبها متقارن است و نمودار منحنی به صورت یکی از اشکال چهارگانه زیر است



مثال - تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی (C) نمایش تابع با ضابطه

$$y = \frac{x^2 - 3x}{x - 4}$$

تابع به ازای همه مقادیر  $x$  به استثنای  $x = 4$  معین و پیوسته است. منحنی نمایش تابع دارای مجانب قائم  $x = 4$  است. برای تعیین مجانب مایل، تابع را چنین می نویسیم:

$$y = x + 1 + \frac{4}{x - 4}$$

پس خط به معادله  $y = x + 1$  مجانب مایل منحنی است.


مشتق تابع پس از اختصار می شود:

$$y' = \frac{x^2 - 8x + 12}{(x - 4)^2}$$

در ازای  $y' = 0$  داریم  $x = 2$  یا  $x = 6$  پس تابع یک ماکزیمم و یک مینییم دارد. در ازای  $x = 0$  داریم  $y = 0$  و در ازای  $y = 0$  داریم  $x = 0$  یا  $x = 3$  هرگاه  $x \rightarrow \pm\infty$  داریم  $y \rightarrow \pm\infty$ .

جدول تغییرات تابع و شکل منحنی به شرح زیر است:

$x$	$-\infty$	$0$	$2$	$3$	$4$	$6$	$+\infty$					
$y'$		$+$	$0$	$-$		$-$	$0$	$+$				
$y$	$-\infty$	$\nearrow$	$0$	$\searrow$	$0$	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	$9$	$\nearrow$	$+\infty$



تبصره- ثابت می‌شود که منحنی (C) نمایش هندسی تابع باضابطه

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{b'x + c'}$$

يك هذلولی است. این منحنی علاوه بر خاصیت داشتن مرکز تقارن، که در بالا بدن اشاره شد، خاصیت‌های دیگری نیز دارد. يك خاصیت جالب منحنی که برای رسم دقیق آن بکار می‌رود در زیر ذکر می‌شود:

۲-۳- قضیه- اگر خط غیر مشخص D منحنی (C) نمایش هندسی تابع باضابطه

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{b'x + c'}$$


را در دو نقطه M و M' و مجانبهای آن را در نقطه‌های N و N' قطع کند، همواره:

$$MN = M'N'$$

برهان: کافی است ثابت کنیم که وسط MM' بر وسط NN' منطبق است.

برای سادگی محاسبات، دستگاه مختصات را چنان انتخاب می‌کنیم که  $\omega$  محل برخورد مجانبهای منحنی مبدأ مختصات و محور yها بر مجانب قائم منحنی واقع باشد. در این صورت معادله تابع به صورت:

$$(1) y = Ax + \frac{1}{x}$$



و معادله توأم مجابها به صورت

$$(۲) \quad x(y - Ax) = 0$$

می باشد. معادله خط  $D$  را به صورت کلی

$$(۳) \quad y = ax + \beta$$

انتخاب می کنیم. از حذف  $y$  بین معادله های (۱) و (۳) و پس از اختصار خواهیم داشت:

$$(A - \alpha)x^2 - \beta x + 1 = 0$$

$x'$  و  $x''$  ریشه های این معادله طولهای نقطه های  $M$  و  $M'$  می باشند. بنابراین طول نقطه  $P$  وسط  $MM'$  می شود:

$$x_p = \frac{x' + x''}{2} = \frac{\beta}{2(A - \alpha)}$$

همچنین از حل معادله های (۲) و (۳) باهم داریم:

$$x(ax + \beta - Ax) = 0$$

$$(A - \alpha)x^2 - \beta x = 0$$

یا

$x_1$  و  $x_2$  ریشه های این معادله طولهای نقطه های  $N$  و  $N'$  می باشند. پس طول نقطه  $P'$  وسط  $NN'$  می شود:

$$x_{p'} = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{\beta}{2(A - \alpha)}$$

از تساوی  $x_p = x_{p'}$  و با توجه به اینکه  $P$  و  $P'$  بر خط  $D$  واقعند، نتیجه می شود که  $P$  و  $P'$  برهم منطبقند و قضیه ثابت است.

### تمرین

مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش هر یک از تابعهای زیر:

$$۱) \quad y = \frac{x^2 - 4}{x}$$

$$۲) \quad y = \frac{x^2 + 4}{x}$$

$$۳) \quad y = \frac{x^2 - 2x + 3}{2x - 1}$$

$$۴) \quad y = x + 1 + \frac{4}{x + 1}$$

$$۵) \quad y = x - 1 - \frac{4}{x - 1}$$

$$۶) \quad y = |x - 2| + \frac{4}{x - 2}$$

(۷) در تابع  $y = \frac{x^2 + ax + 10}{x + b}$  مقادیر  $a$  و  $b$  را چنان تعیین کنید که  $\omega(1, 0)$  مرکز

تقاطع منحنی نمایش تابع باشد. پس از تعیین  $a$  و  $b$  منحنی را رسم کنید.



۲-۴ - حالت دوم:  $a' \neq 0$  در این حالت داریم:

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{a'x^2 + b'x + c'} \quad \text{و} \quad a' \neq 0$$

الف - مبین سه جمله‌ای مخرج کسر را  $\Delta$  می‌نامیم:

$$\Delta = b'^2 - 4a'c'$$

هرگاه  $\Delta < 0$  تابع همواره معین و پیوسته است. هرگاه  $\Delta = 0$  تابع به ازای همه

مقادیر  $x$  بداستثای  $x = -\frac{b'}{2a'}$  معین و پیوسته است و منحنی تابع يك بجانب قائم بدمعادله

هرگاه  $\Delta > 0$  دارد. هرگاه  $x = -\frac{b'}{2a'}$  به استثای  $x = x_1$  و

$x = x_2$ ، ریشه‌های سه جمله‌ای مخرج کسر تابع، معین و پیوسته است و منحنی نمایش تابع دو بجانب قائم بدمعادله‌های  $x = x_1$  و  $x = x_2$  دارد.

ب - مشتق تابع عبارت است از:

$$y' = \frac{(ab' - ba')x^2 + 2(ac' - ca')x + bc' - cb'}{(a'x^2 + b'x + c')^2}$$

مبین عبارت صورت این کسر را  $R$  می‌نامیم:

$$R = (ac' - ca')^2 - (ab' - ba')(bc' - cb')$$

هرگاه  $ab' - ba' = 0$  مشتق يك ریشه دارد و تابع معمولاً فقط يك ماكزیمم یا

فقط يك می‌نییم دارد.

هرگاه  $ab' - ba' \neq 0$  و  $R > 0$  مشتق دو ریشه دارد که به ازای آنها تغییر علامت

می‌دهد و تابع يك ماكزیمم و يك می‌نییم دارد. هرگاه  $R < 0$  مشتق علامت ثابت دارد و تابع یا همواره صعودی یا همواره نزولی است.

( $R$ ) نمی‌تواند صفر شود زیرا در این صورت سه جمله‌ایهای صورت و مخرج تابع ریشه

مشترك دارند که این حالت ضمن حالت‌های خاص قبلاً ذکر شده است).

ج - هرگاه  $x \rightarrow \pm \infty$  حد  $y$  می‌شود  $\frac{a}{a'}$  پس منحنی نمایش تابع همواره دارای

مجانب افقی  $y = \frac{a}{a'}$  است.

د - هرگاه داشته باشیم:

$$(1) \quad ab' - ba' = 0$$

آنگاه منحنی نمایش تابع دارای محور تقارن  $x = -\frac{b}{2a}$  است. اگر  $a \neq 0$  و دارای

محور تقارن  $x = -\frac{b'}{2a'}$  است اگر  $a = 0$ . مطلب را در حالت  $a \neq 0$  و  $b' \neq 0$  ثابت می‌کنیم

و بقیه حالتها را به عنوان تمرین به عهده دانش‌آموزان می‌گذاریم. در این حالت معادله (۱) هم

ارز با هریک از تساویهای  $\frac{b}{a} = \frac{b'}{a'}$  و  $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$  می‌باشد. از تلاقی خط  $y = m$  با منحنی تابع

داریم:

$$(ma' - a)x' + (mb' - b)x + mc' - c = 0$$

که ریشه‌های این معادله،  $x'$  و  $x''$ ، طولهای نقطه‌های برخورد خط و منحنی می‌باشند و داریم:

$$\frac{x' + x''}{2} = \frac{-(mb' - b)}{2(ma' - a)} = \frac{-b' \left(m - \frac{b}{b'}\right)}{2a' \left(m - \frac{a}{a'}\right)} = -\frac{b'}{2a'} = -\frac{b}{2a}$$

بحث بالا در جدول زیر خلاصه می‌شود و در هریک از حالتها شکل منحنی در صفحه‌های

بعد رسم می‌شود. (در این جدول دلائل و همه جزئیات نوشته نشده است)


$\Delta < 0$ (مبین مخرج) تابع همواره معین و پیوسته است.	}	شکل (۱): تابع دارای یک ماکزیمم و یک می‌نیموم است:	$ab' - ba' > 0$
		شکل (۲): تابع دارای یک می‌نیموم و یک ماکزیمم است:	$ab' - ba' < 0$
		شکل (۳): تابع فقط یک ماکزیمم دارد:	$ab' - ba' = 0$
		شکل (۴): تابع فقط یک می‌نیموم دارد:	$ab' - ba' = 0$
		منحنی دارای محور تقارن	$ac' - ca' < 0$
		یا $x = -\frac{b'}{2a'}$	$ac' - ca' > 0$
		$x = -\frac{b}{2a}$ می‌باشد	

$\Delta = 0$ منحنی یک‌مجانب قائم دارد $x = -\frac{b'}{2a'}$	}	شکل (۵) یا شکل (۶): تابع فقط یک ماکزیمم یا فقط یک می‌نیموم دارد:	$ab' - ba' > 0$
		شکل (۷) یا شکل (۸): تابع فقط یک می‌نیموم یا فقط یک ماکزیمم دارد:	$ab' - ba' < 0$
		شکل (۹) یا شکل (۱۰): منحنی محور تقارن دارد ولی ماکزیمم و می‌نیموم ندارد:	$ab' - ba' = 0$


$\Delta > 0$ منحنی دو مجانب قائم دارد	}	$R < 0$	$\left\{ \begin{array}{l} ab' - ba' > 0 \\ ab' - ba' < 0 \end{array} \right.$	شکل (۱۱) : تابع همواره صعودی است شکل (۱۲) : تابع همواره نزولی است
		$R > 0$	$\left\{ \begin{array}{l} ab' - ba' > 0 \\ ab' - ba' < 0 \\ ab' - ba' = 0 \end{array} \right.$	شکل (۱۳) یا شکل (۱۴) : تابع يك ماکزیمم و يك می نیموم دارد: شکل (۱۵) یا شکل (۱۶) : تابع يك می نیموم و يك ماکزیمم دارد: شکل (۱۷) : فقط يك ماکزیمم دارد: $\left\{ \begin{array}{l} ac' - ca' < 0 \\ ac' - ca' > 0 \end{array} \right.$ شکل (۱۸) : فقط يك می نیموم دارد: $\left\{ \begin{array}{l} ac' - ca' < 0 \\ ac' - ca' > 0 \end{array} \right.$ صورت مشتق درجه اول است: منحنی محور تقارن دارد

تذکره: مطالب بالا که در مورد شکل منحنی نمایش توابع کسری درجه دوم گفته شد برای اطلاع بیشتر دانش آموزان است که قبل از تعیین جدول تغییرات از شکل آن آگاهی داشته باشند و الا در موقع تعیین تغییرات يك تابع و رسم منحنی نمایش آن ضرورت ندارد به موضوع های گفته شده اشاره نماید و اگر در اینجا ما در حل چند مسئله نمونه به آن اشاره نموده ایم برای روشن شدن مطلب برای آنان است.

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta < 0 \\ ab' - ba' > 0 \end{array} \right.$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta < 0 \\ ab' - ba' < 0 \end{array} \right.$$






شکل (۳)

$$\begin{cases} \Delta < 0 \\ ab' - ba' = 0 \\ ac' - ca' < 0 \end{cases}$$




شکل (۴)

$$\begin{cases} \Delta < 0 \\ ab' - ba' = 0 \\ ac' - ca' > 0 \end{cases}$$




شکل (۵)


$$\begin{cases} \Delta = 0 \\ ab' - ba' > 0 \end{cases}$$



شکل (۶)




شکل ۷۱




$$\begin{cases} \Delta = 0 \\ ab' - ba' < 0 \end{cases}$$

شکل (۸)




شکل ۹۱

$$\begin{cases} \Delta = 0 \\ ab' - ba' = 0 \end{cases}$$




شکل (۱۰)




شکل (۱۱) :

$$\Delta > 0, R < 0 \text{ و } ab' - ba' > 0$$




شکل (۱۲) :

$$\Delta > 0, R < 0 \text{ و } ab' - ba' < 0$$




شکل (۱۳)

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ R > 0 \\ ab' - ba' > 0 \end{cases}$$




شکل (۱۴)

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ R > 0 \\ ab' - ba' > 0 \end{cases}$$




شکل (۱۵)

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ R > 0 \\ ab' - ba' < 0 \end{cases}$$



شکل (۱۶)

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ R > 0 \\ ab' - ba' < 0 \end{cases}$$



مثال ۱- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی (c) نمایش تابع باضابطه


$$y = \frac{2x^2 - 3x}{x^2 + x + 3}$$

داریم:  $\Delta = 1 - 12 < 0$  پس تابع همواره معین و پیوسته است:

$$y' = \frac{5x^2 + 12x - 9}{V^2} \quad y' = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \text{ یا } x = \frac{3}{5} \\ y = 3 \text{ و } y = -\frac{3}{11} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \text{ یا } x = \frac{3}{2} \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow \pm\infty \\ y = 2 \end{cases} \text{مجاذب افقی } y = 2$$

$x$	$-\infty$	$-3$	$0$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$y'$	$+$	$0$	$-$	$0$	$+$	
$y$	$\nearrow$	$3$	$\searrow$	$0$	$\searrow$	$-\frac{3}{11}$
						$\nearrow$
						$2$



مثال ۲- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع

$$y = \frac{x^2 - 4x - 5}{x^2 - 4x + 5}$$


چون  $\Delta < 0$  و  $ab' - ba' = 0$  و  $ac' - ca' = 10 > 0$  پس تابع فقط يك می نیموم دارد و منحنی دارای محور تقارن  $x = \frac{-b'}{2a'} = 2$  می باشد و طول نقطه می نیموم نیز همان ۱۲ است.

$$y' = \frac{20x - 20}{x^2} \quad , \quad y' = 0 \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = -9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -1 \text{ و } \Delta \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y = 1 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	0	2	$\Delta$	$+\infty$
y'		—	0	+		
y	1 ↘	0 ↘	-1 ↘	-9 ↗	0 ↗	1 ↗





مثال ۳- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع با ضابطه

$$y = \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 2x + 1}$$

چون  $\Delta = 0$  و  $ab' - ba' = 2 > 0$  با توجه به اینکه:

$$\begin{cases} x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow -\infty \end{cases}$$


تابع فقط يك ماكزيمم دارد.

$$y' = \frac{2x^2 + 2x - 4}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1)(x+2)}{(x-1)^4}$$

$$y' = \frac{2(x+2)}{(x-1)^3}, \quad y' = 0 \begin{cases} x = -2 \\ y = 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \text{ و } 4 \\ y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow -\infty \end{cases}, \quad \begin{cases} x \rightarrow \pm\infty \\ y = 1 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-2	0	1	4	$+\infty$
y'	+	0	-		+	
y	$\nearrow$	12	$\searrow$	$-\infty$	$-\infty$	$\nearrow$



مثال ۴- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش:


$$y = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 2x + 1}$$

چون  $\Delta = 0$  و  $ab' - ba' = 0$  تابع ماکزیمم و می نیموم ندارد منحنی محور تقارن  $x = -1$  دارد که بجانب آن است. می توان شکل تقریبی آن را بدون جدول تغییرات با استفاده از خطوط مجانب آن رسم نمود.

$$y' = \frac{8}{(x-1)^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x=0 \\ y=-3 \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} x=-1 \text{ یا } 3 \\ y=0 \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow \pm \infty \\ y=1 \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow -\infty \end{array} \right.$$

x	$-\infty$	-1	0	1	3	$+\infty$
y'		-			+	
y	1 ↘	0 ↘	-3 ↘	$-\infty$	$-\infty$ ↗	0 ↗



مثال ۵- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش:

$$y = \frac{x^2 - 10}{x^2 - 2x - 3}$$

چون  $\Delta > 0$  و  $R > 0$  و  $ab' - ba' = -2 < 0$  پس تابع دارای یک می‌نیموم و یک ماکزیمم است و میتوان با استفاده از دو جانب قائم و دو جانب افقی شکل آنرا پیش‌بینی کرد.


$$y' = \frac{-2x^2 + 14x - 20}{V^2} \quad y' = 0 \quad \begin{cases} x = 2 \text{ و } 5 \\ y = 2 \text{ و } \frac{5}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{10}{3} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pm \sqrt{10} \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{مجاناب}$$

$$\begin{cases} x \rightarrow 3 \text{ و } -1 \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -1 \end{cases} \quad \text{مجاناب‌های قائم}$$

تابع بازاء جميع مقادير  $x$  باستثناء ۳ و ۱ - معين و پیوسته است.

$x$	$-\infty$	$-\sqrt{10}$	$-1$	$0$	$2$	$3$	$\sqrt{10}$	$5$	$+\infty$										
$y'$		-		-	0		+	0	-										
$y$	$1$	$\searrow$	$0$	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	$\frac{10}{3}$	$\searrow$	$2$	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$\frac{5}{4}$	$\searrow$	$1$



مثال ۶- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش:

$$y = \frac{x^2 + 2|x|}{x^2 + 6x + 5}$$

به ازاء  $x \geq 0$  داریم  $|x| = x$  و به ازاء  $x < 0$  داریم  $|x| = -x$  پس باید تغییرات دو تابع زیر را بررسی کرد:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 6x + 5} \\ x > 0 \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} y_2 = \frac{x^2 - 2x}{x^2 + 6x + 5} \\ x < 0 \end{cases}$$

تابع  $y_1$  همواره پیوسته است و مشتق آن مثبت است.

$$y_1' = \frac{4x^2 + 10x + 10}{V^2} > 0$$

$$\begin{cases} x = 0 & \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y = 1 \end{cases} \\ y_1 = 0 \end{cases}$$

تابع  $y_2$  در ازاء  $x = -1$  و  $x = -5$  نامعین و در ازای سایر مقادیر  $x$  معین و


پیوسته است:

$$y_r' = \frac{8x^2 + 10x - 10}{\sqrt{x}} = 0 \Rightarrow x = \frac{-5 - \sqrt{105}}{8}$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y_r=0 \end{cases} \begin{cases} x \rightarrow -1 \text{ و } -5 \\ y_r \rightarrow \pm\infty \end{cases} \begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ y_r = 1 \end{cases}$$

تغییرات دو تابع را در یک جدول خلاصه می‌کنیم:

x	$-\infty$	$-5$	$\frac{-5 - \sqrt{105}}{8}$	$-1$	$0$	$+\infty$
$y'$	+	+	0	-	-	+
$y$	$1 \nearrow +\infty$	$-\infty \nearrow -\frac{1}{2}$	$\searrow -\infty$	$+\infty \searrow 0$	$0$	$\nearrow 1$



تابع در ازای  $x=0$  می‌نیم است اما مشتق آن در ازاء  $x=0$  نامعین است.

۲-۵ - بعضی از خواص تابع:  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{a'x^2 + b'x + c'}$  (در حالتی که لااقل

$a$  یا  $a'$  مخالف صفر باشد).

۱- هرگاه تابع فوق دارای یک ماکزیمم و یک مینیموم باشد و منحنی (c) نمایش

تابع را با خط دلخواهی موازی محور xها قطع کنیم تا منحنی را در دو نقطه M و N قطع

کند. تصویر M و N و تصاویر نقاط C و D، ماکزیمم و می نیموم تابع، روی محور xها تشکیل تقسیم توافقی می دهند.

زیرا هر گاه خط  $\Delta$  موازی محور xها و به معادله  $y = m$  باشد از حل دستگاه دو معادله:

$$\begin{cases} y = \frac{ax^2 + bx + c}{a'x^2 + b'x + c'} \\ y = m \end{cases}$$

خواهیم داشت:

$$(ma' - a)x^2 + (mb' - b)x + (mc' - c) = 0 \quad (I)$$

$x'$  و  $x''$  طول نقاط M و N ریشه های معادله (I) می باشند.

از مشتق می گیریم:

$$y' = \frac{(ab' - ba')x^2 + 2(ac' - ca')x + (bc' - cb')}{V^2}$$

صورت آن را مساوی صفر قرار می دهیم:

$$(ab' - ba')x^2 + 2(ac' - ca')x + (bc' - cb') = 0 \quad (II)$$

$x_1$  و  $x_2$  طول نقاط ماکزیمم و می نیموم ریشه های معادله (II) می باشند حال اگر  $M_1, C_1, N_1$  و  $D_1$  به ترتیب تصاویر نقاط M و N و C و D روی محور xها باشند داریم:

$$M_1(x', 0) \text{ و } N_1(x'', 0) \text{ و } C_1(x_1, 0) \text{ و } D_1(x_2, 0)$$

برای اینکه ثابت کنیم چهار نقطه اخیر تشکیل تقسیم توافقی می دهند باید ثابت کنیم:

$$2(x_1 x_2 + x' x'') = (x_1 + x_2)(x' + x'')$$

اما با استفاده از معادله های I و II داریم:

$$x_1 x_2 = \frac{bc' - cb'}{ab' - ba'} \text{ و } x_1 + x_2 = -\frac{2(ac' - ca')}{ab' - ba'}$$

$$x' x'' = \frac{mc' - c}{ma' - a} \text{ و } x' + x'' = -\frac{mb' - b}{ma' - a}$$

$$2 \left( \frac{bc' - cb'}{ab' - ba'} + \frac{mc' - c}{ma' - a} \right) = 2 \left( \frac{ac' - ca'}{ab' - ba'} \times \frac{mb' - b}{ma' - a} \right)$$

$$(bc' - cb')(ma' - a) + (ab' - ba')(mc' - c) = (ac' - ca')(mb' - b) \text{ و یا}$$

پس از اختصار مشاهده می شود که مقادیر دو طرف تساوی باهم برابرند.

۲- هر گاه منحنی (C) را با خط  $y = m$  موازی محور xها قطع کنیم همواره بین  $x'$  و  $x''$

حون نقاط برخورد خط و منحنی رابطه مستقلى از  $m$  به صورت زیر برقرار است:

$$(ab' - ba')x'x'' + (ac' - ca')(x' + x'') + bc' - cb' = 0 \quad (III)$$

زیرا با توجه به معادله I داریم:

$$x' + x'' = -\frac{mb' - b}{ma - a} \quad \text{و} \quad x'x'' = \frac{mc' - c}{ma - a}$$

اگر  $m$  را بین این دو رابطه حذف کنیم رابطه مورد نظر بدست می آید.

چنانکه مشاهده می شود هر گاه  $x' = x''$  باشد یعنی خط  $y = m$  بر منحنی مماس باشد معادله (III) همان معادله  $0 = y'$  است و  $x$ های حاصل طول خط ماکزیمم و می نیموم است:

$$(ab' - ba')x^2 + 2(ac' - ca')x + (bc' - cb') = 0$$

بنابراین نگاهداشتن فرمول III در ذره و کار آسانی است.

۴-۶ - تعیین عرضهای ماکزیمم و می نیموم تابع بدون استفاده از مشتق

چنانکه در بالا دیدیم معادله

$$(ma' - a)x^2 + (mb' - b)x + (mc' - c) = 0 \quad (I)$$

طولهای نقاط برخورد خط  $y = m$  و منحنی (C) را می دهد حال هر گاه  $\Delta_1$  مبین این معادله

مثبت باشد معادله دو جواب در نتیجه خط منحنی را در دو نقطه متمایز قطع می کند.

هر گاه  $\Delta_1$  مبین معادله را صفر قرار دهیم، معادله (I) دارای ریشه مضاعف بوده و خط بر منحنی

مماس است. یعنی ریشههای معادله

$$\Delta_1 \equiv (mb' - b)^2 - 4(ma' - a)(mc' - c) = 0 \quad (IV)$$

که بر حسب  $m$  از درجه دوم است عرضهای نقاط ماکزیمم و می نیموم می باشند. البته باید توجه داشت که این ریشه ضریب  $x^2$  را در معادله (I) صفر نکند، زیرا در آن حالت معادله (I) به یک معادله درجه یک تبدیل می شود و مبین معنی ندارد.

طولهای نقطههای ماکزیمم و می نیموم عبارتست از:  $x = \frac{-(mb' - b)}{2(ma' - a)}$  ریشه مضاعف

معادله (I) که در آن بجای  $m$  به ترتیب مقادیر  $y_1$  و  $y_2$  ریشههای معادله (IV) را قرار می دهیم.

تصوره - در موقع محاسبه عرض ماکزیمم و می نیموم تابع  $y = \frac{f(x)}{g(x)}$  می توان ریشههای

مشتق را به جای اینکه در کسر  $\frac{f(x)}{g(x)}$  قرار دهیم در کسر  $\frac{f'(x)}{g'(x)}$  (بشرط اینکه  $g'(x)$  و  $g(x)$  به

ازای آن مقدار صفر نباشد) قرار دهیم زیرا:

$$y' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{[g(x)]^2}$$

طول ماکزیمم و می نیموم ریشه های صورت مشتق است یعنی:

$$f'(x) \cdot g(x) = g'(x) \cdot f(x)$$

چون  $g(x)$  و  $g'(x)$  صفر نیست طرفین را در  $g(x) \cdot g'(x)$  تقسیم می کنیم نتیجه شود:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

از تبصره فوق بیشتر در مواردی که ریشه های مشتق عدد کنگ است استفاده می شود که محاسبه

آسانتر انجام شود.

تمرین

مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی بسامایش هریک از توابع باضابطه های ذیل:

$$Q(1) y = \frac{2x}{x^2+1}$$

$$(2) y = \frac{x^2-1}{x^2+x+1}$$

$$Q(3) y = \frac{x^2-1}{5x^2-4x}$$

$$(4) y = \frac{x^2-1}{(x-2)^2}$$

$$Q(5) y = \frac{2x-4}{(x-1)^2}$$

$$(6) y = \frac{2x^2+8x+7}{x^2+4x+3}$$

$$Q(7) y = \frac{(x+1)^2}{2x(x-1)}$$

$$(8) y = \frac{4x^2-2x+2}{2(x^2-1)}$$

$$Q(9) y = \frac{2(x-1)^2}{2x(x-2)}$$

$$Q(10) y = \frac{x^2-2x}{x^2-2x-3}$$

$$Q(11) y = \frac{x^2-5x+4}{x^2-4}$$

$$Q(12) y = \frac{2x^2-5x+2}{2(x-1)^2}$$

$$(13) y = \frac{x^2+2x-2}{x^2-2x-2}$$

$$(14) y = \frac{-6x+6}{x^2+3}$$

$$(15) y = \frac{x^2+7x+10}{x^2-3x}$$

$$(16) y = \frac{x^2+21x-11+5}{x^2-2x-3}$$

$$(17) y = \frac{|x^2-4x|}{x^2-4x+3}$$

۱۸- تابع باضابطه  $y = \frac{x^2-2ax+1}{x^2-2bx+1}$  که در آن  $a \neq b$  است مفروض است:

الف- چه رابطه ای بین  $a$  و  $b$  برقرار باشد تا  $M+m=0$  (M) ماکزیمم و

می نیموم تابع است.



ب. به فرض  $a=5$  و  $M+m=0$  جدول تغییرات تابع را پس از تعیین پارامترها

تعیین و منحنی آنرا رسم کنید.

۱۹. مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش  $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x}$  ضمناً معادله

خطی که ماکزیمم را به می‌نموم می‌پیوندد بنویسید.

۲۰. تابع  $y = \frac{x}{x^2 - 5x + 4}$  مفروض است.

الف. منحنی نمایش آنرا رسم کنید.

ب. اگر  $A$  و  $B$  دو نقطه از منحنی باشند که مماس در آنها موزی محور  $x$ ها باشد و  $A$  و  $B$  را به هم بپیوندیم تا خط حاصل منحنی را در نقطه دیگری مانند  $C$  قطع کند. مطوبست مختصات نقطه  $C$ .

ج. معادله مماس در  $C$  را بنویسید. اگر خط اخیر منحنی را در  $D$  قطع کند مختصات نقطه  $D$  را نیز بنویسید.

۲۱. اولاً مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی  $(C)$  نمایش تابع

$$y = \frac{(x-1)^2}{x^2 + x + 1}$$

ثانیاً اگر  $L$  نقطه برخورد منحنی  $(C)$  بامجانب آن باشد معادله خطوطی را که با ضریب زاویه‌ای  $m$  می‌باشند و از  $L$  گذشته‌اند بنویسید هر گاه  $M_1$  و  $M_2$  دو نقطه دیگر برخورد خط مذکور بامنحنی  $(C)$  باشند حدود پارامتر  $m$  را چنان تعیین کنید که دو نقطه برخورد دیگر وجود داشته باشد. در حالت مخصوص که  $M_1$  بر  $M_2$  منطبق است مقادیر  $m$  را تعیین و مواضع  $M_1$  یا  $M_2$  را مشخص کنید.

۲۲. تابع با ضابطه  $y = \frac{x^2 + ax}{x^2 - 4x + 3}$  که در آن  $a$  پارامتر است مفروض است.

اولاً. برحسب مقادیر مختلف پارامتر  $a$  در اشکال مختلف منحنی بحث کنید.

ثانیاً. به ازای  $-4$  یا  $0$  یا  $-2$   $a =$  منحنی‌ها را در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

ثالثاً. به ازای  $-1$   $a =$  و  $-3$   $a =$  منحنی‌ها به چه صورت درمی‌آیند.

۲۳. اگر منحنی  $(C)$  نمایش تابع  $y = \frac{x}{x^2 - 5x + 4}$  را در دستگاه مختصات عمود

برهم رسم کرده باشیم و منحنی را باخط  $y = m$  قطع کنیم تا نقاط  $M_1$  و  $M_2$  بدست آیند و هر گاه  $P_1$  و  $P_2$  تصاویر آن نقاط روی  $x'$  باشند؛

الف. مختصات مرکز مستطیل  $M_1 M_2 P_1 P_2$  را بدست آورید.

ب - تحقیق کنید دایره‌های محیطی مستطیل متغیر  $M_1M_2P_1P_2$  همواره بر دایره ثابتی که مرکز و شعاع آنرا خواهید یافت عمودند.

۲۴- هر گاه تابع  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{a'x^2 + b'x + c'}$  دارای دو مجانب قائم  $D_1$  و  $D_2$  و همچنین

یک ماکزیمم و یک می‌نیموم مانند  $A$  و  $B$  باشد، تحقیق کنید پاره خط  $AB$  بوسیله  $D_1$  و  $D_2$  بد نسبت توافقی تقسیم می‌شود.

۲۵- تابع  $y = \frac{x^2 + \lambda x + 1}{x^2 + x - \lambda}$  مفروض است. هر گاه منحنی (C) نمایش تابع مجانب

افقی‌اش را در  $L$  قطع کند؛

اولاً- تحقیق کنید اگر تابع فوق دارای مرکز تقارن باشد مرکز تقارن همان  $L$  است. ثانیاً- پارامتر  $\lambda$  را چنان تعیین کنید که تابع فوق دارای مرکز تقارن باشد و به ازاء مقدار حاصل  $\lambda$  منحنی (C) را رسم کنید.

۲۶- اولاً - مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی T نمایش تابع:

$$y = \frac{x^2 - 12x + 27}{x^2 - 4x + 5}$$

ثانیاً - اگر خطی بد عرض  $m$  موازی محور  $x$ ها منحنی  $\Gamma$  را در  $M$  و  $M'$  قطع کند و  $P$  و  $P'$  به ترتیب تصاویر قائم  $M$  و  $M'$  روی محور  $x$ ها باشند و  $I$  مرکز مستطیل  $MM'P'P$  فرض شود مختصات نقطه  $I$  را بر حسب  $m$  تعیین کنید و معادله  $E$  مکان هندسی  $I$  را بنویسید و منحنی  $E$  را در همان دستگاه مختصات رسم کنید.

۲۷- اولاً تغییرات تابع  $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 1}$  را تعیین و منحنی  $\Gamma$  نمایش آنرا رسم کنید.

ثانیاً - اگر خط  $y = \lambda$  موازی محور  $x$ ها منحنی  $\Gamma$  را در  $M$  و  $M'$  قطع کند مختصات وسط  $MM'$  را بر حسب پارامتر  $\lambda$  بنویسید معادله  $E$  مکان هندسی نقاط  $P$  را نیز تعیین کنید و منحنی  $E$  را در همان دستگاه مختصات رسم کنید.

۲۸- تابع  $y = \frac{2x(x-m)}{x^2+x-6}$  مفروض است.

(۱) حدود  $m$  را چنان تعیین کنید که تابع فوق دارای ماکزیمم و می‌نیمم باشد.

(۲) به ازاء  $m = 0$  منحنی  $\Gamma$  نمایش تابع را رسم کنید.

(۳) هر خط غیر مشخص  $D$  که از مبدأ مختصات بگذرد منحنی  $\Gamma$  را معمولاً در دو نقطه دیگر

$M$  و  $M'$  قطع می‌کند. اگر  $P$  وسط قطعه خط  $MM'$  باشد نشان دهید که مجموعه  $E$  متشکل از

نقاط  $P$  قسمتی از نمودار تابع  $y = \frac{2x}{1+2x}$  می باشد. منحنی  $E$  را در همان دستگاه مختصات رسم کنید.

### تابعیای گنگ

۷-۲ تعریف - تابع  $y=f(x)$  را گنگ گوئیم در صورتی که عبارت  $f(x)$  نسبت به  $x$

گنگ باشد.

$$y-1 = \sqrt{x-2} \cdot y = \sqrt{-x^2+4x}$$

تابعیای

$$y = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \cdot y = 2x-1 + \sqrt{x^2-1}$$

$$y = \sqrt{x^2-3x}$$

### گنگ هستند

برای تعیین تغییرات يك تابع گنگ مانند  $y = \sqrt{x-2}$  باید عمل می کنیم:

الف - ابتدا فاصله‌هایی از متغیر  $x$  را که تابع در آن معین و پیوسته است تعیین می کنیم.

ب - مشتق تابع را تعیین و ریشه‌های مشتق و علامت مشتق را معلوم کرده بین وسیله نمود

و جدول و ما کریمم و می نیموم تابع را معلوم می کنیم.

ج - اگر منحنی شاخه بی نهایت داشته باشد معادلات خطوط مجانب آن را در صورت وجود

تعیین می کنیم.

د - چند نقطه دیگر از جمله محل برخورد منحنی را با محورهای  $x$  و  $y$  در صورت وجود

و امکان تعیین می کنیم.

ه - جدول تغییرات تابع را تنظیم و از روی آن منحنی نمایش تابع را رسم می کنیم.

توجه - در موقع تعیین ریشه‌های مشتق و یا ریشه‌های  $y=0$ ، در صورتی که معادله گنگ

باشد، باید توجه داشته باشید که ریشه‌های حاصل ریشه خارجی بوده و در فاصله‌ای باشد که

تابع معین است.

مثال ۱- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع :

$$y = 1 - \sqrt{x-2}$$


تابع به ازای مقادیر  $x \geq 2$  معین و پیوسته است.

$$y' = \frac{-1}{2\sqrt{x-2}} < 0 \quad \text{و } x > 2$$

$$\begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow -\infty \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases}$$

$x$	$2$	$\nearrow$	$3$	$\nearrow$	$+\infty$
$y'$	$-\infty$	$-$		$-$	
$y$		$\searrow$	$0$	$\searrow$	$-\infty$

منحنی مجانب ندارد



منحنی در نقطه A بر خط D مماس است.

مثال ۲- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع:

$$y = (x+4) \sqrt{\frac{x}{-x+2}}$$

تابع در فاصله  $0 < x < 2$  معین و پیوسته است.


$$y' = \frac{-x^2 + 3x + 4}{(-x+2)^2 \sqrt{\frac{x}{-x+2}}}$$

ریشه‌های مشتق ۱- و ۴ است که چون در فاصله [۰ و ۲] نیست غیر قابل قبول است.

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}, \begin{cases} x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

$x$	$0$	$\nearrow$	$1$	$\nearrow$	$2$
$y'$	$\infty$		$+$		
$y$	$0$	$\nearrow$	$5$	$\nearrow$	$+\infty$

خط  $x=2$  مجانب قائم منحنی است.



منحنی در مبدأ مختصات بر محور  $y$  ها مماس است.


مثال ۳- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع:  $y = 2 - \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}$

برای اینکه تابع معین باشد باید  $\frac{x-2}{x+1} \geq 0$  یعنی  $x > 2$  یا  $x < -1$  مشتق تابع پس از ساده کردن برابر است با:

$$y' = \frac{-2}{2(x+1)^2 \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}}$$

$x=2$	$x=-4$	$x \rightarrow \pm \infty$	$x \rightarrow -1$	
$y=2$	$y=0$	$y \rightarrow 1$	$y \rightarrow -\infty$	
$x   -\infty$	$x   -4$	$x   -1$	$x   2$	$x   +\infty$
$y'$	-	$-\infty$	$-\infty$	-
$y$	$\searrow$	$\circ$	$-\infty$	$\searrow$
			$2$	

خط  $x=-1$  مجانب قائم و خط  $y=1$  مجانب افقی منحنی است.



منحنی در  $A$  بر خط  $x=2$  مماس است.

مثال ۴- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع :

$$y = x - 2 - \sqrt{x-4}$$

تابع به ازای  $x > 4$  معین پیوسته است. مشتق تابع عبارتست از:

$$y' = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x-4}} = \frac{2\sqrt{x-4} - 1}{2\sqrt{x-4}}$$


$$y' = 0 : \begin{cases} x = \frac{17}{4} \\ y = \frac{7}{4} \end{cases} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

$$x - 2 - \sqrt{x-4} = 0$$

$$x^2 - 5x + 8 = 0$$

این معادله ریشه ندارد پس منحنی محور  $x$ ها را قطع نمی کند.

$x: 4$	$\nearrow$	$\frac{17}{4}$	$\nearrow$	$\infty$
$y': \infty$	-	0	+	
$y: 2$	$\searrow$	$\frac{7}{4}$	$\nearrow$	$+\infty$



منحنی در A بر خط D مماس است.

$$(۱) \quad y = ax + b + \sqrt{cx^2 + dx + e}$$

$$(۲) \quad y = ax + b - \sqrt{cx^2 + dx + e}$$

برای تعیین تغییرات تابعهای فوق مانند سایر توابع گنگ که در مقدمه این بخش ذکر کردیم عمل می‌کنیم و منحنی نمایش آنها را با استفاده از جدول تغییرات آنها رسم می‌کنیم. منتهی چون منحنی نمایش هر یک از تابعهای فوق یکی از مقاطع مخروطی است توضیح بیشتری درباره آنها می‌دهیم و سپس به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

بر حسب آنکه  $\Delta = d^2 - 4ce$  و همچنین ضریب  $c$  مثبت، منفی یا صفر باشد جدول زیر

را داریم:

عبارت زیر هر یک از رادیکالها همواره منفی است و تابعهای (۱) و (۲) همواره ناسامعین‌اند و نموداری ندارند.	} $\Delta < 0$	} $c < 0$ : الف
عبارت زیر رادیکال به ازای جميع مقادیر $x$ به استثناء $x_0 = -\frac{d}{2c}$ همواره منفی است و در نتیجه تابع نامعین است و نمودار آن فقط نقطه $A(x_0, ax_0 + b)$ می‌باشد.		
عبارت زیر رادیکال دارای دو ریشه $x_1$ و $x_2$ است، $x_1 < x_2$ ، و تابعها در فاصله $[x_1, x_2]$ معین و پیوسته‌اند و نمودار آنها شاخه بی‌نهایت ندارد و نیمی از بیضی (یا در حالت خاص دایره) است.	} $\Delta > 0$	
$e > 0$ : نمودار هر یک از دو تابع خط مستقیم است.		
$e < 0$ : هر یک از دو تابع همواره نامعین است و نمودار ندارد.	} $d = 0$	
هر یک از دو تابع به ازای $x > -\frac{e}{d}$ معین و پیوسته است و نمودار هر یک يك شاخه بی‌نهایت دارد ولی دارای مجانب نیست (نیمی از سهمی)		
هر یک از دو تابع به ازای $x < -\frac{e}{d}$ معین و پیوسته است و نمودار هر یک يك شاخه بی‌نهایت دارد ولی دارای مجانب نیست (نیمی از سهمی)	} $d > 0$	} $e = 0$ : ب
عبارت زیر رادیکال همواره مثبت است و هر یک از دو تابع همواره معین و پیوسته است. هر منحنی دارای شاخه بی‌نهایت است و دو مجانب دارد (نیمی از هذلولی)		
	} $d < 0$	} $\Delta < 0$

$$\left. \begin{array}{l} \text{عبارت زیر رادیکال مجذور کامل است و نمودار هریک از دو تابع} \\ \text{خطی شکسته است.} \end{array} \right\} \Delta = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{ج: } c > 0 \\ \text{عبارت زیر رادیکال دارای ریشه‌های } x_1 \text{ و } x_2 \text{ بوده و در فاصله } [x_1, +\infty) \\ \text{و } ]-\infty, x_2] \text{ مثبت و هریک از دو تابع در فاصله‌های مذکور معین} \\ \text{و پیوسته و منحنی نمایش هریک از دو تابع دارای شاخه بی‌نهایت} \\ \text{است و دوجانب دارد (نیمی از هذلولی)} \end{array} \right\} \Delta > 0$$

بطور خلاصه اگر  $c < 0$  معمولاً منحنی نیمی از بیضی است و اگر  $c = 0$  منحنی نیمی از سهمی است و اگر  $c > 0$  منحنی معمولاً نیمی از هذلولی است.

یادآوری- در حالت  $c > 0$  هرگاه تابه‌های (۱) و (۲) را به صورت:

$$(1) \quad y = ax + b + \sqrt{(px + q)^2 + 1}$$

$$(2) \quad y = ax + b - \sqrt{(px + q)^2 + 1}$$

که در آن  $p > 0$  در آوری در بخش مربوط به مجانب دیدیم هریک از دو تابع دارای دوجانب به معادله‌های زیر می‌باشد:

تابع (۱) دارای مجانبهای:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 = ax + b - (px + q) \\ x \rightarrow -\infty \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} y_1 = ax + b + (px + q) \\ x \rightarrow +\infty \end{array} \right.$$

تابع (۲) دارای مجانبهای:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_2 = ax + b - (px + q) \\ x \rightarrow +\infty \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} y_2 = ax + b + (px + q) \\ x \rightarrow -\infty \end{array} \right.$$

مثال ۱- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع:

$$y = 3 - \sqrt{-x^2 + 4}$$

باید  $0 < -x^2 + 4$  یا  $-2 < x < 2$  باشد تا تابع معین باشد.


$$y' = \frac{-2x}{2\sqrt{-x^2+4}}, \quad y' = 0 : \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 3 \end{cases} , \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

معادله  $y = 0$  ریشه ندارد.

x	-2	↗	0	↘	2
y'	∞	-	0	+	∞
y	3	↘	3	↗	3





نمودار فوق نیم‌دایره است که در  $A_1$  و  $A_2$  بر  $D_1$  و  $D_2$  مماس است.

مثال ۲- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی تابع:


$$y = \sqrt{-4x^2 + 8x}$$

باید  $-4x^2 + 8x \geq 0$  یعنی  $x$  باید در فاصله  $[0, 2]$  باشد تا تابع معین باشد:

$$y' = \frac{-4x + 4}{\sqrt{-4x^2 + 8x}}$$

$$y' = 0 : \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases} \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \begin{cases} x=2 \\ y=0 \end{cases}$$

$x$	$0$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$2$
$y'$	$\infty$	$+$	$0$	$-$	$\infty$
$y$	$0$	$\nearrow$	$2$	$\searrow$	$0$



منحنی نیم بیضی است و در  $O$  بر محور  $y$ ها و در  $A$  بر خط  $x=2$  مماس است.

مثال ۳- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع:

$$y = x - 2 + \sqrt{-x^2 + 4x}$$

تابع به ازای مقادیر فاصله  $[0, 4]$  معین و پیوسته است. مشتق پس از ساده کردن می شود:

$$y' = \frac{-x + 2 + \sqrt{-x^2 + 4x}}{\sqrt{-x^2 + 4x}}$$

معادله  $y' = 0$  یعنی  $-x + 2 + \sqrt{-x^2 + 4x} = 0$  دو ریشه  $2 - \sqrt{2}$  و  $2 + \sqrt{2}$  دارد که در آن  $2 - \sqrt{2}$  ریشه خارجی است و ریشه مشتق تنها عدد  $2 + \sqrt{2}$  است.


از معادله  $y = 0$  برای  $x$  دو عدد  $2 + \sqrt{2}$  و  $2 - \sqrt{2}$  بدست می آید که در آن  $2 + \sqrt{2}$

خارجی و ریشه واقعی معادله  $2 - \sqrt{2}$  است. بنابراین داریم:

$$y' = 0 : \begin{cases} x = 2 + \sqrt{2} \\ y = 2\sqrt{2} \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2 - \sqrt{2} \\ y = 0 \end{cases}$$

برای تعیین علامت مشتق در هر فاصله عددی را که ریشه مشتق نباشد در مشتق قرار دهید تا علامت مشتق به ازای آن معلوم شود.

$x$	$0$	$\nearrow$	$2 - \sqrt{2}$	$\nearrow$	$2 + \sqrt{2}$	$\nearrow$	$4$
$y'$	$\infty$		$+$		$0$	$-$	$\infty$
$y$	$-2$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$2\sqrt{2}$	$\searrow$	$2$



منحنی نیم بیضی است و بر محور  $y$ ها و بر خط  $D$  مماس است.

مثال ۴- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی تابع :

$$y = x + 1 + \sqrt{x+3}$$


تابع به ازای  $x \geq -3$  معین و پیوسته است:

$$y' = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x+3}} > 0$$

از معادله  $y = 0$  بدست می آید  $x = 1$  و  $x = -2$  که  $x = 1$  ریشه خارجی معادله است پس ریشه  $y = 0$  همان  $-2$  است.

$$\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} x=0 \\ y=1+\sqrt{3} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x=-2 \\ y=0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x=-3 \\ y=-2 \end{array} \right. \end{array}$$

$x$	$-3 \nearrow$	$-2 \nearrow$	$0$	$\nearrow +\infty$
$y'$			$+$	
$y$	$-2 \nearrow$	$0$	$\nearrow \sqrt{3}+1$	$\nearrow +\infty$



منحنی فوق نیم سهمی است و در  $A$  برخط  $D$  مماس است.

مثال ۵- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع:

$$y = 2 - \sqrt{x^2 + 2x + 2}$$

چون  $x^2 + 2x + 4$  ریشه ندارد یعنی  $\Delta < 0$ ، تابع همواره معین و پیوسته است.

$$y' = \frac{-2x-2}{2\sqrt{x^2+2x+4}}, \quad y' = 0 : \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 - \sqrt{3} \end{cases}$$

ریشه‌های معادله  $y = 0$  عبارتست از  $x = 0$  و  $x = -2$  که هر دو قابل قبولند.


$$\begin{cases} x = -2 \text{ یا } 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow -\infty \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty \end{cases}$$

برای تعیین مجانبها می‌نویسیم:  $y = 2 - \sqrt{(x+1)^2 + 3}$  پس مجانبها عبارتند از:

$$\begin{cases} Y_1 = 2 - (x+1) \\ x \rightarrow +\infty \end{cases}, \quad \begin{cases} Y_2 = 2 + (x+1) \\ x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

یا:  $Y_1 = -x + 1$  و  $Y_2 = x + 3$

$x$	$-\infty$	$\nearrow$	$-2$	$\nearrow$	$-1$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$+\infty$
$y'$			$+$		$0$		$-$		
$y$	$-\infty$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$2 - \sqrt{3}$	$\searrow$	$0$	$\searrow$	$-\infty$



محسی به هندزوی است.

مثال ۶- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی تابع با ضابطه

$$y = x + 1 + \sqrt{x^2 + 4x - 5}$$

تابع به ازاء  $0 \leq x^2 + 4x - 5$  یعنی به ازاء  $x \leq -5$  یا  $x \geq 1$  معین و پیوسته است. مشتق پس از ساده کردن می شود:

$$y' = \frac{\sqrt{x^2 + 4x - 5} + x + 2}{\sqrt{x^2 + 4x - 5}}$$

معادله  $y' = 0$  ریشه ندارد.

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ y = 2 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} x = -5 \\ y = -4 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty + \infty = -1 \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty \end{array} \right\}$$


هرگاه بنویسیم  $y = x + 1 + \sqrt{(x+2)^2 - 9}$  مجانبها عبارتند از:

$$Y = x + 1 \pm (x + 2)$$

$$Y = -1 \text{ و } Y = 2x + 3$$

یا:

x	$-\infty$	-5	1	$+\infty$
y'	-			+
y	-1 ↘	-4		2 ↗ $+\infty$



منحنی نیم هذلولی است و برخطهای  $D_1$  و  $D_2$  مماس است.

تمرین

الف - مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش هر یک از تابعهای زیر:

۱)  $y = \sqrt{x+2}$

۲)  $y = \sqrt{-x+4}$

۳)  $y = 2 - \sqrt{x-3}$

۴)  $y = \sqrt{1-x}$

۵)  $y = \sqrt{2-|x|}$

۶)  $y = x - \sqrt{x}$

۷)  $y = x + \sqrt{x}$

۸)  $y = \sqrt{-x^2 + 6x + 9}$

۹)  $y = \sqrt{-x^2 - x + 2}$

۱۰)  $y = \sqrt{-2x^2 + 16x - 3}$

۱۱)  $y = 1 + \sqrt{-x^2 + 4x}$

۱۲)  $y = 1 - \sqrt{-4x^2 + 9}$

۱۳)  $y = \sqrt{-x^2 + 6x + x}$

۱۴)  $y = x - \sqrt{-x^2 + 6x}$

۱۵)  $y = \sqrt{x^2 - 4x + 9}$

۱۶)  $y = \sqrt{x^2 - 4x - 5}$

۱۷)  $y = x - \sqrt{x^2 - 2x}$

۱۸)  $y = x + 1 + \sqrt{x^2 + 4x + 4}$

۱۹)  $y = 5(x+4) + 2\sqrt{x(x+8)}$

۲۰)  $y = \sqrt{x^2 + 2|x|}$

ب - جدول تغییرات هر یک از دو تابع  $y_1$  و  $y_2$  را نوشته و منحنی نمایش آنها را در یک

دستگاه مختصات قائم رسم کنید:

۲۱)  $y_1 = x + \sqrt{-x^2 + 8}$  و  $y_2 = x - \sqrt{-x^2 + 8}$

۲۲)  $y_1 = \frac{1}{4}(x+3 + \sqrt{-3x^2 + 6x + 9})$  و

$y_2 = \frac{1}{4}(x+3 - \sqrt{-3x^2 + 6x + 9})$

۲۳)  $y_1 = x + 1 + \sqrt{x^2 + 1}$  و  $y_2 = x + 1 - \sqrt{x^2 + 1}$

ج - بدازاء مقادیر مختلف  $\lambda$  در اشکال مختلف منحنیهای نمایش هر یک از تابعهای زیر

بحث کنید:

۲۴)  $y = \sqrt{\lambda x^2 - (\lambda + 1)}$

۲۵)  $y = \sqrt{(x+1)^2 + \lambda x}$

د - مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش هر یک از تابعهای زیر:

۲۶)  $y = 2x\sqrt{1-x^2}$

۲۷)  $y = (4x^2 - 1)\sqrt{1-x^2}$

$$۲۸) y = \frac{x}{\sqrt{a-x^2}}$$

$$۲۹) y = \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}} \quad \alpha 1$$

$$۳۰) y = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+1}} \quad \alpha 1$$

$$۳۱) y = x \sqrt{\frac{x}{1-x}}$$

$$۳۲) y = x \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

$$۳۳) y = \sqrt{\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{2}}$$

$$۳۴) y = \sqrt{\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{2}}$$

تابعهای مثلثاتی

۹-۲ - تعریف - تابع مثلثاتی تابعی از متغیر حقیقی  $x$  است که در آن خطوط مثلثاتی قوس  $x$  یا

خطوط مثلثاتی قوسهای  $\frac{p}{q}x$  (p و q اعدادی درست اند و  $q \neq 0$ ) بکار رفته باشد. مثل:

$$f(x) = \sin x + \cos x \quad f(x) = \operatorname{tg} x \quad f(x) = \cos x \quad f(x) = \sin x$$

$$f(x) = x - \cos x \quad f(x) = x + \sin x \quad f(x) = \sin \frac{x}{p} - \cos \frac{x}{q}$$

$$f(x) = \sin 2x + \cos 2x - 1 \quad f(x) = \operatorname{tg} x - \operatorname{cotg} x$$

در این بخش بیشتر در مورد تابعهای مثلثاتی که در آن فقط خطوط مثلثاتی کمان  $x$  یا  $\frac{p}{q}x$

بکار رفته باشد مطالبی بیان می کنیم و از ذکر تابعهای مثلثاتی که در آن علاوه بر خطوط مثلثاتی خود قوس  $x$  نیز بکار رفته باشد خودداری می کنیم.

۱۰-۲ - تابع متناوب - تابع  $y = f(x)$  را متناوب گوئیم در صورتی که عددی مانند

$t \neq 0$  وجود داشته باشد به قسمی که اولاً اگر  $x \in D_f$  آنوقت  $x+t \in D_f$ ، ثانیاً رابطه:

$$f(x) = f(x+t)$$

اگر يك كوچكترين  $t$  مثبت موجود باشد که در شرایط فوق صدق کند، آن  $t$  را معمولاً با

$T$  نشان داده و دوره تناوب تابع  $f$  می نامیم.

مثال ۱- تابع مثلثاتی  $y = \sin x$  دارای دوره تناوب  $T = 2\pi$  می باشد زیرا می دانیم:

$$\sin x = \sin(x + 2k\pi)$$

که در آن  $k$  عددی درست است.

حال اگر  $k = 1$  خواهیم داشت:

$$\sin x = \sin(x + 2\pi)$$

بنابراین کمترین مقدار مثبت  $2k\pi$  مقدار  $2\pi$  است پس  $T = 2\pi$ .

مثال ۲- تابع مثلثاتی  $y = \cos x$  دارای دوره تناوب  $T = 2\pi$  می باشد. زیرا:

$\cos x = \cos(x + 2k\pi)$  و در نتیجه بازای  $k = 1$  داریم:  $\cos x = \cos(x + 2)$  و کمترین

مقدار مثبت  $2k\pi$  در ازای  $k = 1$  حاصل می شود. پس  $T = 2\pi$  می باشد.

مثال ۳- دوره تناوب تابع  $y = \operatorname{tg} x$  برابر  $T = \pi$  می باشد زیرا داریم:

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}(x + k\pi)$$

و در ازاء  $k = 1$  کمترین مقدار مثبت  $k\pi$  حاصل می شود.

مثال ۴- دوره تناوب  $y = \operatorname{cotg} x$  برابر  $T = \pi$  است زیرا داریم:

$$\operatorname{cotg} x = \operatorname{cotg}(x + k\pi)$$

و کمترین مقدار مثبت  $k\pi$  در ازاء  $k = 1$  بدست می آید.

مثال ۵- دوره تناوب تابعهای  $y = \sin \frac{a}{b}x$  و  $y = \cos \frac{a}{b}x$ ، عبارتست از:

$$T = 2\pi : \frac{a}{b} = \frac{2\pi b}{a}$$

زیرا داریم:

$$\sin \left[ \frac{a}{b} \left( x + \frac{2k\pi b}{a} \right) \right] = \sin \left( \frac{a}{b} x + 2k\pi \right) = \sin \frac{a}{b} x$$

$$\cos \left[ \frac{a}{b} \left( x + \frac{2k\pi b}{a} \right) \right] = \cos \left( \frac{a}{b} x + 2k\pi \right) = \cos \frac{a}{b} x$$

و در ازاء  $k = 1$  داریم:

$$T = \frac{2\pi b}{a}$$

مثال ۶- دوره تناوب تابعهای  $y = \operatorname{tg} \frac{a}{b}x$  و  $y = \operatorname{cotg} \frac{a}{b}x$ ، عبارتست از:

$$T = \pi : \frac{a}{b} = \frac{\pi b}{a}$$

زیرا:

$$\operatorname{tg} \left[ \frac{a}{b} \left( x + \frac{k\pi b}{a} \right) \right] = \operatorname{tg} \left( \frac{a}{b} x + k\pi \right) = \operatorname{tg} \frac{a}{b} x$$

$$\operatorname{cotg} \left[ \frac{a}{b} \left( x + \frac{k\pi b}{a} \right) \right] = \operatorname{cotg} \left( \frac{a}{b} x + k\pi \right) = \operatorname{cotg} \frac{a}{b} x$$

مثال ۷- برای تعیین دوره تناوب تابع  $y = \sin 2x + \cos 6x$  داریم:



$$T_1 = 2\pi : 2 = \frac{\pi}{2} \quad : \text{ عبارتست از } \sin 2x$$

$$T_2 = 2\pi : 6 = \frac{\pi}{3} \quad : \text{ عبارتست از } \cos 6x$$

اگر  $T_1$  و  $T_2$  را متحداً مخرج کنیم می‌شود  $T_1 = \frac{2\pi}{6}$  و  $T_2 = \frac{3\pi}{6}$  و چون کوچکترین

مضرب مشترك ۳ و ۲ برابر ۶ است و داشتیم  $T_1 = 3 \times \frac{\pi}{6}$  و  $T_2 = 2 \times \frac{\pi}{6}$  پس  $T = 6 \times \frac{\pi}{6}$  یعنی دوره تناوب تابع فوق  $T = \pi$  می‌باشد.

**مثال ۸-** تعیین دوره تناوب تابع  $y = \sin \frac{1}{4}x + \cos \frac{1}{6}x$  . دوره تناوب تابع

$\cos \frac{1}{6}x$  برابر است با  $T_1 = 2\pi : \frac{1}{6} = 12\pi$  و دوره تناوب تابع  $\sin \frac{1}{4}x$  برابر است با

$T_2 = 2\pi : \frac{2}{3} = 3\pi$  . چون کوچکترین مضرب مشترك بین ۱۲ و ۳ عبارت است از ۱۲ پس

$$T = 12 \times \pi = 12\pi$$

#### ۱۱-۲- تعیین تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع مثلثاتی متناوب

برای رسم منحنی (C) نمایش تابع مثلثاتی متناوب  $y = f(x)$  ابتدا منحنی (C<sub>۰</sub>) نمایش

تابع مذکور را بوسیله جدول تغییرات آن در یکی از فاصله‌های تناوب مثلاً  $(a, a+T)$

رسم نموده سپس منحنی حاصل را به اندازه بردار  $\vec{V}$  موازی محور  $x$  ها که اندازه

جبری آن روی محور  $x$  ها  $kT$  ( $k$  عددی درست است) می‌باشد انتقال می‌دهیم هرگاه به  $k$

اعداد درست بدهیم و عمل را ادامه دهیم منحنی (C) نمایش تابع رسم می‌شود.

مثلاً اگر (C<sub>۰</sub>) نمایش تابع  $y = \sin x$  در فاصله  $[0, 2\pi]$  (شکل بعد) و  $M_0$

نقطه‌ای از آن به مختصات  $(x_0, \sin x_0)$  باشد هرگاه نقطه  $M_0$  را به اندازه بردار  $\vec{V}$  موازی

محور  $x'$  که اندازه جبری آن  $2k\pi$  (در شکل اندازه جبری بردار  $2k\pi$  را  $2\pi$  اختیار


کرده ایم) می‌باشد انتقال دهیم نقطه  $M_1(x_1, y_1)$  بدست می‌آید.

داریم:

$$x_1 = x_0 + k \cdot 2\pi$$

$$y_1 = y_0 = \sin x_0 = \sin(x_0 + 2k\pi) = \sin x_0$$

و چون مختصات  $M_1$  در معادله  $y = \sin x$  صدق می‌کند پس  $M_1$  متعلق به نمودار است.



توجه: واحد اندازه گیری کمان  $x$  را روی محور  $x$  ها همیشه با رادیان تعیین کنید.

نکته مهم- در بررسی تغییرات تابعهای مثلثاتی شامل تنازانت یا کتانزانت باید مقادیری

از متغیر را که درازای آن  $y \rightarrow +\infty$  یا  $y \rightarrow -\infty$  نیز تعیین کرد. همچنین باید توجه کرد که این گونه

تابعها معمولاً مجانب قائم دارند و باید معادله های آنها را بدست آورد. مثلاً در تابع  $y = a \tan px + b$

هر گاه  $x \rightarrow \frac{k\pi}{p} + \frac{\pi}{2p}$  داریم  $y \rightarrow \pm \infty$  و خطهای به معادله  $x = \frac{k\pi}{p} + \frac{\pi}{2p}$  مجانبهای

قائم منحنی تابع می باشند.

مثال ۱- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع  $y = 2 \sin^2 x - 5 \sin x + 2$

در فاصله  $[0, 2\pi]$

تابع همواره معین و اتصالی است. مشتق آن می شود:

$$y' = 4 \sin x \cos x - 5 \cos x = \cos x (4 \sin x - 5)$$


عامل  $(4 \sin x - 5)$  همواره منفی است، بنابراین علامت مشتق مخالف علامت  $\cos x$  می باشد.

ریشه های  $\cos x = 0$  عبارتست از:  $\frac{\pi}{2}$  و  $\frac{3\pi}{2}$

ریشه های قابل قبول  $y = 0$  عبارتست از ریشه های  $\sin x = \frac{1}{4}$

$$y' = 0 : \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} \text{ یا } x = \frac{3\pi}{2} \\ y = -1 \text{ و } y = 9 \end{cases}, \begin{cases} x = 0 \text{ یا } 2\pi \\ y = 2 \end{cases}, \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} \text{ یا } \frac{5\pi}{6} \\ y = 0 \end{cases}$$

$x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$y'$		-	0	+	0	-
$y$	2	↘ 0	↘ -1	↗ 0	↗ 9	↘ 2



مثال ۲- تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع:  $y = \frac{1 - \sin X}{2 \sin X - 1}$  در فاصله  $[-\pi, \pi]$


دوره تناوب تابع  $2\pi$  است. تابع به ازای ریشه‌های  $\sin X = \frac{1}{2}$  انفصالی است بنابراین  $x = \frac{\pi}{6}$  و

$x = \frac{5\pi}{6}$  مجانبهای قائم منحنی می‌باشند.

تابع در این فاصله به ازای مقادیر  $x \neq \frac{\pi}{6}$  و  $x \neq \frac{5\pi}{6}$  معین و پیوسته است:

$$y' = \frac{-\cos X}{(2 \sin X - 1)^2}, \quad y' = 0 : \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} \text{ یا } x = -\frac{\pi}{2} \\ y = 0 \text{ و } y = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

$\begin{cases} x = \pi \text{ یا } -\pi \\ y = -1 \end{cases}$	$\begin{cases} x \rightarrow \frac{\pi}{6} \text{ یا } \frac{5\pi}{6} \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases}$	$\begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases}$					
$x$	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$0$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\Delta\pi}{6}$	$\pi$
$y'$	$+$	$0$	$-$	$-$	$0$	$+$	$+$
$y$	$-1 \nearrow$	$-\frac{\pi}{2} \searrow -1 \searrow$	$-\infty$	$+\infty \searrow$	$0 \nearrow$	$+\infty$	$-\infty \nearrow -1$




مثال ۳- تعیین تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع  $y = \cos \pi x$  در فاصله یکی از دوره‌های تناوب آن تابع فوق همواره معین و پیوسته است. دوره تناوب آن  $\pi = 2 : T = 2\pi$  می‌باشد پس تغییرات تابع را مثلا در فاصله  $[-1, 1]$  تعیین می‌کنیم.

$$y' = -\pi \sin \pi x = 0 \Rightarrow x = -1 \text{ یا } 1 \text{ یا } 0$$

$$y=0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ یا } -\frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} x = 1 \text{ یا } -1 \\ y = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 0 \\ y = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} \text{ یا } -\frac{1}{2} \\ y = 0 \end{cases}$$

x	-1		$-\frac{1}{2}$	0	$+\frac{1}{2}$		+1
y'	0		+	0	-		0
y	-1		↗	0	↘		-1



**لبصره -** برای تعیین تغییرات و رسم منحنی نمایش بعضی از توابع مثلثاتی نیازی به تعیین مشتق و علامت آن نیست و کمترین مقدار و بیشترین مقدار و صعود و نزول تابع را می توان در فاصله مورد نظر تعیین نمود. مثلا در مثال بالا می دانیم کسینوس قوس از  $\pi -$  تا صفر صعودی و از صفر تا  $\pi$  نزولی است و ما کزیمم و می نیموم آن ۱ و ۱- می باشد.

### تمرین

الف - دوره تناوب هر یک از تابعهای زیر را تعیین و منحنی نمایش هر یک را در فاصله یکی از دوره های تناوب رسم کنید:

۱)  $y = \sin x$

۲)  $y = \cos x$

۳)  $y = \lg x$

۴)  $y = \cot g x$

۵)  $y = 3 \cos 4x$

۶)  $y = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}$

$$۷) y = ۲ \sin \frac{x}{۳}$$

$$۸) y = \frac{1}{۳} \sin ۴\pi x$$

$$۹) y = \operatorname{tg} \frac{\pi}{۴} x$$

$$۱۰) y = \operatorname{tg} ۲x + ۱$$

$$۱۱) y = ۲ \operatorname{cotg} \pi x$$

$$۱۲) y = ۲ \sin \frac{\pi}{۳} x$$

$$۱۳) y = ۲ \cos(x - \frac{\pi}{۴})$$

$$۱۴) y = ۲ \cos ۳\pi(x + \frac{1}{۶})$$

$$۱۵) y = \cos \pi x - ۲ \sin \frac{\pi}{۴} x - ۱$$

ب - تعریف - دامنه (Amplitude) يك تابع مثلثاتی متناوب عبارتست از قدر مطلق نصف تفاضل ماکزیم و می‌نیموم آن در فاصله‌ای به طول يك دوره تناوب، مثلا در تابع  $y = a \sin x + b$  دامنه آن برابر  $|a|$  است زیرا :

$$\text{Max یا Min} = a + b$$

$$\text{Min یا Max} = -a + b$$

$$a + b - (-a + b) = ۲a \Rightarrow A = |a|$$

۱۶- تابعهایی بصورت  $a \sin bx$  و  $a \cos bx$  بنویسید که:

(I) دامنه آنها ۳ و دوره تناوب آنها  $۴\pi$  و  $f(0) = 0$ .

(II) دامنه آنها ۵ و دوره تناوب آنها ۱ و  $f(0) = 5$ .

(III) دامنه آنها  $۰,۲$  و دوره تناوب آنها  $\frac{1}{512}$  و  $f(0) = 0$ .

۱۷- دوره تناوب تابع  $f(x) = \sin \frac{۲}{۳} x + \cos \frac{۳}{۴} x$  را تعیین کنید.

۱۸- دوره تناوب تابع  $f(x) = \operatorname{tg} \frac{p}{q} x + \operatorname{cotg} \frac{p}{q} x$  را که در آن  $p$  و  $q$  اعداد درست

و مثبت و نسبت به هم اولند تعیین کنید.

ج - مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش هر يك از تابعهای زیر در یکی از

فاصله‌های دوره تناوب.

$$۱۹) y = \frac{\cos x - 1}{۲ \cos x + 1}$$

$$۲۰) y = \frac{۲ \sin x - \sqrt{3}}{-\sin x + 1}$$

$$۲۱) y = \frac{\operatorname{tg} x - \sqrt{3}}{\operatorname{tg} x - 1}$$

$$۲۲) y = \frac{۲ \sin x + 1}{\sin x + ۲}$$

$$۲۳) y = \left( \frac{\cos x - 1}{۲ \cos x + 1} \right)^۲$$

$$۲۴) y = ۲ \cos^۲ x - ۲ \cos x + ۱$$

$$۲۵) y = \frac{۲ \sin X - ۱}{۲ \cos X + ۱}$$

$$۲۶) y = \cos ۲X + ۳ \sin X - ۲$$

$$۲۷) y = \frac{۱}{۱ + \cos ۲X} - \operatorname{tg} X$$

$$۲۸) y = \operatorname{tg} X + \operatorname{cotg} X$$

$$۲۹) y = \sec X + \operatorname{cosec} X$$

$$۳۰) y = \cos X + |\sin X|$$

$$۳۱) y = \operatorname{tg} \left( ۲X - \frac{\pi}{۴} \right)$$

$$۳۲) y = \sin X + |\cos X|$$

د - مطلوبست تعیین تغییرات تابعهای زیر در فاصله  $[0, ۲\pi]$ :

$$۳۳) y = \sin X (۱ + \cos X)$$

$$۳۴) y = \cos X + \frac{۱}{۴} \cos ۲X$$

$$۳۵) y = \sqrt{۳ \sin X + \cos X} - ۲$$

ه - در یکی از فاصله‌های دوره تناوب جدول تغییرات تابعهای زیر را تعیین و منحنی نمایش

هر یک را رسم کنید.

$$۳۶) y = \sin X + \frac{۱}{۴} \sin ۲X + \frac{۱}{۳} \sin ۳X$$

$$۳۷) y = \frac{\cos ۳X}{\sin ۲X}$$

$$۳۸) y = \operatorname{tg} X \cdot \operatorname{tg} ۲X$$

$$۳۹) y = \frac{\cos X}{۲ \operatorname{tg} X}$$

$$۴۰) y = \frac{\cos X}{\operatorname{tg} ۲X}$$

$$۴۱) y = \sin ۳X \cdot \sin X$$

$$۴۲) y = \frac{\sin X \cos X + ۱}{\sin X + \cos X}$$

$$۴۳) y = \frac{\cos X}{۲ \cos X - ۱}$$

$$۴۴) y = \frac{\sin X - \cos X}{\sin ۲X}$$

$$۴۵) y = \frac{۱ - ۲|\sin X|}{۲ + \sin X} \text{ و } 0 \leq X \leq ۲\pi$$

$$۴۶) y = \frac{۲ \sin^۳ X - \sin X - ۱}{\sin X + ۱}$$

$$۴۷) y = \cos^۳ X + ۲ \sin X \cos X - \sin^۳ X$$

$$۴۸) y = \frac{\sin X - \cos X}{\cos^۳ X}$$

$$۴۹) y = \cos X (\operatorname{tg}^۳ X - ۱)$$

۵۰ - تغییرات تابع  $y = \frac{\sin \pi X}{\sin \frac{\pi X}{۲} - \cos \frac{\pi X}{۲}}$  را در فاصله  $۲ \leq X \leq ۲$  بررسی کنید.

۵۱- مطلوبست تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع زیر در فاصله [۰, ۸]

$$y = \frac{\sin \frac{\pi x}{4} - \cos \frac{\pi x}{4}}{\sin \frac{\pi x}{4}}$$

۱۲۴

مقایسه یک یا چند عدد با ریشه‌های معادله درجه دوم

۲-۱۳- مقایسه با استفاده از نمودار - اگر معادله درجه دوم پارامتری:

$$F(x, m) = 0 \quad (1)$$

دا که در آن  $x$  از درجه دوم و  $m$  پارامتر است داشته باشیم و بخواهیم اعداد معلومی مانند  $\alpha$  و  $\beta$  ... را با ریشه‌های آن وقتی که پارامتر  $m$  تغییر کند مقایسه کنیم، ابتدا  $m$  را بر حسب  $x$  از معادله (۱) تعیین می‌کنیم تا  $m = f(x)$  بدست آید، آنگاه با توجه به اینکه ریشه‌های معادله (۱) همان طولهای نقاط برخورد منحنی (C) به معادله  $y = f(x)$  با خط (D) به معادله  $y = m$  می‌باشد، منحنی (C) و خطهای  $x = \alpha$  و  $x = \beta$  را در یک دستگاه مختصات رسم نموده از روی شکل معلوم می‌کنیم به ازای مقادیر مختلف پارامتر  $m$  چه موقع خط (D) منحنی (C) را قطع می‌کند و وضع طولهای نقطه‌های برخورد منحنی و خط را با اعداد  $\alpha$  و  $\beta$  ... مشخص می‌کنیم.

معمولا جدولی جهت  $m$  تنظیم می‌کنیم که در آن مقادیر  $m$  را از  $-\infty$  تا  $+\infty$  به ترتیب می‌نویسیم. به خصوص مقادیر ماکزیمم و مینیمم، در صورت وجود، و مقادیر  $f(\alpha)$  و  $f(\beta)$  ... (عرض نقاط برخورد خطوط  $x = \alpha$  و  $x = \beta$  با منحنی C)، عرض مجانب افقی تابع (اگر وجود داشته باشد) را در آن جدول وارد می‌کنیم. سپس در هر فاصله خط  $y = m$  را در شکل رسم نموده وضع طولهای برخورد خط (D) و منحنی (C) را نسبت به اعداد  $\alpha$  و  $\beta$  مشخص نموده و نتیجه را در جدول می‌نویسیم.

یادآوری - اگر معادله  $F(x, m) = 0$  بر حسب  $x$  از درجه دوم نباشد و خواسته باشیم عددی را با ریشه‌های آن مقایسه کنیم، باز به همین منوال که در بالا گفته شد عمل می‌کنیم.

مثال ۱- مقایسه ریشه‌های معادله  $x^2 - (m-1)x + 1 = 0$  به ازای مقادیر مختلف  $m$  با عدد ۲.

$$m = \frac{x^2 + x + 1}{x}$$

ابتدا  $m$  را بر حسب  $x$  بدست می‌آوریم:



همانطور که گفته شد ریشه‌های معادله فوق طولهای نقاط برخورد منحنی (C) به معادله


$y = \frac{x^2 + x + 1}{x}$  و خط (D) به معادله  $y = m$  می‌باشد. حال منحنی (C) را رسم می‌کنیم:

$$y' = \frac{x^2 - 1}{x^2}, y' = 0 : \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}, \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \begin{cases} x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases} \begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{5}{2} \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
y'		+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -1 \searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow 2 \nearrow$	$\frac{5}{2} \nearrow$

منحنی دارای مجانب قائم  $x = 0$  و مجانب مایل  $y = x + 1$  می‌باشد.



از روی شکل بالا جدول زیر را داریم:

m	$-\infty$	-1	3	3/5	$+\infty$
R	$x' < x'' < 2$	ریشه ندارد	$x' < x'' < 2$	$x' < 2 < x''$	
	خط $D_1$	خط $D_2$	خط $D_3$	خط $D_4$	

$$x' = x'' < 2 \quad x' = x'' < 2 \quad x' < x'' = 2$$

$$\text{خط } D_1 \quad \text{خط } D_2 \quad \text{خط } D_3$$

مثال ۲ - مقایسه اعداد دهه با ریشه‌های معادله پارامتری:

$$2x^2 - 2mx + (m+4) = 0$$

$$m = \frac{2x^2 + 4}{2x - 1} \Rightarrow \begin{cases} \text{(C)} & y = \frac{2x^2 + 4}{2x - 1} \\ \text{(D)} & y = m \end{cases}$$


تابع به ازای  $x \neq \frac{1}{2}$  مین و پیوسته است.

$$y' = \frac{4x^2 - 4x - 4}{(2x-1)^2}, \quad y' = 0 : \begin{cases} x = 2 \text{ یا } -1 \\ y = 4 \text{ یا } -2 \end{cases}$$

$$A \begin{cases} x = 0 \\ y = -4 \end{cases} \quad B \begin{cases} x = 5 \\ y = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow \frac{1}{2} \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	0	$\frac{1}{2}$	2	5	$+\infty$
y'		+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -2$	$\searrow -4$	$\searrow -\infty$	$\parallel +\infty$	$\searrow 4$	$\nearrow 6$

منحنی تابع بجانب قائم  $x = \frac{1}{2}$  و بجانب مایل  $y = x + \frac{1}{2}$  دارد.



با توجه به شکل منحنی، جدول زیر تنظیم می شود:

$m$	$-\infty$	$-2$	$-2$	$4$	$6$	$+\infty$
$R$	$x' < 0 < x'' < \Delta$	$x' < x'' < 0 < \Delta$	ریشه ندارد	$0 < x' < x'' < \Delta$	$0 < x' < \Delta < x''$	
	خط $D_1$	خط $D_2$	خط $D_3$	خط $D_4$	خط $D_5$	

$$x' < x'' = 0 < \Delta \quad x' = x'' < 0 < \Delta \quad 0 < x' = x'' < \Delta \quad 0 < x' < x'' = \Delta$$

خط  $D_2$

$D_5$

$D_3$

خط  $D_4$

مثال ۳- مقایسه عددهای ۲ و ۴ با ریشه های معادله:

$$(m-1)x^2 - 3(m-1)x + 4 = 0$$

اگر  $m$  را بر حسب  $x$  بدست آوریم خواهیم داشت: پس  $m = \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 3x}$

(C) 
$$\begin{cases} y = \frac{x^2 + 2x - 4}{x^2 - 2x} \end{cases}$$

(D) 
$$y = m$$


$$y' = \frac{-6x^2 + 8x - 12}{y^2} \Rightarrow y' < 0$$

$$\begin{cases} x = 1 \text{ یا } -4 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{A} \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \end{cases} \quad \text{B} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y \rightarrow 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases}$$

x	$-\infty$	-4	0	1	2	3	4	$+\infty$
y'		-			-		-	
y	1	$\searrow$	$\circ \searrow -\infty$	$+\infty \searrow \circ \searrow -2 \searrow -\infty$	$+\infty \searrow 6 \searrow 1$			

برای منحنی دو مجانب قائم  $x=3$  و  $x=0$  و مجانب افقی  $y=1$  وجود دارد.



R	$x' < 2 < x'' < 4$	$x' < x'' < 2 < 4$	$x' < 2 < 4 < x''$	$x' < 2 < x'' < 2$
	خط $D_1$	خط $D_2$	خط $D_4$	خط $D_3$
	$x' < x'' = 2 < 4$ خط $D_2$		$x' < 2 < x'' = 4$ خط $D_4$	
	$x' = -\infty < x'' < 2 < 4$		$x' < 2 < 4 < x'' = \infty$	

مثال 4- بحث در تعداد و علامت ریشه‌های معادله درجه سوم  $x^3 - 3x^2 - 9x - \lambda = 0$  و تئیکه پارامتر  $\lambda$  تغییر کند. برای این کار باید عدد صفر را با ریشه‌های معادله بالا مقایسه کرد.

(C)  $y = x^3 - 3x^2 - 9x$  داریم:  $\lambda = x^3 - 3x^2 - 9x$  پس:

(D)  $y = \lambda$

تابع فوق همواره معین و متصلی است.


$$y' = 3x^2 - 6x - 9, y' = 0 : \begin{cases} x = +3 \text{ یا } -1 \\ y = -27 \text{ یا } 5 \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{3 \pm 3\sqrt{5}}{2} \\ y = 0 \end{cases} \begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases}$$

$x$  |  $-\infty$   $\frac{1}{2}(3-3\sqrt{5})$   $-1$   $0$   $1$   $3$   $\frac{1}{2}(3+3\sqrt{5})$   $+\infty$

$y'$  |  $+$   $0$   $-$   $0$   $+$

$y$  |  $-\infty$   $\nearrow$   $0$   $\nearrow$   $\searrow$   $5$   $\searrow$   $0$   $\searrow$   $-27$   $\nearrow$   $0$   $\nearrow$   $+\infty$



$\lambda$	$-\infty$	$-2\gamma$	$0$	$\delta$	$+\infty$
<b>R</b>	$x_1 < 0$	$x_1 < 0 < x_2 < x_3$	$x_1 < x_2 < 0 < x_3$	$0 < x_1$	
	خط $D_1$	خط $D_2$	خط $D_3$		
	$x_1 < 0 < x_2 = x_3$	$x_1 < x_2 = 0 < x_3$	$x_1 = x_2 < 0 < x_3$		
		خط $D_4$	محور $x$ ها	خط $D_5$	

چنانکه از روی جدول دیده می‌شود معادله بالا ممکن است دارای سه ریشه یا دو ریشه یا یک ریشه باشد و علامت ریشه‌ها نیز در هر قسمت مشخص است.

مثال ۵- اولاً جدول تغییرات و منحنی نمایش تابع  $y = \frac{2x+2}{x^2-2x}$  را رسم کنید. ثانیاً از روی شکل منحنی در تعداد ریشه‌های معادله مثلثاتی

$$m(2 \sin X + 1)^2 - (2m + 3)(2 \sin X + 1) - 2 = 0$$


که در آن  $X$  بین  $\frac{\pi}{4}$  و  $0$  است بحث کنید.

اولاً: تابع به ازای کلیه مقادیر باستانی  $0 < m < 2$  معین و پیوسته است.

$$y' = \frac{-2x^2 - 4x + 2}{V^2}, \quad y' = 0 : \begin{cases} x = -2 \text{ یا } \frac{2}{3} \\ y = \frac{-1}{2} \text{ یا } -\frac{9}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \rightarrow 0 \text{ یا } x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow \pm \infty \end{cases} \quad \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow \pm \infty \\ y = 0 \end{cases}$$

$x$	$-\infty$	$-2$	$-\frac{2}{3}$	$0$	$\frac{2}{3}$	$2$	$+\infty$										
$y'$		$-$	$0$	$+$		$+$	$0$	$-$	$-$								
$y$		$\searrow$	$\frac{-1}{2}$	$\nearrow$	$0$	$\nearrow$	$+\infty$	$\parallel$	$-\infty$	$\searrow$	$-\frac{9}{2}$	$\searrow$	$-\infty$	$\parallel$	$+\infty$	$\searrow$	$0$



ثانياً - هرگاه  $m$  را از معادلهٔ مثلثاتی بدست آوریم خواهیم داشت:

$$m = \frac{3(2 \sin X + 1) + 2}{(2 \sin X + 1)^2 - 2(\sin X + 1)}$$

چنانکه می‌بینید مثل آن است که در تابع به جای  $x$  مقدار  $2 \sin X + 1$  را قرار داده باشیم و

چون  $0 \leq X \leq \frac{\pi}{2}$  پس  $0 \leq \sin X \leq 1$  یعنی  $1 \leq 2 \sin X + 1 \leq 3$  و یا  $1 \leq x \leq 3$  تغییر می‌کنند پس

باید اعداد ۳ و ۱ را باریشه‌های معادلهٔ درجهٔ دوم  $m x^2 - (2m + 3)x - 2 = 0$  مقایسه کنیم.

$m$	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$0$	$\frac{11}{3}$	$+\infty$
$R$	$x' < 1 < x'' < 3$	$x' < x'' < 1 < 3$	ریشه ندارد	$x' < x'' < 1 < 3$	$x' < 1 < 3 < x''$	$x' < 1 < x'' < 3$
	يك جواب قابل قبول	جواب ندارد	ندارد	جواب ندارد	جواب ندارد	يك جواب دارد
	$0 < X' < \frac{\pi}{2}$	$X' = 0$			$X' = \frac{\pi}{2}$	$0 < X' < \frac{\pi}{2}$

## تمرین

الف - در وجود و علامت ریشه‌های هر یک از معادله‌های زیر وقتی که پارامتر تغییر کند از روی

شکل منحنی بحث کنید.

$$۱) \quad (2m-1)x^2 - 4x + m - 2 = 0$$

$$۲) \quad (m+1)x^2 - mx + m + 1 = 0$$

$$۳) \quad (m-2)x^2 + 3x + m + 2 = 0$$

ب- هر یک از منحنی‌های زیر را با خط  $y = m$  قطع نموده طول نقاط برخورد را با

اعداد  $2-$  و  $1-$  و  $1$  مقایسه کنید.

$$۴) \quad y = \frac{3x^2 - 4x + 3}{x^2 - x + 1} \quad ۵) \quad y = \frac{x^2 + 1}{2x^2 - 5x + 2}$$

$$۶) \quad y = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} \quad ۷) \quad y = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}$$

$$۸) \quad y = \frac{x^2 + |x| + 1}{x^2 + 1} \quad ۹) \quad y = \frac{(x+1)^2}{x^2 + x - 2}$$

ج- اعداد  $\alpha$  و  $\beta$  را باریشه‌های هر یک از معادله‌های زیر وقتی که پارامتر  $m$  تغییر کند

مقایسه کنید.

$$۱۰) \quad mx^2 - (2m+1)x + 2m = 0 \quad , \quad \alpha = 1 \quad , \quad \beta = 2$$

$$۱۱) \quad (m-1)x^2 - mx - 2(m+1) = 0 \quad , \quad \alpha = -1 \quad , \quad \beta = 1$$

$$۱۲) \quad (1+2m)x^2 - 2x + (2-3m) = 0 \quad , \quad \alpha = -1 \quad , \quad \beta = 2$$

$$۱۳) \quad mx^2 - 2(m+1)x + 3m + 4 = 0 \quad , \quad \alpha = -2 \quad , \quad \beta = 1$$

۱۴- معادله درجه دوم زیر مفروض است:

$$(1-m)x^2 + (3m-5)x + 8 - 4m = 0$$

۱) در وجود و علامت ریشه‌های معادله فوق وقتی که پارامتر  $m$  تغییر کند بحث کنید.

۲) فرض کنیم  $m$  درفاصله‌ای است که دوریشه معادله مثبت است. تحقیق کنید که طول وتر

مثلث قائم الزاویه‌ای که اضلاع مجاور به زاویه قائمه‌اش به طولهای  $x'$  و  $x''$  (ریشه‌های معادله) هستند

$$تجی است از  $m$  به صورت  $h(m) = \left| \frac{m-3}{m-1} \right|$$$



۳) مطمئن است تعیین جدول تغییرات و رسم منحنی نمایش تابع  $h(m)$  ۱۵- در تعداد ریشه‌ها و علامت ریشه‌های معادله درجه سوم زیر وقتی که پارامتر  $\lambda$  تغییر کند بحث کنید (از روی شکل منحنی)

$$(x-1)^2 - \lambda x^3 = 0$$

۱۶- معادله زیر مفروض است:

$$(m-1)\sin^2 x - 4m + 1 = 0$$

هرگاه  $\sin x$  را  $X$  بنامیم به کمک منحنی نمایش تابع  $y = \frac{X^2 - 1}{X^2 - 4}$  حدود  $m$  را

چنان تعیین کنید که معادله مثلثاتی بالا دارای ریشه باشد.

۱۷- معادله  $(m-1)\sin^2 x - 4m\sin x + 4m = 0$  که در آن  $m$  پارامتر است

مفروض است:

در تعداد ریشه‌های معادله که بین  $(0$  و  $2\pi)$  است وقتی که پارامتر  $m$  تغییر می‌کند

بحث کنید.

راهنمایی:  $\sin x$  را برابر  $X$  قرارداد معادله منحنی (C) نمایش  $y = \frac{X^2}{(X-2)^2}$  را رسم و از

روی آن نتیجه را تحقیق کنید.

تعیین تعداد ریشه‌ها و حل تقریبی معادله درجه سوم

۲-۱۳- مقدمه: هر چند ریشه‌های معادله درجه سوم  $f(x) = 0$  را بوسیله فرمولهایی بر


حسب ضرایب معادله تعیین نموده‌اند ولی چون ریشه‌ها معمولاً به صورت رادیکالهای مرکب با شماره‌های ریشگی ۳ و ۲ بدست آمده‌اند، در مورد معادله‌هایی که ضرایبشان حریفی نبوده و اعداد حقیقی مشخص باشند می‌توان ریشه‌ها را بطور تقریبی به دست آورد. در زیر پس از ذکر دو نکته، راه بدست آوردن ریشه‌های تقریبی معادله به چند روش بیان می‌شود.

۲-۱۴- نکته ۱ - هرگاه تابع  $y = f(x)$  در فاصله  $[x_1$  و  $x_2]$  معین و پیوسته بوده و

در یک جهت سیر کند (فقط صعودی یا فقط نزولی باشد) و  $f(x_1)$  و  $f(x_2)$  دارای علامتهای مختلف باشند، حتماً معادله  $f(x) = 0$  در فاصله مذکور یک ریشه دارد.

زیرا مطابق شکل مثلاً اگر  $f(x_1) < 0$  و  $f(x_2) > 0$  چون تابع در فاصله  $A$  و  $B$

صعودی است هرگاه نقطه متغیر  $M$  به طول  $x$  روی منحنی از  $A$  به طرف  $B$  تغییر مکان دهد.



یعنی  $x$  آن زیاد شود  $y$  آن نیز مرتباً زیاد می‌شود و چون عرض آن ابتدا منفی و سپس در  $B$  مثبت شده است و تابع  $f$  یوسته است ناچار در فاصله مذکور یک جا صفر خواهد شد و معادله  $f(x) = 0$  در فاصله  $[x_1, x_2]$  یک ریشه دارد.

$$2-15-2 \quad \text{تعیین تعداد ریشه‌های معادله درجه سوم } f(x) = 0$$

ابتدا مشتق تابع  $y = f(x)$  را که یک سه‌جمله‌ای درجه دوم خواهد شد تعیین و مبین مشتق یعنی  $\Delta$  را تعیین می‌کنیم؛

الف- هرگاه  $\Delta \leq 0$  باشد مشتق همواره دارای یک علامت ( مگر در ریشه مضاعف معادله در حالت  $\Delta = 0$ ) و بالتبجه تابع  $y = f(x)$  در یک جهت تغییر می‌کند و چون  $y$  از  $-\infty$  تا  $+\infty$  (یا از  $+\infty$  تا  $-\infty$  بر حسب آن که ضریب درجه سوم مثبت یا منفی باشد) در یک جهت سیر می‌کند ناچار معادله یک ریشه دارد.

ب:  $\Delta > 0$  در این صورت مشتق دارای دو ریشه و تابع دارای یک ماکزیمم و یک مینوموم است: اگر ماکزیمم و مینوموم دارای یک علامت باشند، به سهولت از روی جدول تغییرات تابع معلوم می‌شود که  $f(x) = 0$  یک ریشه دارد.

اگر ماکزیمم و مینوموم دارای علامتهای مختلف باشند (به سهولت از روی جدول تغییرات دیده می‌شود) که معادله  $f(x) = 0$  دارای سه ریشه است. اگر ماکزیمم یا مینوموم صفر باشد (از روی جدول تغییرات مشاهده می‌شود) معادله دارای دو ریشه است یکی مضاعف (که خود به خود بدست آمده) و یکی ساده است.

برای اینکه مطلب روشن شود به مثالهای ذیل توجه نمائید.

$$\text{مثال ۱- تعیین تعداد ریشه‌های معادله: } x^3 + x^2 + 2x + 5 = 0$$

تابع  $y = x^3 + x^2 + 2x + 5$  را در نظر گرفته مشتق آن  $y' = 3x^2 + 2x + 2$  را که در آن  $\Delta$  منفی است بدست می‌آوریم پس مشتق همواره مثبت است.

$x$	$-\infty$		$+\infty$
$y'$		+	
$y$	$-\infty$	↗	$+\infty$

چون  $y$  همواره صعودی و از  $-\infty$  تا  $+\infty$  تغییر کرده است پس معادله ناچار يك ریشه دارد.

مثال ۲- تعیین تعداد ریشه‌های معادله:  $-x^2 + x^2 - 4x - 3 = 0$

تابع  $y = -x^2 + x^2 - 4x - 3$  را در نظر می‌گیریم:

تابع نزولی  $\Rightarrow y' < 0 \Rightarrow \Delta = 1 - 12 < 0 \Rightarrow y' = -2x^2 + 2x - 4$

$x$	$-\infty$		$+\infty$
$y'$		-	
$y$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$

معادله يك ریشه دارد.

مثال ۳- تعیین تعداد ریشه‌های معادله:  $x^2 + 3x^2 + 3x - 4 = 0$

تابع  $y = x^2 + 3x^2 + 3x - 4$  را در نظر می‌گیریم:

تابع صعودی  $\Rightarrow y' > 0 \Rightarrow \Delta = 0 \Rightarrow y' = 2x^2 + 6x + 3$

$x$	$-\infty$	$-1$	$+\infty$
$y'$	$+$	$0$	$+$
$y$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

معادله يك ریشه ( $x_1 > -1$ ) دارد.

مثال ۴- تعیین تعداد ریشه‌های معادله:  $x^2 - 12x + 1 = 0$

تابع  $y = x^2 - 12x + 1$  را در نظر می‌گیریم

$y' = 2x^2 - 12 \Rightarrow 2x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$

$x$	$-\infty$	$-2$	$2$	$+\infty$	
$y'$	$+$	$0$	$-$	$+$	
$y$	$-\infty$	$\nearrow$	$17$	$\searrow$	$-\infty$

با توجه به جدول بالا و نکتهٔ ۱ ملاحظه می‌شود که معادلهٔ فوق سه ریشه دارد به

این شرح:

$x_1 < -2$  و  $-2 < x_2 < 2$  و  $x_3 > 2$

مثال ۵- تعیین تعداد ریشه‌های معادله:

$$x^2 - 3x + 10 = 0 \quad \text{و} \quad y' = 3x^2 - 3$$

x	$-\infty$		-۱		۱		$+\infty$
y'		+	۰	-	۰	+	
y	$-\infty$	↗	۱۲	↘	۸	↗	$+\infty$

با توجه به جدول بالا ملاحظه می‌شود که معادله فوق فقط یک ریشه  $x_1 < -1$  دارد.

مثال ۶- تعیین تعداد ریشه‌های معادله:

$$x^2 - 6x^2 + 32 = 0 \quad \text{و} \quad y' = 3x^2 - 12x$$

چنان که دیده می‌شود  $x' = x'' = 4$  (زیرا محور xها بر منحنی مماس است) و  $x''' < 0$  است که می‌توان آنرا دقیقاً بدست آورد که  $x''' = -2$  می‌شود.

x	$-\infty$		۰		۴		$\infty$
y'		+	۰	-	۰	+	
y	$-\infty$	↗	۳۲	↘	۰	↗	$+\infty$

۲ - ۱۶ - حالت کلی بحث در تعداد ریشه‌های معادله درجه سوم - معادله درجه سوم

کلی:

$$ax^2 + bx^2 + cx + d = 0$$

را با تبدیل  $x = X - \frac{b}{2a}$  می‌توان به معادله‌ای به صورت زیر در آورد:

$$X^2 + pX + q = 0$$

بنابراین کافی است که در تعداد ریشه‌های معادله‌ای از نوع اخیر بحث کنیم.

برای بحث در تعداد ریشه‌های معادله درجه سوم:

$$x^2 + px + q = 0 \quad (۱)$$

بنا به نکته ۲، تغییرات تابع زیر را بررسی می‌کنیم:

$$y = x^2 + px + q \quad (۲)$$

مشتق این تابع می‌شود:

$$y' = 2x + p \quad (۳)$$

هر گاه  $p > 0$  معادله  $2x + p = 0$  ریشه حقیقی ندارد و  $y'$  همواره مثبت است.

همچنین هر گاه  $p = 0$  باشد، مشتق در ازای  $x = 0$  صفر می شود اما تغییر علامت نمی دهد و به ازای  $x \neq 0$  همواره مثبت است. بنابراین در حالت  $p \geq 0$  تابع (۲) همواره صعودی است و منحنی نمایش تابع فقط در يك نقطه محور  $x$  ها را قطع می کند. یعنی هر گاه  $p \geq 0$  معادله (۱) فقط يك ریشه دارد.

هر گاه  $p < 0$  مشتق در ازای دو مقدار  $x_1$  و  $x_2$  صفر شده و تغییر علامت میدهد.

در این حالت تابع (۲) يك ماكزیمم و يك می نیمم دارد. اگر  $M_1$  و  $M_2$  نقطه های نظیر ماكزیمم و می نیمم باشند باید معلوم کنیم که چه موقع این دو نقطه در يك طرف محور  $x$  ها و چه موقع در دو طرف آن قرار دارند.

با فرض  $M_1(x_1, y_1)$  و  $M_2(x_2, y_2)$  از معادله  $3x^2 + p = 0$  نتیجه می شود که:

$$x_1 + x_2 = 0 \text{ و } x_1 x_2 = \frac{p}{3} \quad (4)$$

و از معادله (۲) خواهیم داشت:

$$y_1 y_2 = (x_1^2 + px_1 + q)(x_2^2 + px_2 + q)$$

$$y_1 y_2 = (x_1 x_2)^2 + px_1 x_2 [(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] +$$

$$q(x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2) + pq(x_1 + x_2) + p^2 x_1 x_2 + q^2$$

با توجه به رابطه ای (۴) داریم:

$$y_1 y_2 = \frac{p^2}{27} - \frac{2p^2}{9} + \frac{p^2}{3} + q^2 = \frac{4p^2 + 27q^2}{27}$$

هر گاه  $4p^2 + 27q^2 > 0$  در این صورت  $y_1 y_2 > 0$  پس  $y_1$  و  $y_2$  هم علامتند و دو نقطه

$M_1$  و  $M_2$  در يك طرف محور  $x'x$  واقعند. در این حالت منحنی تابع (۲) فقط در يك نقطه محور  $x'x$  را قطع می کند و معادله (۱) فقط يك ریشه دارد.

هر گاه  $4p^2 + 27q^2 = 0$  در این صورت  $y_1 y_2 = 0$  و حداقل یکی از دو مقدار

$y_1$  یا  $y_2$  برابر صفر است. پس منحنی نمایش تابع در يك نقطه بر محور  $x'x$  مماس و در يك نقطه دیگر آن را قطع می کند. در این حالت معادله (۱) يك ریشه مضاعف و يك ریشه ساده دارد.

هر گاه  $4p^2 + 27q^2 < 0$  در این صورت  $y_1 y_2 < 0$  و دو نقطه  $M_1$  و  $M_2$  در دو طرف

محور  $x'x$  واقعند و منحنی نمایش تابع (۲) با محور  $x'x$  در سه نقطه متلاقی است. در این حالت معادله (۱) سه ریشه دارد.

خلاصه بحث - با توجه به اینکه اگر  $p > 0$  باشد  $4p^2 + 27q^2$  نیز مثبت خواهد بود.

بحث در تعداد ریشه های معادله  $x^3 + px + q = 0$  به صورت زیر خلاصه می شود:

الف - اگر  $4p^2 + 27q^2 > 0$  ، معادله فقط يك ریشه حقیقی دارد .

ب - اگر  $4p^2 + 27q^2 = 0$  ، به فرض  $p \neq 0$  معادله يك ریشه حقیقی مضاعف و يك ریشه حقیقی ساده دارد . هرگاه  $p = 0$  در این صورت  $q = 0$  و معادله به صورت  $x^3 = 0$  است .

ج - اگر  $4p^2 + 27q^2 < 0$  ، معادله سه ریشه حقیقی دارد .

تبصره ۱- از روی نمودار تابع (۲) در هر يك از حالت‌های سه گانه بالا ، به سادگی می توان از روی علامت  $q$  علامت ریشه یا ریشه‌های معادله را نیز تعیین کرد .

تبصره ۲- بعضی از معادله‌های درجه سوم را با تبدیلی غیر از  $x = X - \frac{b}{3a}$  نیز می توان

به صورت معادله‌ای از نوع (۱) درآورد . به مثال زیر توجه کنید .

مثال - بحث در تعداد ریشه‌های معادله درجه سوم:

$$x^3 - 3x^2 - m = 0$$

با فرض  $X = \frac{1}{x}$  داریم:

$$X^3 + \frac{3}{m}X - \frac{1}{m} = 0$$

$$4p^2 + 27q^2 = \frac{4 \times 27}{m^2} + \frac{27}{m^2} = \frac{27(m+4)}{m^2}$$

بحث را به صورت جدول زیر خلاصه می کنیم:

m	$-\infty$	-۴	۰	$+\infty$
$4p^2 + 27q^2$	+	۰	-	+
تعداد ریشه‌ها	يك ریشه ساده	سه ریشه	يك ریشه ساده و يك ریشه مضاعف	يك ریشه ساده

يك ریشه ساده و يك ریشه مضاعف

يك ریشه ساده و يك ریشه مضاعف

۱۷-۲- تعیین ریشه‌های تقریبی معادله درجه سوم از راه تقریبهای متوالی- با توجه

به دو نکته‌ای که در ابتدای این بخش ذکر کردیم ، فرض کنیم بدانیم معادله يك ریشه بین دو مقدار  $x_1$  و  $x_2$  دارد ، یعنی مثلاً  $0 < f(x_1) < f(x_2)$  و بخوایم آن ریشه را با تقریب به‌خصوصی پیدا کنیم .

ابتدا به جای  $x$  عدد دلخواه‌سی مانند  $x_0$  که در فاصله  $[x_1, x_2]$  باشد قرار می‌دهیم ،

اگر اجاباً  $f(x_0)$  صفر شد که  $x_0$  خود ریشه معادله است. اما اگر  $f(x_0)$  صفر نبود مثبت یا منفی می باشد. مثلاً اگر  $f(x_0) < 0$  معلوم می شود معادله یک ریشه بین  $x_0$  و  $x_1$  دارد زیرا  $f(x_1) > 0$  و  $f(x_0) < 0$ . به همین ترتیب اعداد دیگری را امتحان می کنیم (ابتدا اعداد درست ناموقمی که ریشه بین دو عدد متوالی باشد، سپس اعداد اعشاری) تا مثلاً به موردی برسیم که داشته باشیم:  $f\left(\frac{a}{10}\right) < 0$  و  $f\left(\frac{a+1}{10}\right) > 0$  یا بالعکس ( $a$  عددی درست است) در این

صورت داریم  $\frac{a}{10} < x < \frac{a+1}{10}$  و ریشه تقریبی معادله تا  $\frac{1}{10}$  تقریب نقصانی و  $\frac{a+1}{10}$  مقدار تقریبی ریشه تا  $\frac{1}{10}$  تقریب اضافی است.

حال اگر خواسته باشیم ریشه معادله را تا  $\frac{1}{100}$  تقریب تعیین کنیم چون:

$$\frac{10a}{100} < x < \frac{10(a+1)}{100}$$

می باشد، در فاصله مذکور به  $x$  مقادیر مختلف می دهیم تا به موردی برسیم که مثلاً داشته باشیم  $f\left(\frac{a'}{100}\right) < 0$  و  $f\left(\frac{a'+1}{100}\right) > 0$  ( $a'$  عددی درست است) در این صورت داریم:

$$\frac{a'}{100} < x < \frac{a'+1}{100}$$

و  $\frac{a'}{100}$  ریشه تقریبی نقصانی معادله و  $\frac{a'+1}{100}$  ریشه تقریبی اضافی تا  $\frac{1}{100}$  تقریب می باشد. به همین ترتیب با تقریبهای دیگر  $\frac{1}{10000}$  و  $\frac{1}{100000}$ ، ... می توان به هر اندازه که خواسته باشیم به ریشه نزدیک شویم.

توجه: هرگاه معادله ای دارای یک ریشه گویا باشد و آن را از این راه حل کنیم و مثلاً

ندانیم معادله ریشه گویا  $\frac{a}{10}$  یا  $\frac{a'}{100}$  داشته باشد از راه فوق ریشه معادله عیناً بدست خواهد آمد.

$$x^2 - 3x - 52 = 0$$

مثال ۱- حل معادله

تابع  $y = x^2 - 3x - 52$  را در نظر می گیریم. داریم:

$x$	$-\infty$	$-1$	$1$	$+\infty$			
$y'$	$+$	$0$	$-$	$0$	$+$		
$y$	$-\infty$	$\nearrow$	$-50$	$\searrow$	$-54$	$\nearrow$	$+\infty$

با توجه به جدول می بینیم که معادله فقط يك ریشه  $x > 1$  دارد. حال عددی مثلا 5 را انتخاب و  $f(5)$  را حساب می کنیم:

$$f(1) = -54 < 0 \text{ و } f(5) = 58 > 0 \Rightarrow 1 < x < 5$$

حال مثلا  $f(2)$  را محاسبه می کنیم خواهد شد.  $f(2) = -50 < 0$  پس ریشه معادله  $2 < x < 5$  می باشد. برای  $f(3)$  داریم:

$f(3) = -34 < 0$  پس خواهیم داشت:  $3 < x < 5$ . اکنون عدد 4 را امتحان می کنیم،  $f(4) = 0$  پس ریشه معادله عدد 4 است.

مثال 2- تعیین ریشه های معادله  $x^2 - 3x - 6 = 0$  تا  $0,1$  تقریب نقصانی.

$$y = x^2 - 3x - 6$$

$$y' = 2x - 3$$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	
y	$-\infty$	↗	-8	↘	-4	↗	$+\infty$

با توجه به جدول می بینیم معادله فقط يك ریشه  $x > 1$  دارد. حال عددی مانند 3 را که از 1 بزرگتر است امتحان می کنیم،  $f(3) = 12 > 0$  پس معادله يك ریشه در فاصله  $1 < x < 3$  دارد، زیرا  $f(1) < 0$ .

حال عدد 2 را امتحان می کنیم:  $f(2) = -4 < 0$  پس  $2 < x < 3$  عدد دلخواه  $2,4$  را که بین 2 و 3 است امتحان می کنیم:

$$f(2,4) = 0,624 > 0 \Rightarrow 2 < x < 2,4$$

عدد  $2,3$  را امتحان می کنیم:

$$f(2,3) = -0,723 \Rightarrow 2,3 < x < 2,4$$

بنابراین  $x \approx 2,3$  ریشه معادله با  $0,1$  تقریب نقصانی است.

مثال 3- تعیین ریشه های معادله  $x^2 - 3x^2 + 3 = 0$  تا  $0,1$  تقریب نقصانی

$$y = x^2 - 3x^2 + 3$$

$$y' = 2x^2 - 6x$$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	
y	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$



با توجه به جدول مشاهده می‌شود معادله سه ریشه دارد:

$$x_1 < 0 \text{ و } 0 < x_2 < 2 \text{ و } x_3 > 2$$

که هر کدام را می‌توان مطابق آنچه در بالا گفته شد بدست آورد.

مثلاً ریشه  $x_1 < 0$  را تعیین می‌کنیم:  $0 < f(-1) = -1$  و چون  $f(0) > 0$  است پس:

$$-1 < x < 0$$

حال  $f(-0.5)$  را حساب می‌کنیم:  $f(-0.5) > 0$  پس نتیجه می‌شود:

$$-1 < x < -0.5$$

حال  $f(-0.7)$  را تعیین می‌کنیم:  $f(-0.7) > 0$  پس خواهیم داشت:

$$-1 < x < -0.7$$

حال  $f(-0.9)$  را بدست می‌آوریم:  $f(-0.9) < 0$  پس داریم:

$$-0.9 < x < -0.7$$

حال  $f(-0.8)$  را حساب می‌کنیم:  $f(-0.8) > 0$  پس داریم:

$$-0.9 < x < -0.8$$

بنابراین یکی از ریشه‌ها  $x_1 \approx -0.9$  با تقریب  $0.1$  نقصانی خواهد بود. به همین ترتیب

می‌توان دورریشه دیگر را حساب کرد.

مثلاً برای ریشه  $0 < x_2 < 2$  داریم  $f(0) = 3 > 0$  و  $f(1) = 1 > 0$  پس:

$$1 < x < 2 \text{ و داریم:}$$

$$f(1.5) < 0 \Rightarrow 1 < x < 1.5$$

$$f(1.3) > 0 \Rightarrow 1.3 < x < 1.5$$

$$f(1.4) < 0 \Rightarrow 1.3 < x < 1.4$$

پس ریشه دیگر معادله  $x \approx 1.3$  با  $0.1$  تقریب نقصانی است:

به همین ترتیب ریشه  $x_3 > 2$  را حساب می‌کنیم تا بدست آید.


$$x_3 \approx 2.5$$

## ۲-۱۸- تعیین ریشه‌های معادله از روش وترها (روش لاگرانژ)

فرض کنیم تابع  $y = f(x)$  در فاصله  $[x_1 \text{ و } x_2]$  معین و پیوسته و یکنوا (یا فقط صعودی

یا فقط نزولی) باشد و مثلاً  $f(x_1) < 0$  و  $f(x_2) > 0$  باشد. بدیهی است معادله  $f(x) = 0$

یک ریشه بین  $x_1$  و  $x_2$  دارد.



حال وتر  $AB$  را رسم نموده معادله خط  $AB$  را می نویسیم:

$$\frac{y - f(x_1)}{x - x_1} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

اگر طول برخورد خط  $AB$  با محور  $x$ ها  $a_1$  باشد داریم:

$$(1) \quad a_1 = x_1 - \frac{(x_2 - x_1)f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)}$$

حال  $f(a_1)$  را از معادله  $y = f(x)$  تعیین می کنیم تا عرض  $A_1$ ، که مثلاً در شکل منفی

است بدست آید. محل برخورد  $A_1B$  با محور  $x$ ها را با کمک رابطه (1) که در آن  $x_1$

همان  $a_1$  می باشد بدست می آوریم تا  $a_2$  بدست آید:

$$a_2 = a_1 - \frac{(x_2 - a_1)f(a_1)}{f(x_2) - f(a_1)}$$

به این ترتیب  $a_2$  به نقطه  $C$  نزدیک می شود و اینقدر عمل را ادامه می دهیم تا بیشتر به ریشه

واقعی نزدیک شویم و با هر تقریب که بخواهیم ریشه در اختیار ما باشد.

مثال- حل معادله  $x^2 - 3x - 5 = 0$  باروش وترها

$$\begin{cases} y = x^2 - 3x - 5 \\ y' = 2x - 3 \end{cases}$$

$x$	$-\infty$		$-1$		$1$		$+\infty$
$y'$		$+$	$0$	$-$	$0$	$+$	
$y$	$-\infty$	$\nearrow$	$-3$	$\searrow$	$-7$	$\nearrow$	$+\infty$

چنانکه دیده می شود معادله فقط يك ریشه  $x > 1$  دارد:

$$f(2) = -3 < 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 2$$

$$f(3) = 13 > 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = 3$$

از فرمول (1) استفاده می کنیم:

$$a_1 = 2 - \frac{(3-2)(-3)}{13+3} \Rightarrow a_1 \approx 2,187 \Rightarrow f(a_1) =$$

$$f(2,187) = -1,101 < 0$$

$$a_2 = 2,187 - \frac{(3-2,187)(-1,101)}{13+1,101} \Rightarrow a_2 = 2,25 \Rightarrow$$

$$f(2,25) \approx -0,36$$

پس داریم:  $2,25 < x < 3$

$$a_3 = 2,25 - \frac{(3-2,25)(-0,36)}{13+0,36} \Rightarrow a_3 = 2,27$$

$$\Rightarrow f(a_3) = f(2,27) = -0,113$$

$$a_4 = 2,27 - \frac{0,113(-0,113)}{13,113} \Rightarrow a_4 = 2,275$$

$$\Rightarrow f(a_4) = f(2,275) = -0,05$$


$$a_5 = 2,275 - \frac{0,05(-0,05)}{13,05} \Rightarrow a_5 = 2,277$$

بنابراین ریشه تقریبی نقصانی معادله  $x \approx 2,277$  می باشد.


۹-۱۹ روش مماسها (روش نیوتن) - اگر تابع  $y = f(x)$  در فاصله  $[x_1, x_2]$  معین

ویبسته و یکنوا (فقط صعودی یا فقط نزولی) باشد و بدانیم  $f(x_1)$  و  $f(x_2)$  مختلف العلامت

هستند مثلا مطابق شکل های زیر



(شکل ۱)



(شکل ۲)

$f(x_1) < 0$  و  $f(x_2) > 0$ ؛ مماس در  $B$  (شکل ۱) بر منحنی محور  $x$  ها را در نقطه‌ای به طول  $a_1$  بین  $x_1$  و  $x_2$  قطع می‌کند. برای تعیین  $a_1$  معادله مماس در  $B$  بر منحنی را می‌نویسیم:  $y - f(x_2) = f'(x_2)(x - x_2)$  که در ازاء  $y = 0$  و  $x = a_1$  داریم:

$$(1) \quad a_1 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$$

و مجدداً مماس بر  $B_1$  را رسم می‌کنیم تا محور  $x$  ها را در نقطه‌ای به طول  $a_2$  قطع کند که طول آن را از رابطه  $a_2 = a_1 - \frac{f(a_1)}{f'(a_1)}$  بدست می‌آوریم و به همین ترتیب عمل را ادامه می‌دهیم

تا هرچه بیشتر به ریشه واقعی معادله که در فاصله  $[x_1$  و  $x_2]$  است نزدیک شویم.

توجه - در شکل (۱) مماس را در شروع حل مسئله از  $B$  رسم کردیم زیرا اگر از  $A$  رسم می‌کردیم محل برخورد مماس با محور  $x$  ها خارج  $[x_1$  و  $x_2]$  می‌بود. برعکس در شکل (۲) بساید مماس را از  $A$  رسم نمود که طول برخورد آن با محور  $x$  ها یعنی  $a_1$  در فاصله  $[x_1$  و  $x_2]$  باشد. در آن صورت در رابطه (۱) به جای  $x_2$  مقدار  $x_1$  را قرار می‌دهیم تا

$$a_1 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

بطور کلی اگر  $y''$  در فاصله  $[x_1$  و  $x_2]$  مثبت باشد (تقر منحنی به طرف جهت مثبت ها باشد شکل ۱) مماس را در نقطه  $B$  که عرض آن  $f(x_2) > 0$  مثبت است رسم می‌کنیم. و اگر  $y''$  مشتق نانی در فاصله  $[x_1$  و  $x_2]$  منفی باشد (تقر منحنی به طرف جهت منفی ها باشد شکل ۲) مماس را در نقطه  $A$  که  $f(x_1) < 0$  عرض آن منفی است رسم می‌کنیم.

مثال: حل معادله  $x^2 - 3x - 5 = 0$  با روش مماسها (قبلاً با روش وترها حل کرده‌ایم)

$$y = x^2 - 3x - 5 \quad \text{و} \quad y' = 2x - 3 \quad \text{و} \quad y'' = 2$$

$x$	$-\infty$	$-1$	$+1$	$+\infty$	
$y'$	$+$	$0$	$-$	$0$	$+$
$y$	$-\infty$	$\nearrow -3$	$\searrow -7$	$\nearrow +\infty$	

$$f(2) = -3 < 0 \quad \text{و} \quad f(3) = 13 > 0$$

پس معادله دارای یک ریشه بزرگتر از ۳ می‌باشد. چون  $y''$  در فاصله  $[-\infty$  و  $+\infty]$  مثبت است پس مشتق نانی در فاصله  $[2$  و  $3]$  نیز مثبت است و باید مماس را در نقطه  $B$  به طول ۳ که عرضش مثبت است رسم کرد.

بنابراین در رابطه  $a_1 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$  به جای  $x_2$  عدد ۳ را قرار می‌دهیم.

$$a_1 = 2 - \frac{f(2)}{f'(2)} \Rightarrow a_1 = 2 - \frac{12}{24} \Rightarrow a_1 \approx 2,458$$

$$a_2 = a_1 - \frac{f(a_1)}{f'(a_1)} \Rightarrow f(a_1) = f(2,458) \approx 2,476 \text{ و}$$

$$f'(a_1) = f'(2,458) \approx 15,125$$

$$a_2 = 2,458 - \frac{2,476}{15,125} \Rightarrow a_2 \approx 2,294$$

$$a_3 = a_2 - \frac{f(a_2)}{f'(a_2)} \Rightarrow \begin{cases} f(a_2) = f(2,294) \approx 0,19 \\ f'(a_2) = f'(2,294) \approx 12,787 \end{cases}$$

$$a_3 = 2,294 - \frac{0,19}{12,787} \Rightarrow a_3 \approx 2,2792$$

$$a_4 = a_3 - \frac{f(a_3)}{f'(a_3)} \Rightarrow \begin{cases} f(2,2792) \approx 0,0022 \\ f'(2,2792) \approx 12,5842 \end{cases}$$

$$a_4 = 2,2792 - \frac{0,0022}{12,5842} = 2,2791$$

پس ریشه تقریبی اضافی معادله می‌شود:  $x \approx 2,2791$

تبصره بعضی مواقع ریشه‌های تقریبی يك معادله را مشتركاً از روش وترها و معاسها كه بكي تقریبی نقصانی و دگرگونی اضافی است تعیین می‌کنند و به ریشه واقعی معادله بیشتر نزدیک می‌شوند كه از ذكر آن خود داری می‌شود.

۲-۳- روابط بین ضرایب و ریشه‌های معادله درجه سوم- هرگاه معادله درجه سوم

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

دارای ریشه‌های حقیقی  $x_1$  و  $x_2$  و  $x_3$  باشد چند جمله‌ای  $ax^3 + bx^2 + cx + d$  بر

$(x - x_1)$  و  $(x - x_2)$  و  $(x - x_3)$  بخش پذیر است و داریم:

$$a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \equiv ax^3 + bx^2 + cx + d$$

باساده کردن طرف اول و متحد کردن دو طرف خواهیم داشت:

$$a[x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)x - x_1x_2x_3] =$$

$$ax^3 + bx^2 + cx + d$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = \frac{c}{a} \\ x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a} \end{cases}$$

مثال- روابط بین ضرایب و ریشه‌های معادله درجه سوم  $x^3 - 5x + 2 = 0$  عبارتند از:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0 \quad x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = -5 \quad \text{و} \quad x_1x_2x_3 = -2$$

### تمرین

معلوم کنید هر یک از معادله‌های زیر چندریشه دارد. سپس مقدار تقریبی ریشه‌های هر معادله

را با  $\frac{1}{8}$  تقریب بدست آورید.

۱)  $x^3 - 3x^2 + 12 = 0$

۲)  $x^3 - 3x^2 - 12 = 0$

۳)  $x^3 + 2x - 5 = 0$

۴)  $x^3 + 3x^2 - 9x + 3 = 0$

۵)  $x^3 - 3x + 1 = 0$

۶)  $4x^3 - 6x^2 + 1 = 0$

۷- معادله  $x^3 - 3a^2x^2 - 9a^4x - a^6 = 0$  مفروض است.

الف- تحقیق کنید که این معادله به ازای جمیع مقادیر پارامتر  $a$  دارای سه ریشه حقیقی است.

ب- روابط بین ضرایب و ریشه‌ها را بنویسید و تحقیق کنید معادله فوق همواره دارای دو

ریشه منفی و یک ریشه مثبت است.

۸- با استفاده از روابط بین ضرایب و ریشه‌های یک معادله درجه سوم دستگاه سه معادله

سه مجهولی زیر را حل کنید:

$$\begin{cases} x + ay + a^2z + a^3 = 0 \\ x + by + b^2z + b^3 = 0 \\ x + cy + c^2z + c^3 = 0 \end{cases}$$

۹- معادله درجه سوم  $x^3 - 3x^2 + 2m + 2 = 0$  مفروض است.

الف - حدود پارامتر  $m$  را چنان تعیین کنید که معادله فوق دارای سه یادو یا یک ریشه

حقیقی باشد.

ب- به ازای  $m = 1$  و  $m = -1$  ریشه‌های معادله را بدست آورید.

ج- به ازای  $m = 2$  ریشه تقریبی معادله را تا  $\frac{1}{8}$  تقریب نقصانی بدست آورید.

د - پارامتر  $m$  را چنان تعیین کنید که یکی از ریشه‌های معادله دو برابر قرینه دیگری باشد.

$$(x_3 = -2x_1)$$

## دیفرانسیل و انتگرال

## دیفرانسیل

۳-۱- فرض کنید که تابع  $y = f(x)$  در فاصله  $[a, b]$  معین و در نقطه  $x_0$  از  $a, b$  دارای مشتق باشد. اگر در نقطه  $x_0$  به  $x$  نمودی به اندازه  $\Delta x$  بدهیم،  $y$  نمودی به اندازه  $\Delta y$  خواهد کرد. می‌توانیم بنویسیم:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = y - y_0$$

چون  $f$  در نقطه  $x_0$  مشتق پذیر فرض شده است داریم:

$$(۱) \quad f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

لذا وقتی  $\Delta x$  را کوچکتر و کوچکتر سازیم  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  به  $f'(x_0)$  نزدیکتر و نزدیکتر می‌شود، و برای

$\Delta x$  های کوچک می‌توان نوشت:

$$f'(x_0) \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

و یا

$$(۲) \quad \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \Delta x$$

اگر تفاضل  $\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0)$  را  $\beta$  بنامیم بنا به (۱) داریم:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta = 0$$

$$(۳) \quad \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0) \Delta x + \beta \Delta x$$

از روابط (۲) و (۳) دیده می‌شود که اگر  $\Delta y$  را که نمود تابع است برابر  $f'(x_0) \Delta x$  اختیار کنیم خطائی به اندازه  $\beta \Delta x$  مرتکب خواهیم شد، و این خطا با کوچک شدن  $\Delta x$  کوچک خواهد شد.

در حقیقت حتی خطای نسبی  $\frac{\beta \Delta x}{\Delta x} = \beta$  به سمت صفر میل می‌کند.

معمولا محاسبه  $\Delta y$  کاری دشوار است، درحالیکه محاسبه  $f'(x_0)\Delta x$  با در دست داشتن  $x_0$  و  $\Delta x$  کاری ساده تر است و به کار بردن  $f'(x_0)\Delta x$  بجای  $\Delta y$  حجم محاسبات را کم می کند. در بحث فوق اندیس ۰ را در  $x$  برای بیان این منظور که  $x_0$  در طول بحث ثابت است بکار بردیم. البته  $x_0$  می تواند هر نقطه ای که تابع در آن مشتق پذیر است باشد. وقتی این استنباط ایجاد شد، دیگر لزومی به نوشتن اندیس ۰ نیست و می توان مطالب فوق را در هر نقطه  $x$  که تابع مشتق پذیر است نوشت.

توجه کنید که  $\Delta x$  و  $\Delta y$  به هم وابسته نیستند و برای هر  $x$  ثابت در  $D_f$  عدد  $\Delta x$  می تواند هر مقداری باشد که  $x + \Delta x \in D_f$ . در این حالت رابطه (۲) به صورت زیر درمی آید:

$$(۲) \quad \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x)\Delta x$$

واز روی آن می توان نوشت :

$$(۲) \quad f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

این مطالب معمولا در یکی از دو مورد زیر به کار می آیند:

۱ - مقدار تابعی و مقدار مشتق آن را در نقطه ای، مثلا  $x_0$ ، می دانیم و می خواهیم در نزدیکی و مجاورت  $x_0$  مقادیر تابع را تخمین بزنیم.

۲ - محاسبه مقدار تابع و مشتق آن در نقطه ای، مثلا  $x_0$ ، آسان هستند ولی محاسبه مقادیر تابع در نزدیکی و مجاورت  $x_0$  پیچیده و دشوار می باشند و گاهی اوقات عملا غیر ممکن است.

مثالهای زیر این مطالب را نشان می دهند :

مثال ۱ - فرض کنید که دستور تابع  $f$  را نمی شناسیم ولی به طریقی پی برده ایم (مثلا از روی منحنی نمایش  $f$ ) که مقدار تابع  $f$  در نقطه  $x_0 = ۲$  برابر ۱- و مقدار مشتق آن در  $x_0$  برابر ۳ است. می خواهیم مقادیر  $f$  را در نزدیکی  $x_0$  حلیم بزنیم.

حل : فرض کنید که  $x$  نقطه ای نزدیک به ۲ و به صورت  $۲ + \Delta x$  باشد. بنا به رابطه (۲)

$$f(۲ + \Delta x) \approx f(۲) + f'(۲)\Delta x \quad \text{داریم :}$$

$$f(۲ + \Delta x) \approx ۱ - ۳\Delta x \quad \text{و یا}$$

پس مثلا مقدار تابع در  $۱/۹$  و  $۲/۰۱$  بطور تقریبی چنین اند

$$f(۲/۰۱) \approx -۰/۹۷ \quad \text{و} \quad f(۱/۹) \approx -۰/۷$$

مثال ۲ - مربعی فلزی به شعاع ۱۰ متر را گرم کرده ایم و در اثر گرما اضلاع مربع به اندازه یک سانتیمتر بزرگ شده اند. مقدار تقریبی مساحت مربع را پس از گرم شدن حساب کنید.



حل: اگر  $S(x)$  مساحت مربع به ضلع  $x$  باشد، آنوقت  $S(x) = x^2$ . در این مسأله:  
 $S'(10) = 20$  و  $S'(x) = 2x$  و  $\Delta x = 0.01$  و  $x = 10$  اکنون بنا به رابطه (۲) داریم:

$$S(10 + \Delta x) \approx S(10) + S'(10)\Delta x = 100 + 0.2 = 100.2$$

پس مساحت مربع تقریباً به اندازه  $0.2$  متر مربع زیاد شده است. مقدار واقعی اضافه مساحت  $100.01 - 100 = 0.01$  است که تفاوت آن با آنچه تخمین زدیم  $0.0001$  و در نتیجه عددی کوچک است.

حال مناسب است که تعریف زیر را بنمائیم:

تعریف: فرض کنید که  $y = f(x)$  تابعی مشتق پذیر از  $x$  باشد. مقدار

$$(5) \quad f'(x)\Delta x$$

را که در آن  $x \in D_f$  و  $\Delta x$  عددی دلخواه و حقیقی است دیفرانسیل تابع  $f$  می نامند و یا  $df$  یا  $dy$  نمایش می دهند.

اکنون تابع  $y = f(x) = x$  را در نظر می گیریم. در مورد این تابع داریم

$$f'(x) \equiv 1 \text{ و لذا}$$

$$dy = dx = 1 \cdot \Delta x = \Delta x$$

در نتیجه  $dx = \Delta x$ ، یعنی دیفرانسیل متغیر مستقل بانمو آن یکی است لذا رابطه (۵) در

مورد دیفرانسیل تابع  $y = f(x)$  را می توان به صورت زیر نوشت

$$(6) \quad dy = f'(x)dx$$

تصوره - فرض کنید  $y = f(x)$  تابعی مشتق پذیر باشد. تاکنون نماد  $\frac{dy}{dx}$  را برای نشان

دادن  $y'$  یا  $f'(x)$  بکار برده ایم، ولی هیچگاه آن را به عنوان يك كسر (که صورتش  $dy$  و مخرجش  $dx$  باشد) تعبیر نکرده ایم. اکنون با تعریف دیفرانسیل می توان چنین تعبیری برای

$\frac{dy}{dx}$  نمود و آن را به عنوان يك كسر پنداشت، و این تعبیر تناقضی به بار نمی آورد، زیرا

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f'(x)dx}{dx} = f'(x)$$

حال به مثالهای دیگری در مورد کاربرد دیفرانسیل می پردازیم.

مثال ۳- فرض می کنیم  $f(x) = \sin x$  باشد. پس خواهیم داشت  $f'(x) = \cos x$  با در نظر

گرفتن رابطه تقریبی (۲) می توان چنین نوشت:

$$(7) \quad \sin(x + \Delta x) \approx \sin x + \cos x \Delta x$$

حال اگر بخواهیم مقدار تقریبی  $\sin 46^\circ$  را حساب کنیم اختیار می‌کنیم:

$$\Delta x = 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ و } x = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

داریم

$$46^\circ = 45^\circ + 1^\circ = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{180}$$

اینک با در نظر گرفتن این مقادیر رابطه (۷) چنین می‌شود:

$$\sin 46^\circ = \sin \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{180} \right) \approx \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \times \frac{\pi}{180}$$

و از آنجا:

$$\sin 46^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\pi}{180} = 0,7071 + 0,7071 \times 0,017 = 0,7194$$

نکته - اگر در فرمول (۷) فرض شود  $x = 0$  و  $\Delta x = \alpha$  خواهیم داشت:

$$\sin \alpha \approx \alpha$$

یعنی اگر زاویه بسیار کوچک باشد اندازه آن بر حسب رادیان با سینوس آن زاویه تقریباً برابر است.

همچنین اگر  $f(x) = \operatorname{tg} x$  آنوقت  $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$  و رابطه (۴) چنین می‌شود:

$$\operatorname{tg}(x + \Delta x) \approx \operatorname{tg} x + \frac{1}{\cos^2 x} \times \Delta x$$

حال اگر  $x = 0$  و  $\Delta x = \alpha$  آنوقت  $\operatorname{tg} \alpha \approx \alpha$  شده و نتیجه می‌گیریم که اگر اندازه زاویه‌ای

بسیار کوچک باشد اندازه آن بر حسب رادیان با  $\operatorname{tg}$  آن تقریباً برابر است.

در خطکش محاسبه زوایایی که اندازه آنها کمتر از ۵ درجه و ۴۴ دقیقه است، مقادیر

سینوس و تانژانت آنها با اندازه خود زاویه بر حسب رادیان برابر گرفته می‌شود:

$$(\sin 5^\circ, 44' = 0,1)$$

مثال ۳ - اگر  $f(x) = \sqrt{x}$  باشد، از (۴) نتیجه می‌شود:

$$\sqrt{x + \Delta x} \approx \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \times \Delta x$$

حال اگر جذر تقریبی ۱۰۵ را بخواهیم کافی است  $x = 100$  و  $\Delta x = 5$  اختیار گردد در

این حال خواهیم داشت:



$$\sqrt{105} = 10 + \frac{1}{2\sqrt{100}} \times 5 = 10 + 0,25 = 10,25$$

یا اگر جذر تقریبی ۹۸ را بخواهیم  $x = 100$  و  $\Delta x = -2$  اختیار شده و خواهیم داشت:

$$\sqrt{100 - 2} = 10 + \frac{1}{2\sqrt{100}} \times (-2) = 10 - 0,1 = 9,9$$

۳-۳- تغییر هندسی دیفرانسیل - فرض می‌کنیم (C) منحنی نمایش تغییرات تابع مشتق پذیر

باشد. نقطه دلخواه  $M(x, y)$  را روی این منحنی اختیار کرده و مماس بر منحنی در این نقطه را رسم نموده و زاویه این مماس با جهت مثبت محور  $x$ ها را  $\alpha$  می‌نامیم. چون فرض بر این است که در این نقطه  $M$  تابع دارای مشتق معینی است پس  $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$  متغیر مستقل را به اندازه  $\Delta x$  تغییر می‌دهیم نقطه نظیر  $x + \Delta x$  روی منحنی نقطه  $M_1$  می‌شود که عرضش  $y + \Delta y$  است.



در مثلث MNT :

$$NT = MN \times \operatorname{tg} \alpha$$

چون  $\operatorname{tg} \alpha = f'(x)$  و  $MN = \Delta x$  است پس:

$$NT = f'(x) \cdot \Delta x$$

ولی طبق تعریف دیفرانسیل:  $f'(x)\Delta x = dy$  می‌باشد، پس:

$$NT = dy$$

و از آنجا:

دیفرانسیل تابع  $f(x)$  به ازای مقادیر مفروض  $x$  و  $\Delta x$  برابر است با نمو عرضی خط

مماس در نقطه مفروض  $x$  بر منحنی  $y = f(x)$

$$M_1T = \Delta y - dy$$

در شکل الف دیده می‌شود که:

نباید تصور کرد که همواره  $\Delta y$  از  $dy$  بزرگتر است. به طوری که در شکل ب دیده

می‌شود :

$$\Delta y < dy \quad \text{و} \quad dy = NT \quad \text{و} \quad \Delta y = M_1N$$

۳-۳- فرمولهای یافتن دیفرانسیل - با در نظر گرفتن رابطه (۶) شماره ۳-۱ در زیر

فرمولهای دیفرانسیل توابع مختلفی را که تاکنون دیده‌ایم یادآور می‌شویم :

۱)  $d(c) = 0$

- ۲)  $d(x) = dx$
- ۳)  $d(u + v - w) = du + dv - dw$
- ۴)  $d(cv) = cdv$  (  $c$  مقداری است ثابت )
- ۵)  $d(u \cdot v) = u dv + v du$
- ۶)  $d(u^n) = nu^{n-1} du$
- ۷)  $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$
- ۸)  $d\left(\frac{u}{c}\right) = \frac{1}{c} du$  (  $c$  مقداری است ثابت )
- ۹)  $d(\sqrt{u}) = \frac{du}{2\sqrt{u}}$
- ۱۰)  $d(\sqrt[n]{u}) = \frac{du}{n \sqrt[n]{u^{n-1}}}$
- ۱۱)  $d(\sin u) = \cos u du$
- ۱۲)  $d(\cos u) = -\sin u du$
- ۱۳)  $d(\operatorname{tg} u) = \operatorname{sec}^2 u du$  (  $\operatorname{sec} u = \frac{1}{\cos u}$  )
- ۱۴)  $d(\operatorname{cotg} u) = -\operatorname{cosec}^2 u du$  (  $\operatorname{cosec} u = \frac{1}{\sin u}$  )
- ۱۵)  $d(\operatorname{sec} u) = \operatorname{sec} u \operatorname{tg} u du$
- ۱۶)  $d(\operatorname{cosec} u) = -\operatorname{cosec} u \operatorname{cotg} u du$

### تمرین

دیفرانسیل توابع زیر را محاسبه کنید:

- ۱)  $y = 3x^2 - 8x + 9$
- ۲)  $y = \frac{3x^2 - 7x - 3}{2x^2 + 9x + 2}$
- ۳)  $y = (2x^2 + 8x^2 - 9x + 8)^2$
- ۴)  $y = \sqrt{2x^2 - 8x^2 + 5x}$
- ۵)  $y = \sin^2 2x$

$$۶) y = \cos^5 \sqrt{x}$$

$$۷) y = \operatorname{tg}^4 \frac{1}{x}$$

$$۸) y = \operatorname{cotg}^4 \sqrt[3]{x^2}$$

۹- جذر تقریبی  $\sqrt{۶۳۰}$  و  $\sqrt{۶۲۰}$  و  $\sqrt{۷۳۰}$  را بیابید (با استفاده از دیفرانسیل).

۱۰- به کمک دیفرانسیل مقدار تقریبی  $\operatorname{tg} ۴۶^\circ$  و  $\cos ۴۶^\circ$  و  $\sin ۷۶^\circ$  و  $\operatorname{tg} ۲۳^\circ$  را

بیابید.

درستی روابط زیر را ثابت کنید.

$$۱۱) d \left[ (۲۱x^2 - ۲۴x + ۳۲) \sqrt[4]{(x+1)^2} \right] = \frac{۲۳۱x^2 dx}{۴\sqrt[4]{x+1}}$$

$$۱۲) d[\sin x \cos x (2 \cos^2 x + 2) + 2x] = 8 \cos^2 x dx$$

۱۳- نخست ثابت کنید که  $d(\operatorname{arctg} x) = \frac{dx}{1+x^2}$  سپس درستی رابطهای زیر را

ثابت کنید:

$$d[x \operatorname{arctg} x] = \operatorname{arctg} x dx + \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$d(2x^2 \operatorname{arctg} x - x^2) = 6x^2 \operatorname{arctg} x dx - \frac{2x}{1+x^2} dx$$

۱۴- نخست ثابت کنید  $d(\operatorname{arcsin} u) = \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$  سپس درستی روابط زیر را

ثابت کنید:

$$\text{الف } d(\operatorname{arcsin} 2x \sqrt{1-x^2}) = d(2 \operatorname{arcsin} x)$$

$$\text{ب } d\left(\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right) = d(\operatorname{arc} \cos x)$$

$$\text{ج } d\left(\frac{x}{1+x^2} + \operatorname{arctg} x\right) = \frac{2dx}{(1+x^2)^2}$$

انتهای نامعین

۴-۴- پیشگفتار در گفتارهای پیشین با مسائلی از این قبیل روبرو بودیم:

الف- تابعی مانند  $F(x)$  مفروض است، مشتق این تابع یعنی  $f(x) = F'(x)$  را بیاید.

ب- معادله يك منحنی  $y = E(x)$  است. معادله ضریب زاویه ایهای مماسهای این منحنی یعنی:

$$\frac{dy}{dx} = F'(x) = f(x)$$

را بیاید. در این گفتار با مسئله وارون این اعمال روبرو هستیم. یعنی در این مبحث معادله ضریب زاویه ایهای مماسهای بر منحنی را می دهند و معادله منحنی را می خواهند. یا، مشتق يك تابع را می دهند و خود تابع را طلب می کنند.

۳-۵- تعریف تابع اولیه - تابع  $F(x)$  را يك تابع اولیه تابع  $f(x)$  در فاصله I گویند هر گاه در جميع نقاط I رابطه  $F'(x) = f(x)$  برقرار باشد.

مثال ۱- تابع  $F(x) = x^4$  تابع اولیه  $f(x) = 4x^3$  است زیرا:

$$\frac{d(x^4)}{dx} = 4x^3$$

مثال ۲- تابع  $F(x) = \cos x$  تابع اولیه  $f(x) = -\sin x$  است زیرا:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

مثال ۳- تابع  $f(x) = 3x^2 + 4x$  معادله ضریب زاویه ایهای مماسهای بر منحنی نمایش تابع

$F(x) = x^3 + 2x^2$  می باشد، زیرا:

$$\frac{d}{dx}(x^3 + 2x^2) = 3x^2 + 4x$$

به آسانی دیده می شود که اگر  $f(x)$  يك تابع اولیه داشته باشد، آنگاه تابع اولیه های زیادی

دارد. مثلاً در مثال ۱ توابع  $F(x) = x^4 + 1$  و  $F(x) = x^4 - 1$  و  $F(x) = x^4 + 5$

به طور کلی  $F(x) = x^4 + c$  همگی تابع اولیه های مختلف  $f(x) = 4x^3$  می باشند، و اختلاف آنها

در عددی ثابت می باشد. یعنی اگر  $f(x)$  و  $\Phi(x)$  دو تابع اولیه  $f(x)$  باشند،

$$F(x) - \Phi(x) = c$$

زیرا طبق تعریف:  $F'(x) = f(x)$  و  $\Phi'(x) = f(x)$

و از آنجا:  $f'(x) - \Phi'(x) = 0$

اما ثابت می کنند که: هر گاه مشتق تابعی روی يك فاصله متحد صفر باشد، آنگاه آن تابع

روی آن فاصله ثابت است.

پس باید  $F(x) - \Phi(x)$  برابر مقدار ثابتی باشد تا مشتق آن یعنی  $F'(x) - \Phi'(x)$  متحد صفر گردد.

مسئله یافتن تابعی که مشتق آن  $f(x)$  باشد و مسأله یافتن تابعی که دیفرانسیل آن  $f(x)dx$  باشد هر دو یکی هستند و جوابهای آنها مانند هم است. از این روی میتوان عمل تابع اولیه گرفتن را عکس عمل دیفرانسیل گیری نیز دانست. برای مشتق و دیفرانسیل تابع  $f$  به ترتیب نمادهای  $f'(x)$  و  $f'(x)dx$  را به کار برده ایم؛ و نمادی که برای عکس این اعمال به کار برده می شود  $\int f(x)dx$  می باشد که «انتگرال  $f(x)dx$ » یا بطور مختصر «انتگرال  $f$ » خوانده می شود و آن هر یک از توابع اولیه  $f$  است. این نماد انتگرال نامعین نیز نامیده می شود (واژه نامعین در مقابل واژه معین در مورد انتگرال بکار برده می شود، که بعداً تقریباً با آن آشنا خواهید شد.) طبق تعریف نماد  $\int f(x)dx$  داریم:

$$(\int f(x)dx)' = f(x)$$

و

$$d(\int f(x)dx) = f(x)dx$$

و اگر  $F$  یک تابع اولیه  $f$  باشد آنوقت

$$\int dF = \int f(x)dx = F(x) + C$$

هدف ما در این بخش یافتن انتگرال برخی از توابعی است که در این کتاب خوانده ایم.

البته لازم به تذکر است که انتگرال (یا تابع اولیه) هر تابعی را نمی توان به دست آورد.

نخستین فرمولی که درباره انتگرالگیری توابع ارائه می دهیم عبارت است از:

$$\int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + c, \quad m \neq -1 \text{ عددی است گویا}$$

برای اثبات درستی فرمول بالا کافی است از  $\frac{x^{m+1}}{m+1}$  دیفرانسیل بگیریم و ببینیم که برابر

$x^m dx$  می شود.

مثال ۱- تعیین تابع اولیه  $f(x) = x^5$ .

طبق فرمول خواهیم داشت

$$\int x^5 dx = \frac{x^{5+1}}{5+1} + c = \frac{1}{6}x^6 + c$$

مثال ۲- تابع اولیه  $y = \sqrt{x^3}$  می شود:

$$\int \sqrt{x^3} dx = \int x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + c = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + c = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + c$$

مثال ۳- تابع اولیه  $y = \frac{1}{\sqrt{x^r}}$  می‌شود:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^r}} dx = \int x^{-\frac{r}{2}} dx = \frac{x^{-\frac{r}{2}+1}}{-\frac{r}{2}+1} + c = \frac{x^{\frac{2-r}{2}}}{\frac{2-r}{2}} + c = \frac{2}{2-r} \sqrt{x^r} + c$$

مثال ۴- تعیین تابع اولیه  $f(x) = \frac{1}{x^5}$

$$\int \frac{1}{x^5} dx = \int x^{-5} dx = \frac{x^{-5+1}}{-5+1} + c = \frac{x^{-4}}{-4} + c = -\frac{1}{4x^4} + c$$

مثال ۵- محاسبه انتگرال  $f(x) = \frac{x^r \sqrt{x^r}}{\sqrt{x^r}}$

$$\int \frac{x^r \sqrt{x^r}}{\sqrt{x^r}} dx = \int x^r \times x^{\frac{r}{2}} \times x^{-\frac{r}{2}} dx$$

$$= \int x^{\frac{3r}{2}} dx = \frac{x^{\frac{3r}{2}+1}}{\frac{3r}{2}+1} + c = \frac{2}{3r+2} x^{\frac{3r}{2}+1} + c = \frac{2}{3r+2} x^{\frac{3r}{2}} \sqrt{x} + c$$

تمرین

تابع اولیه توابع زیر را نسبت به  $x$  بیابید.

۱)  $f(x) = x$

۲)  $f(x) = x^2 + 3x$

۳)  $f(x) = \frac{1}{x^4}$

۴)  $f(x) = \sqrt{x^r}$

۵)  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^r}}$

۶)  $f(x) = \frac{x^r \sqrt{x^r}}{\sqrt{x}}$

از تساویهای زیر  $y$  را محاسبه کنید:

۷)  $\frac{dy}{dx} = 3ax^2$

۸)  $\frac{dy}{dx} = 3x^2$



$$9) \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - 2x + 2}{x^2}$$

$$10) \frac{dy}{dx} = \frac{(1+x^2)(1-2x^2)}{x^2}$$

۱۱- ضریب زاویه‌ای خطی که از نقاط  $A(-4, 5)$  و  $B(2, 6)$  می‌گذرد چقدر است؟ معادله این خط را با استفاده از انتگرال بیابید.

۱۲- يك منحنی از نقطه  $A(2, 0)$  می‌گذرد و معادله ضریب زاویه‌ای آن  $2x^2 - \frac{1}{x^2}$

است. معادله منحنی را بیابید.

۳- چند فرمول دیگری برای انتگرال‌گیری

۱- انتگرال مجموع یا تفاضل چند جمله‌گیری برابر است با مجموع یا تفاضل انتگرال‌های یکایک آن جمله‌ها یعنی:

$$(1) \int (du + dv - dw) = \int du + \int dv - \int dw$$

در رابطه بالا  $u$  و  $v$  و  $w$  تابعی از متغیر مستقل مانند  $x$  می‌باشند

$$(2) \int a dv = a \int dv \quad a \text{ عددی است ثابت} \quad -2$$

$$(3) \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c \quad \text{و} \quad n+1 \neq 0 \quad -3$$

اینک طی چند مثال زیر طرز یافتن انتگرال برخی از تابعها را به کمک دستورهای بالانشان

می‌دهیم:

مثال ۱ - محاسبه:

$$\int 24(2x+2)^2 dx$$

فرض می‌کنیم  $u = 2x + 2$  از آنجا خواهیم داشت:

$$2 dx = du \Rightarrow dx = \frac{1}{2} du$$

در نتیجه:

$$\int 24(2x+2)^2 dx = \int 24u^2 \times \frac{1}{2} du$$

$$= \frac{1}{2} \times 24 \int u^2 \times du = 12 \frac{u^3}{3} + c = u^3 + c$$

با قرار دادن مقدار  $u$  خواهیم داشت:

$$\int 24(2x+2)^2 = (2x+2)^3 + c$$

مثال ۲ - محاسبه:

$$\int \frac{24 dx}{(-2x+6)^4}$$

فرض می کنیم  $u = -2x + 6$  از آنجا خواهیم داشت:

$$-2dx = du \quad dx = -\frac{1}{2}du$$

$$\begin{aligned} \int \frac{24dx}{(-2x+6)^4} &= \int \frac{24 \left(-\frac{1}{2}du\right)}{u^4} = \int \frac{-12du}{u^4} \\ &= -12 \int u^{-4} du = -12 \times \frac{u^{-4+1}}{-4+1} + c = u^{-3} + c = \frac{1}{u^3} + c \end{aligned}$$

واز آنجا:

$$\int \frac{24dx}{(-2x+6)^4} = \frac{1}{(-2x+6)^3} + c$$

مثال ۳ - محاسبه:

$$\int \frac{14dx}{\sqrt[5]{(7x-2)^2}}$$

فرض می کنیم  $u = 7x - 2$  از آنجا:

$$7dx = du \Rightarrow dx = \frac{1}{7}du$$

$$\int \frac{14dx}{\sqrt[5]{(7x-2)^2}} = \int \frac{14 \times \frac{1}{7} du}{\sqrt[5]{u^2}} = \int \frac{2}{\sqrt[5]{u^2}} du$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{u^{-\frac{2}{5}+1}}{-\frac{2}{5}+1} + c = \frac{2}{5} \times \frac{u^{\frac{3}{5}}}{\frac{3}{5}} + c = \sqrt[5]{u^3} + c$$

$$\int \frac{14dx}{\sqrt[5]{(7x-2)^2}} = \sqrt[5]{(7x-2)^3} + c$$

سرانجام:

$$\int \frac{(x+3)dx}{\sqrt{x^2+6x+7}}$$

مثال ۴ - محاسبه:

فرض می کنیم  $u = \sqrt{x^2+6x+7}$  از آنجا:

$$x^2+6x+7 = u^2 \Rightarrow (2x+6)dx = 2udu$$

$$(x+3)dx = udu$$

$$\int \frac{(x+2)dx}{\sqrt{x^2+6x+7}} = \int \frac{udu}{u} = \int du = u + c$$

سرانجام :

$$\int \frac{(x+2)dx}{\sqrt{x^2+6x+7}} = \sqrt{x^2+6x+7} + c$$

مثال ۵ - محاسبه :

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x}}$$

فرض می‌کنیم  $u = \sqrt{1-x}$  از آنجا خواهیم داشت :

$$1-x = u^2 \Rightarrow x = 1-u^2 \Rightarrow dx = -2u du$$

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x}} = \int \frac{(1-u^2)^2 (-2u du)}{u}$$

$$= \int (-2 + 4u^2 - 2u^4) du = -2u + \frac{4}{3}u^3 - \frac{2}{5}u^5 + c$$

$$= -u \left( 2 - \frac{4}{3}u^2 + \frac{2}{5}u^4 \right) + c$$

$$= -u \times \frac{20 - 20u^2 + 6u^4}{15} + c$$

$$= -\frac{2}{15}u(15 - 10u^2 + 3u^4) + c$$

سرانجام :

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x}} = -\frac{2}{15} \sqrt{1-x} [15 - 10(1-x) + 3(1-x)^2] + c$$

$$= -\frac{2}{15} \sqrt{1-x} (8 + 4x + 3x^2) + c$$

مثال ۶ - محاسبه :

$$\int (x^2 - 2x^2 + x + 5)(x-2)^{10} dx$$

فرض می‌کنیم  $u = x-2$  از آنجا خواهیم داشت :

$$x = u+2 \Rightarrow dx = du$$

$$x^2 - 2x^2 + x + 5 = (u+2)^2 - 2(u+2)^2 + (u+2) + 5 =$$

$$u^2 + 6u^2 + 12u + 8 - 2u^2 - 8u - 8 + u + 2 + 5 =$$

$$u^r + \epsilon u^r + \delta u + \gamma$$

$$\int (x^r - 2x^r + x + \delta)(x - 2)^{100} dx = \int (u^r + \epsilon u^r + \delta u + \gamma) u^{100} du$$

$$= \int u^{100+r} du + \epsilon \int u^{100+r} du + \delta \int u^{100} du + \gamma \int u^{100} du$$

$$= \frac{u^{100+r}}{100+r} + \epsilon \frac{u^{100+r}}{100+r} + \delta \frac{u^{100}}{100} + \gamma \frac{u^{100}}{100} + c$$

سرانجام:

$$\int (x^r - 2x^r + x + \delta)(x - 2)^{100} = \frac{1}{100+r}(x - 2)^{100+r} + \frac{\epsilon}{100+r}(x - 2)^{100+r}$$

$$+ \frac{\delta}{100}(x - 2)^{100} + \frac{\gamma}{100}(x - 2)^{100} + c$$

تمرین

انتهای زیر را حساب کنید :

۱)  $\int (-9x + 8)^6 dx$

۲)  $\int \frac{dx}{(-9x + 8)^6}$

۳)  $\int \sqrt[3]{(4x - 3)^7} dx$

۴)  $\int \frac{dx}{\sqrt[5]{(-3x + 1)^6}}$

۵)  $\int (4x^2 + 8x) \sqrt{x^2 + 4x^2} dx$

۶)  $\int \frac{(-12x + 16) dx}{\sqrt[5]{(-3x^2 + 8x + 9)^6}}$

۷)  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{2-x}}$

دستی روابط زیر را ثابت کنید :

۸)  $\int \sqrt[5]{x^r} dx = \frac{1}{10} x^{10} \sqrt[5]{x^r} + c$

۹)  $\int x^1 \sqrt[5]{x^r} dx = \frac{1}{12} x^{12} \sqrt[5]{x^r} + c$

$$۱۰) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(3x-1)^6}} = \frac{1}{9} \sqrt[3]{(3x-1)^{-5}} + c$$

$$۱۱) \int \frac{(3x+5)dx}{(x-2)^5} = \frac{-3}{4(x-2)^4} - \frac{11}{9(x-2)^3} + c$$

$$۱۲) \int (-2x+1) \sqrt[4]{(-x^2+x)^5} dx = \frac{1}{12} (-x^2+x) \sqrt[4]{(-x^2+x)^5} + c$$

$$۱۳) \int (3x+1)(x-2)^{5/2} dx = \frac{3}{5/2}(x-2)^{5/2} + \frac{1}{5/2}(x-2)^{3/2} + c$$

$$۱۴) \int \frac{(1+\sqrt{x})^2}{\sqrt{x}} dx = \frac{2}{3}(1+\sqrt{x})^3 + c$$

$$۱۵) \int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^5} = \frac{-1}{12(x^2-1)^4} + c$$

$$۱۶) \int \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{x})^2}{\sqrt{x}} dx = -\frac{2(\sqrt{a}-\sqrt{x})^3}{3} + c$$

$$۱۷) \int \frac{(x^2+1)dx}{\sqrt{x^2+3x}} = \frac{2\sqrt{x^2+3x}}{3} + c$$

$$۱۸) \int x^{n-1} \sqrt{a+bx^n} dx = \frac{2(a+bx^n)^{3/2}}{3nb} + c$$

$$۱۹) \int \frac{t^2 dt}{(a+bt^2)^2} = -\frac{1}{9(a+bx^2)^2} + c$$

$$۲۰) \int \frac{(x+2)dx}{\sqrt{1+x}} = \frac{2}{3}(x+2)\sqrt{1+x} + c$$

۳-۷- مقدار ثابت انتگرال در پیشگفتار این بحث، دیدیم که يك تابع دارای ینهایت

انتگرال یا تابع اولیه است که اختلاف آنها در عدد ثابت انتگرالی می باشد و بهمین جهت

نوشتم:

$$\int f'(x) dx = f(x) + c$$

این مقدار ثابت یعنی c با در دست داشتن برخی اطلاعات در مورد تابع قابل محاسبه است. به

مثال زیر توجه کنید:

مثال - مشتق تابعی برابر است با:

$$\frac{dy}{dx} = 12x^2 + 21x^2 - 18x + 8$$

مطلوب است یافتن این تابع در صورتی که بدانیم مقدار این تابع به ازای  $x=1$  برابر صفر است.

حل - چون:

$$\frac{dy}{dx} = 12x^2 + 21x^2 - 18x + 8$$

از آنجا:

$$dy = (12x^2 + 21x^2 - 18x + 8)dx$$

در نتیجه:

$$y = \int (12x^2 + 21x^2 - 18x + 8)dx$$

پس:

$$y = 3x^4 + 7x^3 - 9x^2 + 8x + c$$

طبق صورت مسئله به ازای  $x=1$  خواهیم داشت  $y=0$  در نتیجه:

$$0 = 3 + 7 - 9 + 8 + c \Rightarrow c = -9$$

سرانجام:

$$y = 3x^4 + 7x^3 - 9x^2 + 8x - 9$$

۴-۸- تعبیر هندسی عدد ثابت انتگرال - این تعبیر را با ذکر مثال زیر تفسیر می کنیم.

مثال - مطلوب است تابعی که در هر نقطه منحنی نمایش آن معادله ضریب زاویه ای مماس

بر منحنی  $2x$  باشد.

حل - چون  $\frac{dy}{dx} = 2x$ ، پس:

$$dy = 2x dx$$

و از آنجا:

$$y = \int 2x dx = x^2 + c$$

حال اگر به جای  $c$  اعداد مختلف مانند ۲ و ۱ و ۰ و -۱ و -۲ قرار دهیم خواهیم داشت:


$$c=2 \Rightarrow y=x^2+2$$

$$c=1 \Rightarrow y=x^2+1$$

$$c=0 \Rightarrow y=x^2$$

$$c=-1 \Rightarrow y=x^2-1$$

$$c=-2 \Rightarrow y=x^2-2$$



این توابع مختلف متعلق به یک خانواده از سهمی‌ها هستند که محور  $y$ ‌ها را به ترتیب در نقاطی به عرض ۲ و ۱ و ۰ و -۱ و -۲ قطع می‌کنند و به ازای یک مقدار ثابت برای  $x$  ضریب زاویه‌ایهای مماس همگی آنها ثابت است. مثلاً به ازای  $x=1$  ضریب زاویه مماس تمامی آنها ۲ است. اگر در این مثال اطلاعات دیگری داشته باشیم می‌توانیم عدد ثابت و تابع مربوطه را حساب کنیم. مثلاً اگر بدانیم به ازای  $x=1$  مقدار  $y$  عدد ۳ است به دست می‌آوریم:

$$3 = 1 + c \Rightarrow c = 2$$

و در نتیجه  $y = x^2 + 2$

تمرین

هر یک از عبارتهای زیر دیفرانسیل تابعی می‌باشند. این تابعها را با اطلاعات داده شده

بیابید.

مقدار $y$ نظیر	مقدار متغیر	دیفرانسیل
۵	۲	۱) $(2x-4)dx$
c	۰	۲) $(2ax+b)dx$
۰	۴	۳) $(\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}})dt$
۸	۵	۴) $(\sqrt{rs+1})ds$
۰	۱	۵) $(-4x^3+8x-3)dx$

(۶) - مشتق تابعی در نقطه  $(x, y)$  برابر  $\frac{x+1}{y+1}$  است. در صورتی که به ازای  $x=0$

مقدار این تابع ۱ باشد، این تابع را بیابید.

جواب :  $(y+1)^2 = (x+1)^2 + 2$

(۷) - مشتق تابعی در نقطه  $(x, y)$  برابر  $\frac{4-x}{2y-3}$  است در صورتی که به ازای  $x=1$

مقدار این تابع برابر ۲ باشد این تابع را بیابید.

جواب :  $2(x-4)^2 + (2y-3)^2 = 19$

(۸) - در صورتی که  $\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y}$  باشد مقدار  $y$  را بیابید، در صورتی که بدانیم به ازای

$x=3$  خواهیم داشت  $y=4$

جواب :  $x^2 + y^2 = 25$

(۹) - مشتق تابعی  $\sqrt{3x} - x^4$  است. مطلوب است این تابع در صورتی که به ازای

$x=3$  داشته باشیم  $y=2$


(۱۰) - مشتق تابعی  $\frac{3x+4}{\sqrt{2x+1}}$  است. مطلوب است این تابع در صورتی که به ازای

$x=4$  داشته باشیم  $y=1$

### انتگرال معین

تاکنون هرچه انتگرال دیده‌ایم، اصطلاحاً «انتگرال نامعین» نامیده می‌شوند. اینک از انتگرالهایی گفتگو خواهیم کرد که آنها را «انتگرال معین» خواهیم نامید. دلیل این نامگذاری را در پایان این گفتار خواهید یافت. انتگرال معین مفهومی است اساسی در ریاضی و فیزیک و مکانیک و سایر رشته‌های علوم.





۳-۹- سطح زیر منحنی - فرض می‌کنیم منحنی  $(\gamma)$  نمایش هندسی تابع پیوسته و غیر منفی  $y = f(x)$  در فاصله‌ای باشد. فرض کنید که عرض نقطه ثابتی از این منحنی در نقطه‌ای به طول  $a$  و عرض متغیری از نقطه متغیر  $P$  واقع بر منحنی باشد، سطح محصور بین خطوط  $AB$  و  $AM$  و  $MP$  و قوس  $\widehat{BP}$  از منحنی را  $S$  می‌نامیم. حال اگر  $x$  نمو کوچکی مانند  $\Delta x$  اختیار کند، یعنی نمو سطح، سطح محصور بین خطوط  $PM$  و  $MN$  و  $NQ$  و قوس  $\widehat{PQ}$  از منحنی است. طبق شکل بالا می‌توان چنین نوشت:

$$\text{سطح MNQK} < \text{سطح MNPQ} < \text{سطح MNRP}$$

و از آنجا:

$$(1) MP \times \Delta x < \Delta S < NQ \times \Delta x$$

(توجه: در این شکل  $MP$  و  $NQ$  به ترتیب عرضهای می‌نیم و ماکزیم مطلق تابع  $f$  روی فاصله  $[x, x + \Delta x]$  می‌باشند. در حالت کلی برای آن که رابطه‌ای نظیر (۱) برقرار باشد باید مستطیل داخلی را به ارتفاع می‌نیم مطلق تابع روی  $[x, x + \Delta x]$  و مستطیل بیرونی را به ارتفاع ماکزیم مطلق تابع روی  $[x, x + \Delta x]$  اختیار کرد.)

طرفین نامساوی مضاعف بالا را بر  $\Delta x$  تقسیم می‌کنیم (طبق شکل  $\Delta x > 0$  است و تقسیم بر  $\Delta x$  جهت نامساوی را تغییر نمی‌دهد):

$$MP < \frac{\Delta S}{\Delta x} < NQ$$

حال  $\Delta x$  را به سوی صفر میل می‌دهیم. چون  $MP$  ثابت است عرض  $QN$  به سوی  $MP$

نزدیک می‌شود (زیرا  $y$  تابعی است پیوسته). در نتیجه خواهیم داشت :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \left( \frac{\Delta S}{\Delta x} \right) = y (=MP)$$

به همین ترتیب می‌توان برای حالت  $\Delta x < 0$  بحث را دنبال کرد و به دست آورد که :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \left( \frac{\Delta S}{\Delta x} \right) = y (=MP)$$

یعنی :  $\frac{ds}{dx} = y$  و از آنجا  $dS = y dx$  و سرانجام :  $S = \int y dx$

لذا می‌توان قضیه زیر را بیان کرد :

۳-۱۰- قضیه- فرض کنید که تابع  $f$  در فاصله  $[a, b]$  پیوسته و غیرمنفی باشد و  $a \leq t \leq b$ . فرض کنید  $S(t)$  مساحت سطح محصور به منحنی نمایش  $f$  و محور  $x$  ها و خطوط  $x=t$  و  $x=a$  باشد. آنوقت مشتق تابع  $S$  در هر نقطه برابر  $f$  است یعنی

$$S'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

حال فرض می‌کنیم که :  $\int f(x) dx = F(x) + c$

هنگامی که  $x$  برابر  $a$  اختیار شود سطح صفر است و لذا خواهیم داشت :

$$0 = F(a) + c$$

$$c = -F(a)$$

و از آنجا :

حال اگر  $x$  را  $b$  اختیار کنیم و  $F(b) - F(a)$  را بسا

$[F(x)]_a^b$  نشان دهیم، سطح مربوط برابر خواهد بود با :

$$S(b) = F(b) + c = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

یعنی :

۳-۱۱- قضیه - فرض کنید که  $F$  تابع اولیه‌ای برای تابع پیوسته و غیرمنفی  $f$  باشد.

سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع  $y = f(x)$  و محور  $x$  ها و دو خط به معادله

$x = a$  و  $x = b$  (به فرض  $b > a$ ) برابر است با :

$$S = F(b) - F(a)$$

مرسوم است که عدد  $S = F(b) - F(a)$  را به شکل :

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

بنویسند و آن را چنین قرائت کنند:

« انتگرال  $f(x)dx$  از  $a$  تا  $b$  »

واضح است که حاصل  $\int_a^b f(x)dx$  عددی است معین و معلوم و به همین دلیل انتگرالهایی

$$\int_a^b f(x)dx$$

نظیر:

را انتگرال معین و سایر انتگرالها را نامعین نامگذاری می کنند.  $a$  و  $b$  را حدود انتگرال معین می گویند. لازم به تذکر است که مفهوم کلی انتگرال معین و انتگرال گیری چیز دیگری است و در آن لازم نیست تابع مورد بحث پیوسته یا غیر منفی باشد. مفهوم انتگرال معین را در درسهای عالی تر ریاضی مورد بحث قرار می دهند و چیزی که مادر اینجا به عنوان مساحت زیر منحنی یک تابع غیر منفی و پیوسته مورد بحث قرار دادیم به حالت خاصی از انتگرال معین ارتباط پیدا می کند و مقدار مساحت در این حالت همان انتگرال معین تابع خواهد شد. عدد ثابت در محاسبه انتگرالهای معین از بین میرود، زیرا:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x) + c]_a^b = F(b) + c - F(a) - c = F(b) - F(a)$$

و به همین دلیل در محاسبات انتگرالهای معین عدد ثابت انتگرالگیری را نمی نویسند.

**مثال -** مطلوب است محاسبه سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع

$$y = -x^2 + 5x$$

و محور  $x$ ها و خطوط  $x=1$  و  $x=4$

طبق گفتار بالا خواهیم داشت:

$$S = \int_1^4 (-x^2 + 5x) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} \right]_1^4$$
$$= \left( \frac{-64}{3} + \frac{80}{2} \right) - \left( -\frac{1}{3} + \frac{5}{2} \right) = \frac{-64}{3} + \frac{75}{2} = -21 + \frac{75}{2} = \frac{33}{2}$$

**یادآوری -** در گفتارهای بعد مطالب بیشتری در مورد محاسبه سطح زیر منحنی و حجم حاصل از دوران منحنی حول محور  $x$ ها بیان خواهیم داشت. در این گفتار فقط به این مطلب اشاره می کنیم که اگر برای محاسبه انتگرال معین به تغییر متغیر نیازمند شدیم باید حدود انتگرالگیری را نیز تغییر دهیم. ( البته این مطلب احتیاج به اثبات دارد ولی ما در اینجا آن

را بدون اثبات می پذیریم).

$$\int_0^3 \frac{(x-2)dx}{\sqrt{\Delta x+1}}$$

مثال - محاسبه:

فرض می کنیم  $\sqrt{\Delta x+1} = u$  باشد. در نتیجه:

$$\Delta x+1 = u^2 \Rightarrow \Delta dx = 2u du \Rightarrow dx = \frac{2}{\Delta} u du$$

$$x-2 = \frac{u^2-1}{\Delta} - 2 = \frac{u^2-11}{\Delta}$$

$$x=3 \Rightarrow u = \sqrt{\Delta x+1} = \sqrt{1\Delta+1} = 2$$

$$x=0 \Rightarrow u = \sqrt{0+1} = 1$$

سرانجام:

$$x=3 \Rightarrow u = \sqrt{1\Delta+1} = 2$$

$$\int_0^3 \frac{(x-2)dx}{\sqrt{\Delta x+1}} = \int_1^2 \frac{\frac{u^2-11}{\Delta} \times \frac{2}{\Delta} u du}{u} = \frac{2}{2\Delta} \int_1^2 (u^2-11) du$$

$$= \frac{2}{2\Delta} \left[ \frac{u^3}{3} - 11u \right]_1^2 = \frac{2}{2\Delta} \left[ \frac{8}{3} - 22 - \left( \frac{1}{3} - 11 \right) \right]$$

$$= \frac{2}{\Delta} (-12) = \frac{-24}{\Delta}$$

تمرین

انتهای معین زیر را حساب کنید.

۱)  $\int_2^6 (3x^2 + 4x^2 - 2x + 1) dx$

۲)  $\int_1^2 x^5 dx$

۳)  $\int_1^6 (4x^2 - 2) dx$

$$۴) \int_1^2 (x^2 + 1)^5 \times 2x dx$$

$$۵) \int_0^2 (x^2 + 2) \times 2x dx$$

$$۶) \int_0^2 \frac{(8x - 3) dx}{\sqrt{4x + 1}}$$

$$۷) \int_0^9 \frac{(x + 3) dx}{\sqrt{x + 9}}$$

انتگرال تابعهای مثلثاتی

۳-۱۲- فرمولهای اصلی- با توجه به فرمولهای مشتق گیری از تابعهای مثلثاتی داریم:

$$d(\cos u) = -\sin u \cdot du$$

$$d(\sin u) = \cos u \cdot du$$

$$d(\operatorname{tg} u) = \sec^2 u \cdot du = \frac{du}{\cos^2 u} = (1 + \operatorname{tg}^2 u) du$$

$$d(\operatorname{cotg} u) = -\operatorname{cosec}^2 u \cdot du = \frac{-du}{\sin^2 u} = -(1 + \operatorname{cotg}^2 u) du$$

از این فرمولها به ترتیب نتیجه خواهد شد:

$$(۱) \int \sin u \cdot du = -\cos u + c$$

$$(۲) \int \cos u \cdot du = \sin u + c$$

$$(۳) \int \frac{du}{\cos^2 u} = \int \sec^2 u \cdot du = \int (1 + \operatorname{tg}^2 u) du = \operatorname{tg} u + c$$

$$(۴) \int \frac{du}{\sin^2 u} = \int \operatorname{cosec}^2 u \cdot du = \int (1 + \operatorname{cotg}^2 u) du = -\operatorname{cotg} u + c$$

از این فرمولها در انتگرال گیری بسیاری از تابعهای مثلثاتی استفاده می شود. به مثالهای زیر توجه کنید:

مثال ۱ - محاسبه:

$$I = \int \sin^3 x dx$$

فرض می کنیم  $u = x$  از آنجا  $du = dx$ ، یعنی  $\frac{1}{3} du = dx$  در نتیجه:

$$I = \int \sin u \times \frac{1}{\sqrt{}} du = \frac{1}{\sqrt{}} \int \sin u du = \frac{1}{\sqrt{}} (-\cos u) + c$$

$$\int \sin^3 x dx = -\frac{1}{\sqrt{}} \cos^3 x + c$$

مثال ۲ - محاسبه :

$$I = \int \sqrt{\cos 2x} dx$$

فرض می کنیم  $2x = u$  . از آنجا :  $2 dx = du$  و  $dx = \frac{1}{2} du$  :

$$I = \int \sqrt{\cos 2x} dx = \int \sqrt{\cos u} \times \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int \cos u du = \frac{1}{2} \sin u + c$$

$$\int \sqrt{\cos 2x} dx = \frac{1}{2} \sin 2x + c$$

مثال ۳ - محاسبه :

$$I = \int \sqrt{x} (1 + \tan^2 \sqrt{x}) dx$$

فرض می کنیم  $u = \sqrt{x}$  . از آنجا  $dx = \frac{1}{\sqrt{}} du$  و در نتیجه :

$$I = \int \sqrt{x} (1 + \tan^2 u) \times \frac{1}{\sqrt{}} du = \int (1 + \tan^2 u) du = \tan u + c$$

$$\int \sqrt{x} (1 + \tan^2 \sqrt{x}) dx = \tan \sqrt{x} + c$$

مثال ۴ - محاسبه :

$$I = \int \frac{-9 dx}{\sin^3 x}$$

فرض می کنیم  $u = \sin x$  . از آنجا  $dx = \frac{1}{\sqrt{}} du$  . یعنی :

$$I = \int \frac{-9 \times \frac{1}{\sqrt{}} du}{\sin^3 u} = -9 \int \frac{du}{\sin^3 u} = +3 \times \cot u + c$$

$$I = 3 \cot 3x + c$$

$$I = \int \sin^5 x \cos x dx$$

مثال ۵ - محاسبه :

فرض می کنیم  $\sin x = u$  در نتیجه  $\cos x dx = du$  می شود و از آنجا :

$$I = \int u^5 du = \frac{1}{6} \times \frac{u^6}{6} + c = \frac{1}{36} u^6 + c$$

$$I = \frac{1}{36} \sin^6 x + c$$

$$I = \int \sin^5 x dx \quad \text{مثال ۶- محاسبه:}$$

نخست یادآور می‌شویم که در این قبیل مسائل اگر توان  $\sin x$  فرد باشد روش زیر را می‌توان بکار برد و اگر توان آن زوج باشد باید روش دیگری در پیش گرفت.

$$I = \int \sin^5 x dx = \int \sin^4 x \times \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x)^2 \times \sin x dx$$

$$= \int \sin x (1 + \cos^2 x - 2\cos^2 x) dx$$

$$= \int \sin x dx + \int \cos^2 x \sin x dx - 2 \int \cos^2 x \sin x dx$$

$$= -\cos x + c_1 + \int \cos^2 x \sin x dx - 2 \int \cos^2 x \sin x dx$$

اینک فرض می‌کنیم  $\cos x = u$  باشد در نتیجه خواهیم داشت  $-\sin x dx = du$

و از آنجا:

$$\int \cos^4 x \sin x dx = \int u^4 (-du) = -\frac{u^5}{5} + c_2$$

$$\int \cos^2 x \sin x dx = \int u^2 (-du) = -\frac{u^3}{3} + c_3$$

حال با در نظر گرفتن  $c_1 + c_2 - 2c_3 = c$  خواهیم داشت:

$$I = -\cos x - \frac{\cos^5 x}{5} + \frac{2\cos^3 x}{3} + c = \frac{-1}{15} \cos x (15 + 3\cos^4 x$$

$$- 10\cos^2 x) + c$$

$$I = 12 \int \sin^2 3x dx \quad \text{مثال ۷- محاسبه:}$$

نخست چنین می‌نویسیم:

$$I = 12 \int \frac{1}{2} (1 - \cos 6x) dx = 6 \int dx - 6 \int \cos 6x dx$$

سپس با روشهای مثالهای بالا عمل می‌کنیم، خواهیم داشت:

$$I = 12 \int \sin^2 3x dx = 6x - \sin 6x + c$$

$$I = 36 \int \cos^4 6x dx \quad \text{مثال ۸- محاسبه:}$$

طبق مسئله بالا عمل می‌کنیم. چنین می‌شود:

$$I = 36 \int \cos^4 6x dx = 36 \int \frac{1}{4} (1 + \cos 12x) dx = 9 \int dx + 9 \int \cos 12x dx$$

$$= 9x + \frac{3}{4} \sin 12x + c$$

$$I = \int \cos^6 x dx \quad \text{مثال ۹- محاسبه:}$$

انتگرال بالا را می‌توان چنین نوشت:

$$I = \int \cos^4 x dx = \int (\cos^2 x)^2 dx$$

$$\begin{aligned} I &= \int \left[ \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \right]^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x + \cos^2 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx \\ &= \frac{1}{4} x + \frac{1}{16} \sin 2x + \frac{1}{8} \int \cos^2 2x dx + \frac{1}{8} \int \cos^2 2x dx \end{aligned}$$

ولی می توان چنین نوشت:

$$\begin{aligned} \int \cos^2 2x dx &= \int \frac{1}{2} (1 + \cos 4x) dx = \int \frac{1}{2} dx + \frac{1}{2} \int \cos 4x dx \\ &= \frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x \end{aligned}$$

برای محاسبه  $\int \cos^2 2x dx$  کافی است آنرا چنین بنویسیم:

$$\begin{aligned} \int \cos^2 2x dx &= \int \cos^2 2x \cos 2x dx = \int (1 - \sin^2 2x) \cos 2x dx \\ &= \int \cos 2x dx - \int \sin^2 2x \cos 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \sin 2x - \int \sin^2 2x \cos 2x dx \end{aligned}$$

برای محاسبه  $\int \sin^2 2x \cos 2x dx$  فرض می کنیم  $\sin 2x = u$  باشد در نتیجه  $2 \cos 2x dx = du$  بوده و خواهیم داشت:

$$\int \sin^2 2x \cos 2x dx = \int u^2 \times \frac{1}{2} du = \frac{1}{6} u^3 = \frac{1}{6} \sin^3 2x$$

در نتیجه خواهیم داشت:

$$I = \frac{1}{4} x + \frac{1}{16} \sin 2x + \frac{1}{8} \left( \frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x \right) + \frac{1}{8} \left( \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin^3 2x \right) + c$$

سرا انجام:

$$I = \frac{5}{16} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{64} \sin 4x - \frac{1}{48} \sin^3 2x + c$$

مثال ۱۰ - محاسبه:

$$I = \int \frac{tg^2 x dx}{\sqrt{\cos^2 x}}$$



انتگرال را چنین می نویسیم:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{\sin^r x}{\cos^r x} \times \frac{1}{\sqrt{\cos^r x}} dx \\
 &= \int \frac{\sin^r x (1 - \cos^2 x) dx}{\cos^r x \times \cos^{\frac{r}{\Delta}} x} = \int \frac{\sin x dx}{\cos^{\frac{r}{\Delta}} x} - \int \frac{\sin x dx}{\cos^{\frac{r}{\Delta}} x} \\
 &= \int \cos^{-\frac{r}{\Delta}} x \sin x dx - \int \cos^{-\frac{r}{\Delta}} x \sin x dx
 \end{aligned}$$

حال فرض می کنیم که  $\cos x = u$  باشد در نتیجه خواهیم داشت  $\sin x dx = -du$  و از آنجا:

$$\begin{aligned}
 I &= \int u^{-\frac{r}{\Delta}} (-du) - \int u^{-\frac{r}{\Delta}} (-du) \\
 &= - \int u^{-\frac{r}{\Delta}} du + \int u^{-\frac{r}{\Delta}} du = - \frac{u^{-\frac{r}{\Delta}+1}}{-\frac{r}{\Delta}+1} + \frac{u^{-\frac{r}{\Delta}+1}}{-\frac{r}{\Delta}+1} + c
 \end{aligned}$$

$$= \frac{-u^{-\frac{r}{\Delta}+1}}{-\frac{r}{\Delta}+1} + \frac{u^{-\frac{r}{\Delta}+1}}{-\frac{r}{\Delta}+1} + c$$

$$= \frac{\Delta}{13u^{\frac{r}{\Delta}} \sqrt{u^r}} - \frac{\Delta}{3\sqrt{u^r}} + c = \frac{\Delta}{\sqrt{u^r}} \left( \frac{1}{13u^{\frac{r}{\Delta}}} - \frac{1}{3} \right) + c$$

سرانجام:

$$I = \frac{\Delta}{\sqrt{\cos^r x}} \left( \frac{1}{13 \cos^{\frac{r}{\Delta}} x} - \frac{1}{3} \right) + c$$

$$\int \tan^r x dx$$

مثال ۱۱- محاسبه:

انتگرال را چنین می نویسیم:

$$\begin{aligned}
 \int \tan^r x dx &= \int (1 + \tan^2 x - 1) dx \\
 &= \int (1 + \tan^2 x) dx - \int dx = \tan x - x + c
 \end{aligned}$$

مثال ۱۳- محاسبه:

$$I = \int \operatorname{tg}^x x dx$$

$$\begin{aligned} I &= \int \operatorname{tg}^x x dx = \int (\operatorname{tg}^x x + \operatorname{tg}^x x - \operatorname{tg}^x x) dx \\ &= \int \operatorname{tg}^x x (1 + \operatorname{tg}^x x) dx - \int \operatorname{tg}^x x dx \end{aligned}$$

با در نظر گرفتن مثال ۱۱ و فرض  $\operatorname{tg} x = u$  و از آنجا  $(1 + \operatorname{tg}^x x) dx = du$  خواهیم داشت:

$$I = \frac{1}{x} \operatorname{tg}^x x - \operatorname{tg} x + x + c$$

$$\int \operatorname{cotg}^x x dx$$

مثال ۱۳- محاسبه:

انتگرال را چنین می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} \int \operatorname{cotg}^x x dx &= \int (1 + \operatorname{cotg}^x x - 1) dx \\ &= \int (1 + \operatorname{cotg}^x x) dx - \int dx = -\operatorname{cotg} x - x + c \end{aligned}$$

مثال ۱۴- محاسبه:

$$I = \int 120 (\sin^3 x - \cos^2 x)^2 dx$$

$$I = \int 120 (\sin^3 x + \cos^2 x - 2 \sin^2 x \cos^2 x) dx$$

$$= \int 120 \left( \frac{1 - \cos^2 x}{2} + \frac{1 + \cos^2 x}{2} - \sin^2 x - \sin^2 x \right) dx$$

$$= \int 120 \left( 1 - \frac{1}{2} \cos^2 x + \frac{1}{2} \cos^2 x - \sin^2 x - \sin^2 x \right) dx$$

$$= \int 120 dx - \int 60 \cos^2 x dx + \int 60 \cos^2 x dx - \int 120 \sin^2 x dx$$

$$- \int 120 \sin^2 x dx$$

$$I = 120x - 10 \sin^2 x + 10 \sin^2 x + 24 \cos^2 x + 120 \cos^2 x + c$$

تمرین

انتگرالهای زیر را محاسبه کنید

۱)  $\int \sin x dx$

۲)  $\int \cos x dx$

۳)  $\int \sin^2 x dx$

۴)  $\int \cos^2 x dx$

۵)  $\int \operatorname{tg}^x x dx$

۶)  $\int \frac{dx}{\cos^2 x}$

۷)  $\int \frac{dx}{\sin^2 x}$

۸)  $\int \operatorname{cotg}^x x dx$

۹)  $\int \sin^2 x \cos x dx$

۱۰)  $\int \cos^2 x \sin x dx$

۱۱)  $\int \sin^3 x dx$

۱۲)  $\int \cos^3 x dx$

$$۱۳) \int \cos^5 x dx$$

$$۱۴) \int \sin^5 x dx$$

$$۱۵) \int \operatorname{tg}^5 x (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx$$

$$۱۶) \int \operatorname{cotg}^5 x (1 + \operatorname{cotg}^2 x) dx$$

$$۱۷) \int \frac{\sin^6 x}{\cos^5 x} dx$$

$$۱۸) \int \frac{\cos^6 x}{\sin^5 x} dx$$

$$۱۹) \int \operatorname{tg}^6 x \times \frac{dx}{\cos^3 x}$$

$$۲۰) \int \operatorname{cotg}^6 x \times \frac{dx}{\sin^3 x}$$

$$۲۱) \int \operatorname{tg}^2 x (\sin^2 x - \cos^2 x) dx$$

$$۲۲) \int (\sin^2 x - \cos^2 x) dx$$

درستی روابط زیر را ثابت کنید.

$$۲۳) \int \sec x \operatorname{tg}^5 x dx = \frac{1}{\sqrt{\cos^5 x}} - \frac{3}{\Delta \cos^3 x} + \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\cos x} + c$$

$$۲۴) \int \frac{dx}{\cos^5 x \sqrt{1 + \operatorname{tg} x}} = 2\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} + c$$

$$۲۵) \int \frac{\operatorname{cotg}^5 x dx}{\sqrt{\sin x}} = \frac{\Delta \Delta \sin^5 x - \Delta}{\Delta \sin^5 x \sqrt{\sin x}} + c$$

$$۲۶) \int \frac{\operatorname{cotg} x dx}{\sin x \sqrt{1 + \operatorname{cosec} x}} = 2\sqrt{1 + \operatorname{cosec} x} + c$$

$$۲۷) \int \frac{\operatorname{cotg}^5 x \cdot dx}{\sin^7 x} = \frac{1}{9 \cos^5 x} - \frac{3}{\sqrt{\cos^5 x}} + \frac{3}{\Delta \cos^3 x} - \frac{1}{3 \cos^2 x} + c$$

$$۲۸) \int \frac{\operatorname{tg} x dx}{\sqrt{1 + \cos 2x}} = \frac{\sqrt{2}}{2 \cos x} + c$$

$$۲۹) \int \sec^5 x \sqrt{\operatorname{cotg} x} dx = 2\sqrt{\operatorname{tg} x} + c$$

$$۳۰) \int \sin^5 x \cos^6 x dx = \frac{\sin^7 x}{7} - \frac{2 \sin^5 x}{5} + \frac{\sin^3 x}{3} + c$$

$$۳۱) \int \operatorname{tg}^5 x dx = \frac{1}{\Delta} \operatorname{tg}^6 x - \frac{1}{3} \operatorname{tg}^4 x + \operatorname{tg}^2 x - x + c$$

$$۳۲) \int \operatorname{tg}^5 x \sec^5 x dx = \frac{\operatorname{tg}^6 x}{6} + \frac{\operatorname{tg}^4 x}{4} + c$$

$$۳۳) \int \sin^5 x \cos^5 x dx = \frac{x}{16} - \frac{\sin^4 x}{64} - \frac{\sin^2 x}{48} + c$$

$$۲۴) \int (\sin^2 x + \cos x)^2 dx = \frac{yx}{8} + \frac{2 \sin^2 x}{3} + \frac{\sin 2x}{22} + c$$

$$۲۵) \int \cot^6 x dx = -\frac{1}{5} \cot^5 x + \frac{1}{3} \cot^3 x - \cot x - x + c$$

محاسبه سطح و حجم و موارد استعمال انتگرال معین

۱۳-۴ = محاسبه سطح بین منحنی و محور طوایف - در گفتار انتگرال معین ، اشاره کردیم که

سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع  $y = f(x)$  و محور  $x$  ها، و خطوط  $x = b$  و  $x = a$  با دستور:


$$S = \int_a^b f(x) dx$$

به دست می آید. البته در آنجا فرض بر این بوده که مقدار تابع یعنی  $f(x)$  در فاصله  $[a, b]$  بزرگتر یا مساوی صفر باشد. یعنی داشتیم:  $f(x) \geq 0$ .

اگر در فاصله  $[a, b]$  داشته باشیم:  $f(x) \leq 0$  و اگر  $F$  تابع اولیه ای برای  $f$  باشد، آنوقت  $F$  نزولی بوده (زیرا مشتق آن یعنی  $f$  منفی است) و در نتیجه عدد

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

منفی خواهد شد. اگر به همان روش حالت  $f(x) \geq 0$  در این حالت بحث کنیم خواهیم دید که این عدد منهای مساحت سطح بین منحنی و محور  $x$  ها و خطوط  $x = a$  و  $x = b$  خواهد شد.



انتگرال معین برابر اندازه سطح می‌شود:

$$S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$$

پس اگر  $f(x)$  در فاصله  $[a, b]$  در چندین نقطه تغییر علامت دهد یا به گفته بهتر در برخی از فواصل  $f(x) > 0$  و در برخی دیگر  $f(x) < 0$  باشد. (شکل صفحه قبل)

باید مقدار انتگرال معین را در هر یک از فاصله‌ها جداگانه محاسبه نموده و قدرمطلق انتگرال معین قسمت‌های واقع در زیر محور طولها را بمقادیر انتگرال معین قسمت‌های بالای محور  $x$  ها افزود تا سطح کل محصور به منحنی و محور  $x$  ها و خطوط  $x = a$  و  $x = b$  به دست آید.


مثال ۱- محاسبه سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع:

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$$

و محور  $x$  ها و خطوط  $x = 2$  و  $x = 8$

اگر منحنی نمایش تغییرات و جدول مربوط به این تابع را رسم کنیم خواهیم داشت:

$x$	$-\infty$	$-2$	$0$	$2$	$6$	$+\infty$
$y'$		$+$		$0$	$-$	
$y$	$-\infty$	$\nearrow 0$	$\nearrow 3$	$\nearrow 4$	$\searrow 0$	$\searrow -\infty$



بصورتی که مشاهده می‌شود قسمتی از سطح که محصور است بین منحنی و محور  $x$ ها و خطوط  $x=2$  و  $x=6$  بالای محور  $x$  ها قرار دارد. این قسمت را  $S_1$  می‌نامیم ولی قسمتی از سطح که محصور است بین منحنی و محور  $x$ ها و خطوط  $x=6$  و  $x=8$  زیر محور  $x$ ها قرار دارد و لذا برای محاسبه آن قدر مطلق انتگرال آن قسمت را می‌یابیم. این قسمت را  $S_2$  می‌نامیم و خواهیم داشت:

$$S_1 = \int_2^6 \left(-\frac{1}{4}x^2 + x + 3\right) dx = \left[-\frac{1}{12}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 3x\right]_2^6 =$$

$$\left(-\frac{216}{12} + \frac{36}{2} + 18\right) - \left(-\frac{8}{12} + \frac{4}{2} + 6\right) = -\frac{208}{12} + 36 - 8 =$$

$$-\frac{52}{3} + 28 = \frac{32}{3}$$

$$S_2 = \left| \int_6^8 \left(-\frac{1}{4}x^2 + x + 3\right) dx \right| = \left| \left[-\frac{1}{12}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 3x\right]_6^8 \right|$$

$$= \left| \left(-\frac{512}{12} + \frac{64}{2} + 24\right) - \left(-\frac{216}{12} + \frac{36}{2} + 18\right) \right| = \left| -\frac{296}{12} + 20 \right|$$

$$= \left| -\frac{74}{3} + 20 \right| = \left| -\frac{14}{3} \right| = \frac{14}{3}$$

در نتیجه:

$$S = S_1 + S_2 = \frac{32}{3} + \frac{14}{3} = \frac{46}{3}$$


مثال ۲- محاسبه سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع  $y = \sin x$  و محور  $x$ ها

و خطوط  $x=0$  و  $x=2\pi$ .

چون به ازای  $0 < x < \pi$  خواهیم داشت:  $\sin x > 0$  و همچنین به ازای  $\pi < x < 2\pi$  خواهیم

داشت  $\sin x < 0$  پس خواهیم داشت:

$$S = \int_0^{\pi} \sin x dx + \left| \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx \right|$$



ولی :

$$\int_0^{\pi} \sin x dx = \left[ -\cos x \right]_0^{\pi} = -\cos \pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$$

$$\left| \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx \right| = \left| \left[ -\cos x \right]_{\pi}^{2\pi} \right| = \left| -\cos 2\pi + \cos \pi \right|$$


$$= \left| -1 - 1 \right| = 2$$

و از آنجا :

$$S = 2 + 2 = 4$$

مثال ۳ : تعیین مساحت بیضی - می خواهیم تعیین مساحت بیضی ای که به وسیله معادله :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



داده شده است را به دست آوریم. در صفحه دستگاه

محورهای مختصات ربع بیضی مورد بحث را

به وسیله شکل نشان داده ایم .

اگر مساحت بیضی را به  $S$  بنامیم خواهیم

داشت :

$$S = \int_0^a y dx = \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

برای محاسبه این انتگرال تغییر متغیر می دهیم به صورت زیر :

$$x = a \sin t \Rightarrow dx = a \cos t dt$$

$$0 < x < a \Rightarrow 0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$S = \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{b}{a} a \cos^2 t dt = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{1}{2} + \frac{\cos 2t}{2}) dt$$


$$S = ab \left[ t + \frac{\sin 2t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$S = \pi ab$$

۳-۱۴- سطح محصور بین دو منحنی- برای محاسبه سطح محصور بین منحنیهای نمایش

تغییرات دو تابع  $y = f_1(x)$  و  $y = f_2(x)$  و خطوط  $x = a$  و  $x = b$  که در آن  $f_1(x) \leq f_2(x)$

(طبق شکل) ، چنین عمل می کنیم :




$$S = \int_a^b f_1(x) dx - \int_a^b f_2(x) dx = \int_a^b [f_1(x) - f_2(x)] dx$$

مثال ۱- محاسبه سطح محصور بین منحنیهای نمایش تغییرات دو تابع زیر:

$$y = \sqrt{x} \quad \text{و} \quad y = x^2$$

نخست طولهای نقاط تقاطع دو منحنی را می یابیم:

$$\sqrt{x} = x^2 \iff x = x^4 \iff x'' = 0 \quad \text{و} \quad x' = 1$$



حال با توجه به شکل دو منحنی که در بالا رسم شده است و آنچه که در بالا دیده ایم خواهیم



$$S = \int_0^1 \sqrt{x} dx - \int_0^1 x^2 dx = \int_0^1 (x^{\frac{1}{2}} - x^2) dx$$

$$= \left[ \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \left( \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) - 0 = \frac{1}{3}$$

## تمرین

۱- مطلوب است محاسبه سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع  $y = 4 - x^2$  و

محور  $x$  ها. (جواب  $\frac{10}{3}$ )

۲- سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع  $y = x^2$  و خط  $y = 8$  و محور  $y$  ها

را حساب کنید. (جواب  $= 12$ )

۳- سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع  $y^2 = 9x$  و خط  $y = 3x$  را حساب

کنید. (جواب  $= \frac{1}{4}$ )

۴- سطح محصور بین هذلولی به معادله  $xy = a^2$  و محور  $x$  ها و خطوط  $x = a$  و

$x = 2a$  را حساب کنید. (جواب  $= a^2 \log 2$ )

۵- مطلوب است محاسبه سطح محصور بین یکی از طاق‌های منحنی  $y = \sin x$  و محور

$x$  ها. (جواب  $= 2$ )

۶- سطح محصور بین سهمی‌های  $y^2 = 2px$  و  $x^2 = 2py$  را حساب کنید.

(جواب  $= \frac{4}{3} p^2$ )

۷- تمام سطح محصور بین منحنی  $y = x^2$  و خط‌های  $\bar{y} = 2x$  و  $\bar{y} = x$  را حساب کنید.

(جواب  $= \frac{3}{2}$ )

۱۵-۳- محاسبه حجم برخی از اجسام دوار- فرض می‌کنیم تابع  $y = f(x)$  درفاصله

$[a, b]$  معین و پیوسته و غیر منفی باشد. در این گفتار می‌خواهیم حجم حاصل از دوران سطح محصور بین

منحنی (C) نمایش تغییرات تابع  $y = f(x)$  و محور  $x$  ها و خطوط  $x = a$  و  $x = b$  در حول محور  $x$  ها را محاسبه کنیم. فرض کنید که  $a < x < b$  و  $V(x)$  حجم آن قسمت از جسم دوار باشد که بین صفحات عمود بر محور  $x$  ها در نقاط به طول  $a$  و  $x$  واقع شده است. به  $x$  نموی به اندازه  $\Delta x$  بدهید و فعلا فرض کنید که  $\Delta x$  مثبت است. آنوقت حجم آن قسمت از جسم دوار

که بین صفحات عمود بر محور  $x$  ها در نقاط به طول  $x$  و  $x + \Delta x$  واقع شده است برابر است با


$$\Delta V = V(x + \Delta x) - V(x)$$

فرض کنید که  $m(x)$  و  $M(x)$  به ترتیب می نیمم مطلق و ماکزیمم مطلق تابع  $f$  در فاصله  $[x, x + \Delta x]$  باشد. (برای توابع پیوسته ثابت می کنند که چنین ماکزیمم و می نیممی موجود است). آنوقت حجم  $\Delta V$  از حجم استوانه به ارتفاع  $\Delta x$  و شعاع قاعده  $m(x)$  بزرگتر و از حجم استوانه به ارتفاع  $\Delta x$  و شعاع قاعده  $M(x)$  کمتر است. (به شکل مراجعه شود) یعنی

$$\pi m^2(x) \Delta x \leq \Delta v \leq \pi M^2(x) \Delta x$$

و چون بر  $\Delta x$  تقسیم کنیم (فرض شده است) داریم:

$$(1) \quad \pi m^2(x) \leq \frac{\Delta v}{\Delta x} \leq \pi M^2(x)$$



حال اگر  $\Delta x$  را به سمت صفر میل دهیم، چون تابع  $f$  در  $[x, x + \Delta x]$  پیوسته است ماکزیمم و می نیمم مطلق آن در این فاصله یعنی  $M(x)$  و  $m(x)$  به سمت  $f(x)$  میل کرده و لذا حد دو طرف نامساوی بهای (۱) باهم برابر می شوند. پس حد  $\frac{\Delta v}{\Delta x}$  نیز موجود بوده و برابر حد

مشترک دو طرف (۱) یعنی  $\pi f^2(x)$  می شود، یعنی

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta v}{\Delta x} = \pi f^2(x)$$

به همین ترتیب می توان ثابت کرد که

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta v}{\Delta x} = \pi f^2(x)$$

پس خواهیم داشت

$$\frac{dv}{dx} = \pi f'(x)$$

$$V(x) = \int \pi f'(x) dx = \int \pi y' dx$$

ولذا

حال اگر  $F(x)$  تابع اولیه‌ای برای  $\pi f'(x)$  باشد آنوقت داریم:

$$V(x) = F(x) + C$$

و چون  $V(a) = 0$ ، پس  $C = -F(a)$ . لذا اگر  $V$  حجم جسم دوار حاصل باشد داریم

$$V = V(b) = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = \int_a^b \pi f'(x) dx$$

مثال ۱- مطلوب است حجم حاصل از دوران سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع

$$y = x^2 - 6x + 5 \text{ و محور } x \text{ ها و خطوط } x = 2 \text{ و } x = 4 \text{ حول محور } x \text{ ها.}$$

طبق فرمول خواهیم داشت:

$$V = \int_2^4 \pi y^2 dx = \int_2^4 \pi (x^2 - 6x + 5)^2 dx$$

$$V = \pi \int_2^4 (x^4 - 12x^3 + 46x^2 - 60x + 25) dx$$

یا:

$$V = \pi \left[ \frac{x^5}{5} - 3x^4 + \frac{46}{3}x^3 - 30x^2 + 25x \right]_2^4$$

$$V = \pi \left[ \frac{1024}{5} - 768 + \frac{2944}{3} - 480 + 100 - \left( \frac{32}{5} - 48 \right) \right]$$

$$+ \frac{368}{3} - 120 + 50$$

$$V = \frac{406\pi}{15}$$

مثال ۲- تعیین دستور حجم کره- معادله دایره‌ای که مرکزش بر مبدأ مختصات منطبق

بوده و شعاعش  $R$  باشد عبارت است از:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

این دایره در دو نقطه بدوینهایتی  $-R$  و  $+R$  محور  $x$ ها را قطع می‌کند اگر این دایره و یا

نصف آن حول محور  $x$ ها دوران کند کره به وجود خواهد آورد. لذا دستور حجم کره را

می‌توان بدشکل زیر محاسبه نمود:

$$V = \int_{-R}^R \pi y^2 dx = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx$$

$$V = \pi \left[ R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R$$

$$V = \pi \left[ \left( R^2 - \frac{R^3}{3} \right) - \left( -R^2 + \frac{R^3}{3} \right) \right] = \pi \times \frac{4}{3} R^3$$

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

مثال ۳- محاسبه حجم حاصل از دوران بیضی  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  حول محور  $x$  ها.

معادله بیضی را می توان چنین نوشت:


$$y^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2)$$

چون دو کرانه بیضی به طولهای  $x = a$  و  $x = -a$  هستند. پس:

$$V = \pi \int_{-a}^a \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^a \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x^2) dx$$

$$V = \frac{2\pi b^2}{a^2} \left[ a^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^a = 2\pi \frac{b^2}{a^2} \left( a^3 - \frac{a^3}{3} \right)$$

$$V = \frac{4}{3} \pi a b^2$$



مثال ۴ - مطلوب است محاسبه حجم قطعه ای

از کره به شعاع  $R$  که بین دو صفحه موازی محصور باشد

چنین حجمی از دوران سطحی که محصور است بین

محور  $x$  ها و کمان  $AB$  از دایره  $x^2 + y^2 = R^2$  و

خطوط  $x = a$  (پاره خط  $AA'$ ) و  $x = b$  (پاره خط

$BB'$ ) در حول محور  $x$  ها حاصل می شود. پس خواهیم

داشت:

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b (R^2 - x^2) dx = \pi \left[ R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_a^b$$

$$= \pi \left( R^2 b - \frac{b^3}{3} - R^2 a + \frac{a^3}{3} \right) = \pi \left[ R^2 (b - a) + \frac{1}{3} (a^3 - b^3) \right]$$

$$= \pi (b - a) \left[ R^2 - \frac{a^2 + ab + b^2}{3} \right]$$


مثال ۵- محاسبهٔ حجم حاصل از دوران سطحی حول محور  $x$ ها که مجبور است بین خط  $y = mx$  و محور  $x$ ها و خط  $x = a$  (حجم مخروط) طبق فرمول خواهیم داشت:

$$V = \pi \int_0^a y^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^a m^2 x^2 dx$$


$$V = \pi \left[ m^2 \frac{x^3}{3} \right]_0^a$$

$$V = \pi m^2 \frac{a^3}{3}$$



با در نظر گرفتن اینکه  $ma$  همان  $AB$  یعنی شعاع قاعدهٔ مخروط و  $a$  طول ارتفاع آن است. خواهیم داشت  $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$  که همان دستور هندسی محاسبهٔ حجم مخروط است

مثال ۶- محاسبهٔ حجم مخروط ناقص دواری که از دوران سطح مجبور بین خط  $y = mx + n$  و محور  $x$ ها و خطوط  $x = a$  و  $x = b$  در حول محور  $x$ ها پدید می‌آید. طبق فرمول خواهیم داشت:



$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b (mx+n)^2 dx \\ &= \pi \left[ \frac{(mx+n)^3}{3m} \right]_a^b \\ &= \pi \left( \frac{mb+n}{3m} \right)^3 - \pi \left( \frac{ma+n}{3m} \right)^3 \end{aligned}$$

ب. ستاده از اتحاد  $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$  خواهیم داشت:

$$V = \pi \left( \frac{mb+n}{3m} - \frac{na+n}{3m} \right) \\ \times [(mb+n)^2 + (ma+n)^2 + (mb+n) \times (ma+n)]$$

$$V = \frac{\pi}{3} (b-a) [(mb+n)^2 + (ma+n)^2 + (mb+n)(ma+n)]$$

ولی  $b-a$  برابر ارتفاع مخروط ناقص است که در هندسه با  $h$  نشان داده می‌شود و  $mb+n=BB'$  و  $ma+n=AA'$  است که در هندسه به ترتیب با  $R$  و  $R'$  یعنی شعاعهای دوقاعده نشان داده می‌شوند. در نتیجه خواهیم داشت:

$$V = \pi \frac{h}{3} (R^2 + R'^2 + RR')$$

### تمرین

سطح محصور بین محور  $x$ ها و منحنی‌های زیر و حدود معین شده در هر یک را محاسبه کنید:

۱)  $y = x^2 + 3$  و  $x = -1$  و  $x = 2$  ( $S = 12$ )

۲)  $y = x^2(3-x)$  و  $x = 4$  و  $x = 5$  ( $S = 31\frac{1}{4}$ )

۳)  $y = x^2 + \frac{1}{x^2}$  و  $x = \frac{1}{4}$  و  $x = 1$  ( $S = 1\frac{7}{24}$ )

سطح محصور بین محور  $y$ ها و منحنی‌های زیر و خطوط داده شده در هر قسمت را حساب

کنید.

۴)  $x = y^2$  و  $y = 3$  ( $S = 9$ )

۵)  $y = x^2$  و  $y = 1$  و  $y = 8$  ( $S = 11\frac{1}{4}$ )

۶)  $x = +\frac{1}{\sqrt{y}}$  و  $y = 2$  و  $y = 3$  ( $S = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{2}$ )

سطح محصور بین هر یک از منحنی‌های زیر و محور  $y$ ها را حساب کنید:

۷)  $x = (y-1)(y-4)$  ( $S = 4\frac{1}{4}$ )

۸)  $x = 3y - y^2$  ( $S = 4\frac{1}{4}$ )

۹)  $x = y(y-2)^2$  ( $S = 1\frac{1}{3}$ )

سطح محصور بین هریک از منحنی‌های زیر و خطوط داده شده را حساب کنید:

$$۱۰) y = x^2 - 2x + 2 \quad \text{و} \quad y = 5 \quad (S = 10\frac{2}{3})$$

$$۱۱) y = x^2 - 6x + 9 \quad \text{و} \quad y = 1 \quad (S = 1\frac{1}{3})$$

$$۱۲) y = -x^2 + 2x - 4 \quad \text{و} \quad y = -4 \quad (S = 4\frac{1}{2})$$

$$۱۳) y = x(x - 2) \quad y = x \quad (S = 4\frac{1}{2})$$

$$۱۴) y = 4 - 3x - x^2 \quad 2x + y + 2 = 0 \quad (S = 20\frac{5}{6})$$

$$۱۵) y = x^2 - 6x + 2 \quad x + y - 2 = 0 \quad (S = 20\frac{5}{6})$$

سطح محصور بین دو منحنی داده شده در هریک از مسایل زیر را حساب کنید:

$$۱۶) y = x(x - 1) \quad \text{و} \quad y = x(2 - x) \quad (S = \frac{9}{8})$$

$$۱۷) y = x(x + 2) \quad \text{و} \quad y = x(5 - x) \quad (S = 1\frac{1}{3})$$

$$۱۸) y = x^2 - 5x \quad \text{و} \quad y = 2x^2 - 6x \quad (S = \frac{1}{24})$$

$$۱۹) y^2 = 4x \quad \text{و} \quad x^2 = 4y \quad (S = \frac{16}{3})$$

$$۲۰) y = x^2 - 3x - 7 \quad \text{و} \quad y = 5 - x - x^2 \quad (S = 41\frac{2}{3})$$

$$۲۱) y = 2x^2 + 7x + 3 \quad \text{و} \quad y = 9 + 4x - x^2 \quad (S = 13\frac{1}{2})$$

۲۲- سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات  $y = \frac{1}{x^2}$  و خط  $10x + 4y - 21 = 0$

را محاسبه کنید (راهنمایی - یکی از نقاط تقاطع به طول  $-\frac{2}{5}$  و عرض  $\frac{25}{4}$  است).

[جواب - نقاط دیگر تقاطع عبارتند از:

$$[S = 1\frac{11}{16} \quad \text{و} \quad (2, \frac{1}{4}) \quad \text{و} \quad (\frac{1}{4}, 4)]$$

۲۳- سطح محصور بین خط  $y = \frac{3}{4}x$  و خط  $x = 4$  و محور  $x$ ها حول محور طولها دوران می کند حجم حاصل را حساب کنید.

$$(V = 12\pi \text{ جواب})$$

۲۴- سطح محصور بین منحنی نمایش تغییرات تابع  $y = x^2$  و خطوط  $y = 1$  و  $y = 4$  حول محور  $y$ ها دوران می کند حجم حاصل را حساب کنید.

$$(V = \frac{15\pi}{4} \text{ جواب})$$

راهنمایی - از دستو  $V = \int_{a}^b \pi x^2 dy$  استفاده کنید :

۲۵- سطح محصور بین منحنی  $y = x^2 + 1$  و خط  $y = 5$  حول محور  $x$ ها دوران می کند حجم حاصل را محاسبه کنید.

$$(V = 72 \frac{8}{15} \pi \text{ جواب})$$

هریک از سطوح محصور بین منحنی و خطوط داده شده در زیر حول محور  $x$ ها دوران می کند حجم حاصل را حساب کنید.

$$۲۶) x + 2y - 12 = 0, x = 0, y = 0 \quad (V = 144\pi)$$

$$۲۷) y = x^2 + 1, y = 0, x = 0, x = 1 \quad (V = \frac{28}{15}\pi)$$

$$۲۸) y = \sqrt{x}, y = 0, x = 2 \quad (V = 2\pi)$$

$$۲۹) y = x(x - 2), y = 0 \quad (V = \frac{16}{15}\pi)$$

$$۳۰) y = x^2(1 - x), y = 0 \quad (V = \frac{\pi}{105})$$

$$۳۱) y = \frac{1}{x}, y = 0, x = 1, x = 4 \quad (V = \frac{3\pi}{4})$$

هریک از سطوح محصور بین منحنی و خطوط داده شده در زیر حول محور  $y$ ها دوران می کند حجم حاصل را حساب کنید.

$$۳۲) y = 2x - 4, y = 2, x = 0 \quad (V = 18\pi)$$

$$۳۳) x = \sqrt{y+1}, x = 0, y = 4 \quad (V = \frac{9\pi}{2})$$



$$۳۴) x - y^2 - ۲ = 0, x = 0, y = 0, y = ۳ \quad (V = 96 \frac{2}{5} \pi)$$

$$۳۵) y^2 = x + ۲, x = 0 \quad (V = ۳۴ \frac{2}{15} \pi)$$

$$۳۶) y = 1 - x^2, x = 0, y = 0 \quad (V = \frac{3\pi}{5})$$

$$۳۷) xy = 1, x = 0, y = 2, y = 5 \quad (V = \frac{2\pi}{10})$$

۳۸- در ظرفی به شکل نیمکره به شعاع ۱۳ سانتیمتر آب می‌ریزیم هنگامی که ارتفاع آب در داخل ظرف به ۸ سانتیمتر برسد. حجم آب را حساب کنید.

$$(\text{جواب } 661 \frac{1}{3} \pi \text{ cm}^3)$$

۳۹- در ظرف کره‌ای شکل به قطر ۲۰ سانتیمتر برای نگاهداری ماهی به ارتفاع ۱۸ سانتیمتر آب ریخته‌ایم حجم آب داخل ظرف را حساب کنید.

$$(\text{جواب } 1296 \pi \text{ cm}^3)$$

